





h

(#) VII-3A .

LAURENTII
HEISTERI
COMPENDIUM
MEDICINÆ
PRACTICÆ,
CUI PRÆMISSA EST
DE
MEDICINÆ MECHANICÆ
PRÆSTANTIA
DISSERTATIO.

Editio novissima auctior & emendatior.



VENETIIS,
MDCCLXIII.



EX TYPOGRAPHIA REMONDINIANA:
SUPERIORUM PERMISSU.



12 4. 2. 24

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11.



DISSERTATIO

DE

MEDICINÆ MECHANICÆ

PRÆSTANTIA.

I.



Edicinam varia habuisse fata, variasque *Medicina*
pro vario tempore passam esse mutatio- *varias ha-*
nes, atque ob varias eam excolentium *buit so-*
opiniones & ingenium in diversas abiisse *las.*
sententias ac sectas, illis fatis notum es-
se existimo, qui vel leviter in historia
medica versari sunt. Prima enim secta

fuit *empirica*, quæ sola *experientia* nitebatur, quam vero
HIPPOCRATES adjecta ratione fecit *rationalem* sive *dog-*
maticam; hanc, Julii Cæsaris tempore, auctore THEMI-
SONE secuta est *Methodica*, quam vero seculo secundo post
Christum natum rursus evertere studuit GALENUS, quo
auctore secta *Galenica* orta est. Seculo decimo sexto PARA-
CELSUS condidit *chemicam*; decimo septimo orta est *Car-*
tesiana, *Sylviana* sive *Tacheniana*, *Eclēctica*, ac denique
Mechanica. (sub qua tamen & *Hippocraticam* sive *Rationa-*
lem intelligo) atque *Stahlianam*. Quoniam vero nomina prio-
rum sectarum fere abolita sunt, atque hodie in Europa,
quam maxime vero in Germania nostra, omnes, præter
Mechanicam & *Stahlianam* quasi desierunt, atque hæc duz po-
tissimum a Medicis nostris nunc excoluntur, atque hoc meum
Compendium practicum secundum Mechanicorum principia
conscripsum est, placet hic præfationis loco *Medicina mecha-*

nica præ Stahlianâ præstantiam hac in dissertatione ostendere; ut sic quid forte commodi ex hoc libellô in faciendâ Medicinâ lectores & præsertim Medicinæ practicæ tiones capere queant, perspicere possint.

2. *Medicina vero mechanica ea mihi dicitur, quâ Medicinâ ex fabrica corporis humani, utpote quæ tota Mechanicâ est, per anatomem accurate cognita & actione reciproca partium solidarum in fluida, & fluidarum in solida, observationibus atque experimentis physicis, mechanicis ac chemicis, secundum leges mechanicas ratiocinatur & agit. Nam corpus humanum machinam esse artificiosissimam, ex quamplurimis machinulis minoribus compositam, tam anatomæ docet, quam a Gel. BOERHAVIO in Instit. Medici aliisque quamplurimis scriptoribus Medicis Mechanicis & nominatim, Borello, Bellino, Stenone, Lowero, Pitcarnio, Frid. Hoffmanno, Bergero, Guilielmino, Lancisio, Keilio, Meadio, Michelotto, Mazino, Schreiberio, &c. evictum est, qui excusso jugo auctoritatis, nihil pro certo aut vero admittunt, quisquis etiam illud dixerit, nisi quod sensibus, vel certis observationibus atque experimentis probatum esse cognoscunt, atque ex fabrica corporis per certâ ratiociniâ, tam in statu ejus sano quam ægroto, deduci potest.*

3. *Sed circa finem superioris sæculi in nova, quæ in Saxoniâ tunc condebarur, Halensî Academiâ, juxta modo laudatum Frid. HOFFMANNUM, mechanicis principiis additum, cathedram Medicinæ exornavit Georg. Ernest. STAHLIUS, vir quoque acutissimus & laboriosissimus, & cui ars Medicâ revera multum debet; cui vero neque mechanicâ principia, neque alia tunc in Medicinâ usitata arridebant, sed novas easque sequentes, quantum ego saltem ex scriptis ejus asseclariunquæ ipsius cognoscere potui, ab anima potissimum petitas, libi formavit hypotheses, quibus ipse & asseclie ejus & theoriâ & therapiâ medicâ superstruxerunt.*

4. *Nimirum ad animam, ut dixi, quam naturam esse volunt, sive ad naturam, quam animam hominis esse contendunt atque pro synonymis habent, in Medicinâ tam addiscendâ quam faciendâ, quam maxime esse respiciendum; animam enim rationalem esse dicunt, quæ fatus corpus in utero matris fabricaret; animam deinde eandem esse, quæ in corpore formato & nato ad omnes ejus actiones attenderet, curamque semper, ut corpus, tamquam habitaculum suum, satum sectumque conservet, generet, actionesque omnes corporis animales, vitales & naturales regeret; atque etiam eam in finem, si aliquod vitium in corpore adesse cognosceret, quod corpori noxam inferre posset, ipsam omnes nervos intendere, ut nullum hoc vel corrigeret, vel e-*

cor-

Que principia sibi formavit.

corpore expelleret: atque hanc ob causam animam, matura hanc ob rem deliberatione facta, in quibusdam excitare vomitum, in aliis fluxum ventris, in aliis sudorem aut urinam copiosorem movere; rursus in aliis fluxus sanguinis, vel per nares, vel per pulmones, vel per ventriculum, renes, vesicam, vel intestinum rectum, quem fluxum hæmorrhoides vulgo appellant, concitare, atque sic supervacaneum vel noxium e corpore pro eo sano præstando eliminare. In aliis per spasmos five contractiones partium & dolores animam noxium ex certis partibus, vel ad aliud locum, eumque minus noxium compellere; illudque vel in pus convertere, sicut in inflammationibus & abscessibus fieri solet, vel hærentes humores spissiores ex parte læsa his spasmis & doloribus propellere, aut per sanguineas excretiones, hæmorrhoidum præsertim, sicut in morbis hypochondriacis, splenicis, hepaticis, melancholicis, arthriticis & podagricis fieret, aut etiam per serosas, ut in coryza, tussi & asthma humido, expellere.

5. Ubi simul monendum, Stahlianos pro multorum morborum fecunda matre non tam pravas sanguinis qualitates, acidum nempe aut alcali chemicorum, sed potius abundantiam sanguinis, quam plethoram vulgo Medici appellant, haud inepte habere; adeoque dicunt, animam quamplurimis in morbis studere, immo quam diligentissime laborare, ut corpus suum per excitas sanguinis profusiones spontaneas a nimia sanguinis copia, a qua quamplurimæ noxæ ipsi imminerent, liberet, atque ubi hunc scopum obtinere sponte non posset, medicum vel per idonea ad hanc rem remedia, vel per artificiales sanguinis detractiones nature succurrere debere. Immo si anima scopum suum in excretionibus ejusmodi obtinere non possit, ipsam haud raro extrema quæque tentare, & non solum vehementissimos dolores, ac speciatim arthriticos, rheumaticos, podagricos vel hypochondriacos, atque convulsiones, sed ipsam quoque epilepsiam haud raro inducere, ea intentione, ut corpus ab imminente gravi noxa liberet. Speciatim vero multos morbos capitis, ut cephalalgiam, ophthalmiam, otalgiam, odontalgiam, tonsillarum & faucium inflammationes sæpe oriri, quando anima abundantem sanguinem per nares expellere studeret; spirandi vero difficultatem, pleuritidem & peripneumoniam, si per pulmones, & dolores hypochondriorum, colicos, cardialgiam, lumborum, intestini recti & hæmorrhoidalium venarum dolorem, quando vel per ventriculum, renes, aut intestinum rectum se a nimia copia sanguinis liberare tentaret. Verbo: omnes actiones in corpore contingentes, tam animales, quam

Quenam
ista ad-
huc ob-
stant pla-
cita.

naturales & vitales, in statu secundum & præter naturam ab anima dependere volunt, animamque sic actionem omnium auctorem esse statuunt; ita, ut quoties dolores, inflammationes, convulsiones, profusiones sanguinis, febres, epilepsia, paralyfes aliique morbi in corpore humano oriuntur, hos omnes a sapienti, ut loqui amant, nature instituto, cum deliberatione prudenti, in utilitatem corporis fieri contendunt. Atque ad has actiones perficiendas ipsam potissimum motu cordis & arteriarum aucto, motuque tonico fibrarum membranarumque uti, quibus omnia ea, quæ modo diximus, efficeret, corpusque suum a morbis vel imminetibus vel presentibus liberare studeret. Medicum igitur in singulis morbis attendere debere volunt cum HIPPOCRATE, quo natura sive anima vergat, ejusque ductum sequi præcipiunt; naturam enim optimam esse morborum medicatricem, & Medicum tantum ejus ministrum: quique hos motus rite observaret, atque naturam in sua intentione optime sequeretur aut juvaret, illum optimum esse Medicum. Atque hæ præcipuæ, ni fallor, sunt hypotheses STAHLII ejusque asseclarum, quos propterea vulgo Stablianos hodie appellant, quibus & theoria & curandi ratio ipsorum innititur. Ubi tamen nec hoc prætermittere possum, quod multi eorum, quemadmodum de mechanicis demonstrationibus mechanicisque partium corporis humani actionibus considerandis, ita etiam de anatome sive vera structura corporis nostri, & præsertim ea, quæ subtiliores partes & functiones corporis exponit, forte ob tedium laboris, quas hæc duæ Medicinæ partes, solidissima genuinæ Medicinæ & Chirurgiæ fulcra, requirunt, parum sint solliciti, atque eas vel inutiles in Medicina curiositates appellarunt, vel sicut nonnulli, quos hic nominare nolo, tam perfrectæ fuerunt frontis, ut anatomen Medico prorsus inutilem & supervacaneam proclamaverint, immo nonnisi pompam theatralem vocaverint, existimantes, se sola observatione intentionum animæ bonos Medicos esse posse.

Anatomen continetur.

6. Itaque Medicinæ Mechanicæ præstantiam præ Stabliana cum in speculatione sive theoria, quam vocant, tum in praxi, sive medendi ratione hic demonstrare sive evincere conabor.

7. Quod igitur ad theoriam attinet, dissertationis limites non permittunt, ut ad omnes & singulas ejus partes me extendam, sed sufficiat mihi primaria quedam ejus capita tantum excutere; & quidem primo, dum perhibent, animam omnium actionum naturalium & p. n. in corpore humano esse auctorem, hoc revera probare hætenus nondum portare: adeoque in veteres labyrinthos & occultas qualitates, quæ

An anima omnium actionum auctorem.

CAR.

CARTESIUS & Mechanici tam diligenter e Medicina hucusque expurgare studuerunt ac commendarunt, *ruvus inducunt*, juvenesque Medicos inducunt. Sed antequam hic ulterius pergam, moneo, *hanc dissertationem revera non alterandi causa conscriptam esse*; sed ut in veritatem, sine præjudicatis opinionibus, rebus in utramque partem probe perpenſis, serio inquiram, lectoribusque a præjudiciis liberis postea dijudicandum relinquam, an non Medicina mechanicis principiis utens præſtet Stahlianam.

8. Quando igitur unusquisque animo a præjudiciis libero, *An corpus animam suam explorat, atque ex ea querit, an corpus suum struxerit?* anima ſolertiſſimis etiam hanc ob rem institutis meditationibus, *hujus actionis nulla ratione recordari*, adeoque etiam profecto ab ea hoc factum demonstrari non potest. Nam quia anima est substantia cogitans, *ſcire deberet, quid fecerit*, & adhuc faciat. Sed *objicere possum*, hominem, quando eum ad statum ſive ætatem pervenit, quo anima ad judicandum rite idonea est, viginti & plures ſorte annos præteriiſſe, animamque tam longa annorum ſerie earum rerum oblitam eſſe, quas in prima generatione corporis ſui peregerit; interea tamen verum eſſe, quod anima corpus ſuum conſtruxerit, quia hoc aliter concipi non poſſet. *Verum respondeo*, dum anima harum actionum, quæ ad corpus humanum ex tot minoribus partibus, machinis & viſceribus conſtans, exſtruendum requiruntur, ſibi non amplius conſcia eſt, *omnes prudentes etiam incertos manere, an hac ſententia & primum Stahlianæ doctrine poſtulatam verum ſit*. Prudens vero Medicus & Philoſophus *nihil in rebus naturalibus pro vero aut certo aſſumere debet*, ut jam dictum eſt, niſi quod vel experimentis vel ſenſibus verum ac certum eſſe, ſicuti apud mechanicos uſitatus eſt, *cognoverit*; alias enim *incertis fundamentis ſemper fluctuas*, atque incerta ratiocinia, & conſclusiones ſuperſtruit; quæ, cum fundamenta adhuc dubia aut falſa ſunt; & nonniſi hypotheſes, etiam *vera eſſe vix poſſunt* (a); adeoque, quicquid poſtea ex hoc fundamento ratiocinantur, non niſi *incertum & dubium manet*, quod animo veri cupido, qui clare, diſtincte & certe res ſcire amat atque ſatagit, nulla ratione ſatisfacit; alios autem, qui de vero non ſunt adeo ſolliciti, aut ad verum indagandum inepti, quemadmodum quamplurimos eſſe homines ingenioſiſſimus CARTESIUS quam veriffime jam docuit, (b) in-

(a) Vid. Oratio mea de Hypotheſium medicarum fallacia ac pernicioſitate. Altorfi A. 1710. jam a me evulgata.

(b) In Prælat. ad Meditat. de prima Philoſophia.

incertos relinquit, qui dicta STAHLII ejusque asseclorum de animæ potentia in corpore suo formanda, aliaque similia arripiunt; dum ea tanquam vera assumunt, licet veritatem eorum demonstrare nequeant, adeoque & ipsi de veritate earum convicti non sint, eaque *ut articulus fidei credunt*; id quod autem cordato ac prudenti Medico atque Philosopho indignum esse, & præstantiores Medici & Philosophi a tempore CARTESII uno quasi ore confessi sunt & adhuc consentunt. Conf. scripta acutissimi Philosophi WOLFII, aliorumque præstantissimorum recentiorum & Philosophorum & Medicorum.

Stahliani
hypothesen
uberius
perpenduntur.

9. Sed fingamus, licet non concedamus, *animam tantæ negotii actionem oblitam esse*, tamen ex multis aliis actionibus, quæ quotidie adhuc in corpore nostro contingunt, quam manifestissime demonstrari potest, eas ab anima non perfici, immo ne quidem dirigi, dum earum nullo modo sibi conscia est. Actiones, quæ in corpore humano contingunt, ab antiquis jam in animales, naturales, ac vitales distributæ sunt, atque animales dictæ sunt ea, quæ secundum animæ voluntatem in corpore nostro fiunt; quales sunt motus voluntarii, quum pleraque corporis nostri partes pro lubitu & ad nutum animæ movere possimus: ex quibus manifeste apparet, *animam hos motus perficere, dirigere*, eosque ad voluntatem hujus inchoari, continuari, augeri, accelerari, retardari, aut etiam omnino rursus sisti posse. Altera pars actionum animalium corporis humani sunt sensus nostri: quos etiam ab anima nostra dirigi tam clarum, certum atque perspicuum est, ut actum agerem, si hoc uberius hic probarem, præsertim, cum vix aliquis hac de re vel unquam dubitavit, adeoque Mechanici cum Stablianis egregie hic conveniunt, iisque concedunt, actiones, animales dictas, ab anima perfici & dirigi; licet qua ratione anima in corpus, & corpus rursus in animam agat, definiri certe hæcenus a nemine potuerit.

Quas actiones
anima
per se perficit.

10. De actionibus vero vitalibus & naturalibus alia res est. Dicuntur autem actiones vitales & naturales nostri corporis eæ, quæ ad vitam & naturam, h. e. fabricam corporis nostri conservandam inserviunt: ut exempli gratia actio cordis & inde pendens circuitus sanguinis per vasa corporis, digestio sive concoctio alimentorum in ventriculo & intestinis, nutritio, vegetatio, secretiones omnium liquorum in corpore nostro, ut urinæ, salivæ, bilis, genituræ aliorumque, quos brevitatis studio hic prætermitto. Hæ actiones a Medicis antiquis haud sine ratione, & ni fallor, propterea ab animalibus distinctæ sunt, quia probe perspexerunt, probari non posse, eas ab anima provenire aut dirigi, sed sponte, ani-

anima de iis ne quidem cogitante, fieri. Verum, hoc non obstante, *Stahliani* tamen contendunt, eas etiam ab anima & origi, immo & summa cum prudentia dirigi. Sed si hoc ita probare debent, sicut sapientes id hodie desiderant, nimirum ut certe demonstretur, non possunt, vel saltem huc usque non potuerunt. Nam si quilibet prudens cum anima sua serium ac severum init consilium, an has actiones, vitales scilicet & naturales, perficiat ac dirigat, profecto earum neque conscia est neque reminisci potest, se eas unquam perfecisse; licet hæ actiones in corpore nostro continuo fiant; adeoque an eas perficiat ac dirigat, necessario etiam scire deberent: sed ne sapientissimi hætenus homines hoc cognoscere potuerunt. At contrarium potius patet ex eo, quod anima per voluntatem suam actionem cordis, ventriculi, hepatis, renum aliarumque actionum naturalium ne quidem vel minimum vel per momentum accelerare aut retardare possit; verum omnes has partes actiones suas, ut automata, nimirum horologium quoddam, mola, vel aliæ machinæ artificiales perficiunt, quæ per solam hominis cuiusdam voluntatem, absque adhibita vi externa actiones suas non mutant, neque accelerant, neque retardant; sed prout fabrica sive mechanica constructio eorum motus regulari modo perficit & dirigit, continuo agunt, donec ab alia causa aut vi id impediatur. Ergo hæ actiones, quia ab animæ voluntate mutari non possunt, ab anima quoque non dependent, adeoque ab ea etiam nec fiunt, nec diriguntur.

11. Dum autem *Stahliani* volunt & docent, has actiones ab anima institui ac dirigi, illud vero probare non possunt, & anima ipsa hoc cognoscere nequit, quamvis summo studio in id inquirat, quid aliud hoc est, quam animæ qualitates occultas, præstantioribus Philosophis adeo exosas, & præjudicatas opiniones pleno agmine in Medicinam rursus inducere, atque discantibus sine sufficienti ratione credendas obtrudere? Sed de his hodie quam maxime valet, quod CICERO quondam de opinionibus præjudicatis dixit: (a) *Tantum opinio præjudicata poterat, ut etiam sine ratione valeat.* Nam multi, quia tam sæpe a Doctoribus suis audiverunt vel adhuc audiunt, animam actiones omnes corporis perficere, hoc tandem credunt, eoque ipso in præjudicium de veritate hujus rei incidunt; quamvis hoc numquam sufficientibus rationibus probatum sit: sine quibus tamen nihil in rebus naturalibus & medicis vel credendum vel admitendum.

12. Con-

(a) Lib. de Nat. Deor. I. Cap. V.

*Mechanici
quomodo
in funda-
mentis
hic Sra.
blianis
præstent.*

12. Contra *Mechanici Medici nihil pro certo aut vero assumunt, nisi quod sensibus vel experimentis certis, aut ejusmodi ratiociniis ac demonstrationibus, quæ certo convincunt, adeoque demonstrationum vlm obtinent, probatum est. Assumunt autem omnia ex omnibus disciplinis & sectis, quæ vera esse demonstrata sunt; assumunt, quod fabrica corporis humani, tamquam machina artificiosissima hydraulica, sive automatum ex solidis & fluidis, quemadmodum anatomicæ docet, mirabiliter a Deo constructa sit.*

*Quomodo
solida
considerent.*

13. Nam *solida, aut vasa humores coercentia sunt, aut instrumenta sive organa aut machine certa ratione constructa, in certum finem sive usum sic facta, figurata & connexa, sicut divus ille Medicus Mechanicus BOERHAVIUS quam rectissime scripsit, (a) ut ex singulari hac fabrica, quæ quælibet pars instructa est, determinati motus & actiones, sicut in aliis machinis exerceri queant, si causa movens accedit. Deprehenduntur enim in nostro corpore, pergit, fulcimenta, columnæ, trabes, propugnacula, tegumenta, hypomochlia, cunei, vectes, trochleæ determinantes, funes, præla, folles, cibra, filtra, canales, alvei, receptacula; quibus vero a BOERHAVIO indicatis machinis nostri corporis merito adhuc addi possunt siphones, antlie, valvule, forcipes, forfices, mola, pistilla, mortaria, infundibula, tympana, camera obscura, machine acusticæ, similesque res aliæ, quas omnes legibus mechanicis agere atque non nisi per eas rationali modo explicari posse & ratio docet, atque a modo laudato BOERHAVIO, aliisque supra §. 2. laudatis auctoribus, itemque a celeberrimo Philosopho WOLFIO (b) & SCHREIBERO (c) rerum physicarum & mathematicarum expertissimis, satis demonstratum esse existimo.*

*Quomodo
fluida.*

14. *Fluidæ vero partes intra solidas in corpore humano continentur, atque in iis, quamdiu vivimus, jugi modo a corde & arteriis moventur, in motu hoc per vasa & canales determinantur, varie miscentur, separantur, mutantur, vasa cum nexis instrumentis movent, horum parietes atterunt, mutant, resiliunt, fiuntque hæ actiones juxta leges hydrostaticas, hydraulicas & mechanicas, ideoque & juxta has, si quid certi de iis scire volumus, ultimo exponi debent: ita tamen, ut accuratissima simul ratio habeatur naturæ uniuscujusque humoris specialis & actionis ejus, prout per omne genus experimentorum (physicorum præsertim & chemi-*

(a) In Institut. Med. §. 40.

(b) Lib. de usu partium corporis humani & animalium, aliisque in locis.

(c) In elementis Medicinæ physico mathematicis.

chemicorum) innotescere potest, sicut quam rectissime præstantissimus docuit BOERHAVIUS. (a)

15. Ut vero ad specialiora quædam nunc transeamus, quæ *Quid Mechanici specissimè in Physiologia præstent.* *mechanici Medici in Physiologia sive usu partium explicando præstiterunt præ Stahlianis, consideremus, quælo, paucis quam doctè STENO de fabrica & actione musculorum egerit, (b) quam mirifice Joh. Alphonf. BORELLUS motus musculorum negotium, tam in homine, quam animalibus, secundum mechanicas leges exposuerit, (c) & quos mechanicos usus & actiones ossibus & ligamentis eorum hac in re tribuerit, quæ sane a rerum peritis sine stupore atque admiratione legi vix possunt, præsertim cum Dei sapientiam summam in corporis nostri constructione, ad motus & actiones multivarios, in usus corporis nostri quamplurimos, quam commodissime, quam constantissime & optime præstandos, quam evidentissime demonstrent; quæ profecto a Stahlianis tam solide nusquam exposita deprehendimus. Quam eleganter STENO, MALPIGHIIUS, BELLINUS, KEILIIUS, HARTSOEKERUS, MICHELOTTUS secretionis negotium exposuerunt. Quam pulchre LOWERUS & BORELLUS actionem cordis ex mirabili sua musculosa fabrica explicarunt. Quis enim mirabilis circuitus sanguinis rationes rite comprehendet, nisi qui ex admiranda structura cordis, arteriarum distributione & elastica fabrica, venarum situ sive cursu earumque valvulis, pulmonum & thoracis vera constitutione, (d) & ex mathematicis hydrostaticas & hydraulicas leges perceperit? Cor enim est masculus cavus, ejusque fibræ musculosæ magno artificio ita sunt contortæ, ut preli vel siphonis in modum sanguinem magno impetu in arterias expellant (e). Arteriae autem sunt canales conici, robusti & elastici, quæ ob hanc suam fabricam sanguinem, e corde susceptum, ex ampliori per angustiore semper & tandem angustissimum diametrum, reciproca cum corde actione in omnes partes, & tandem in venas propellunt, quæ quoque canales membranacei & conici sunt, sed inversi, ita ut sanguis in iis ex angustissimo diametro semper in amplio-rem influat; adeoque ille sanguis, qui primas & maximas ea-
rum*

(a) In Instit. Medic. §. 41. & deinde passim in aliis locis.

(b) In specim. myolog. itemque in libro de musculis & glandulis.

(c) Libro doctissimo de motu animalium.

(d) Hæc omnia ex anatome cognita hic desideramus, quia nimis prolixum foret, ea hic describere.

(e) Sicut eleganter hoc demonstravit LOVVERUS Lib. de Corde, BORELLUS Part. II de motu animal. Cap. V. propos. 50. & seq. BELLINUS de motu cordis, LANCISIUS de corde, aliique.

um angustias superavit, postea in amplioribus viis vix hæretæ queat. Atque hunc motum in venis, præsertim brachiorum atque infra cor positæ promouent multæ in eis conspicuæ *valvule semilunares*, membranaceæ, a FABRICIO AB AQUA-PENDENTE primum & elegantissime delineatæ: quæ mirabili mechanica ratione impediunt, ne sanguis in partibus infra cor, ac præsertim pedibus & brachiis pendentibus relabatur; sed dum a corde per sanguinem arteriosum semper urgetur, faciliiori ratione ascendat. Præterea per *arteriarum & venarum ordinatam distributionem* per corpus fit, ut sanguis e corde projectus, non semere hinc inde, sed per determinatas vias, ad determinata loca & partes, sursum & deorsum feratur. Quidnam autem est, quod cordis actionem in circumpellendo sanguine per arterias & venas elegantius illustrat ac docet, quam *sipho & prelum, machine vulgarissime*, quando liquores per canales propellunt? Quid *respirationis modum* planius exponit, quam *folles*? qui dilatatione laterum snorum aerem per tubum suum recipit, constrictione vero eorum aerem per eundem rursus expellit, sicut quam ingeniosissime id exposuerunt BORELLUS, MAYOVIUS, BERGERUS, BOERHAVIUS, HAMBERGERUS, alique: nam in corpore habemus organa maxime mirabilia, diaphragma præsertim aliosque mulculos quamplurimos, respirationi dicatos, (a) per quæ thorax, dum costæ ab ipsis eleuantur, diaphragma vero descendit, dilatatur in inspiratione, sed in expiratione, dum diaphragma ascendit, costæ autem descendunt, constringitur: ut sic per *tubum pulmonis, arteriam asperam* intelligo, aer pulmonem, ut in follem, ingredi, & ex eo rursus egredi possit.

Hoc ubi-
pius expo-
nitur.

16. Quis *visus*, quis *auditus rationes* mirabiles exponere potest, nisi qui ex anatome harum partium mechanicam fabricam, ex optica vero, catoptrica, dioptrica & acustica, artibus matheseos in arte salutari utilissimis, *camera obscura & tubis acusticis* radiorum visibilium & sonorum naturam, refractionesque & reflexiones eorum probe didicerit? An non *glandule & viscera nostra*, ubi secretiones certorum humorum, & quidem modo tenuiorum, modo crassiorum fiunt, *vera cribra & filtra pharmaceutica*, per quæ tenuiora a crassioribus separantur, repræsentant? *Valvula cordis & triangulares & semilunares* regressum sanguinis per eam viam, per quam venit, tam mirabili mechanica ratione impediunt, ut in machinis humanis tam apte hoc vix unquam factum

[a] Qui videri possunt in compend. meo anatom. §. 330. aliisque in recentioribus scriptis anatomicis.

Aut sit. An non in ventriculo, vesica urinæ collectioni destinata vesicula fellis, vesiculis feminalibus, & similibus vera habemus receptacula, in quibus varii liquores, ob certas causas aut ad certos usus, per certum tempus, quasi in receptaculis hydraulicis, asservantur. Quam eleganter dentes nostri in ore, & præsertim anteriores, cuneos, quam egregie maxillæ forcipem, aut etiam certo modo forcicem, qua cibos discerpimus aut discindimus, repræsentent, atque revera etiam constituent, olim in dissertatione de masticatione (a) demonstravi. Immo eadem maxilla cum dentibus certa ratione mortarium cum pistillo, sed sic exhibent, ut superior maxilla constituit corpus resistens sive mortarium, inferior autem pistillum, quo cibi in ore, quasi in mortario, conteruntur ac comminuantur; immo & eorum similitudinem cum mola Antiquissimi una cum Scriptura sacra jam cognoverunt (b): unde etiam posteriores dentes jam dudum molares, anteriores vero ab ulu incidendi ad modum forcipis, incisores dicti sunt. Denique in faucibus, speciatim in œlophago & capite ejus pharynge dicto, aptissimum conspicimus infundibulum, per quod deglutienda, præsertimque potio, quasi per infundibulum in dolium vel lagenam aliudve receptaculum, quod ventriculus hic est, demittitur. Tandem os, fauces & præsertim larynx cum pulmonibus nobilem organum musicum pneumaticum, cui simile in artificialibus non existit, constituent, sicut varii, qui de voce & loquela scripserunt, egregie demonstrarunt. (c) Quæ omnia sane, nisi me omnia fallunt, mechanisimum & actiones mechanicas in corpore humano, adeoque & præstantiam Mechanicorum in physiologia præ Stahlianis, abunde demonstrant.

17. Sed obijciunt Stahliani, hæc omnia tamen moveri & agi ab anima, atque sine concursu vel directione animæ non fieri, quemadmodum in mortuis post excessum animæ omnes prædictæ actiones cessarent. Sed respondeo, distinguendo primum probe inter actiones animales, vitales & naturales. In actionibus animalibus, sive iis, quæ ab anima voluntate dependent, Mechanicos (saltem plerosque) ut jam dictum est, cum Stahlianis amice conspirare, opinor, atque ratione causæ efficientis cum ipsis prorsus consentire, quod scilicet ab anima dirigantur, eaque auctor earum atque dire-

In actionibus animalibus Mechanicis cum Stahlianis conveniunt.

[a] Quæ Altorffii 1711. prodijt in 4.

[b] Vid. Ecclesiast. c. 12. v. 3.

[c] Vid. BODART. in act. Acad. Reg. Paris. An. 1700. VVEDEL & SCHELHAMMER diss. de voce, AMMAN. de loquela.

director sit: quia hoc sensibus obvium atque manifestum est. Sed quando causam instrumentalem, ut vocant, consideramus, nullus profecto actionum animalium, motuum scilicet voluntariorum, organorumque sensuum idoneam explicationem adhuc dedit, aut dare forte unquam poterit, nisi eorum instrumenta, ut organa mechanica considerabit, & earum actiones secundum has leges explicabit: adeoque quoties Stahliani recte de actionibus animalibus sive voluntariis differere volunt, mechanicam partium structuram & agendi rationem vel inviti in auxilium vocare coguntur.

In naturalibus vero diffentiunt.

18. Verum ut in his est concordia, sic e contrario in actionibus vitalibus & naturalibus explicandis tanto major inter ipsos est dissensus; dum Stahliani has quoque ab anima produci, dependere & dirigi statuunt, ut supra jam §. 4. & seq. dictum est; Mechanici vero hoc cum antiquis prorsus negant; quia anima de excitatione aut directione harum actionum, sicut §. 7. & seq. ostendimus, nihil scit, nihil cognoscit, nihilque in iis mutare, hoc est, eas neque accelerare neque retardare sua voluntate ulla ratione & ne per momentum quidem temporis potest.

Quid Mechanici de his sentiunt.

19. Qua ratione igitur Mechanici hasce actiones fieri existimant, dum animæ nullas partes hic dare volunt, dicam. Evicimus non solum jam supra, & anatome, opinor, omnes attentos & a præjudicatis opinionibus liberos facile convincet, corpus nostrum esse artificiosissimam machinam hydraulicam, ex diversis machinis minoribus, vasis, canalibus, & ductibus, certos liquores vehentibus, ita constatum, ut solida fluida, fluida vero solida reciproca actione moveant ac propellant, & ut una semper pars per communicationem & nexum cum altera, ope vasorum præsertim & nervorum, alterius actioni succurrat, atque sæpe plures ad unam actionem perficiendam, instar automati, horologii vel molæ concurrant: Demonstrat hoc, (ut exemplo uno alterove rem illustrem & extra justæ dubitationis aleam ponam) concoctionis ciborum negotium: quod non solus ventriculus, ut haud pauci imperiti existimant, perficit; sed ad illud conficiendum primo manducatio in ore facta, deinde omnes glandulæ salivam secernentes juxta os, in ore, in faucibus & œsophago constitæ concurrunt, ac præterea intestina, præsertim tenuia, glandula pancreas dicta, hepar & lien, suum quoque Symbolum conferunt, quemadmodum hoc a Physiologicis recentioribus unanimi consensu probatum est, neque forte vel ab ullo prudentiorum Stahlianorum negatur. Iam bilis preparationem non solum hepar præstat, sed lien, intestina, mesenterium, omentum, alique partes in unam hanc actionem conspirant: id quod etiam vix ab ullo prudenti hodie in dubium

bium vocatur, atque a BOERHAVIO in Instit. Med. elegantè demonstratum est.

20. Sic ad cordis actionem, quæ primaria est vitæ nostræ, *Quomodo cordis actio peragatur.* cerebri, si rectius cerebelli concursus sive adjumentum & quidem per nervos, qui a cerebello ad cor excurrunt, requiritur; quia his resectis vel ligatis in animali vivo cordis motus atque inde pendens vita desinit, quod quamplurimi etiam probaverunt, inter quos unicum rursus BOERHAVIUM nunc tantum nominare volo. (a) Ad cerebelli autem actionem præstandam requiritur communicatio cordis cum cerebello per arterias, per quas ad cerebrum & cerebellum sanguis tenuissimus per leges mechanicas devehitur, sine quo actio cerebelli nulla est, & animalis vita quoque perit. Probant hoc vulnera, per quæ sanguis ita profunditur, ut ad cerebrum nullus amplius pervenire queat. Quemadmodum vero ab influxu sanguinis ex corde in cerebrum sublato actio cerebri & cerebelli tollitur; ita ex influxu alicujus liquidi subtilissimi ex cerebello per nervos ad cor impedito aut sublato, quod vulgo liquidum nerveum sive spiritus appellamus, tollitur motus cordis, atque inde mox subsequitur mors. Quamdiu autem hoc commercium inter cor & cerebrum salvum factumque conservatur, tamdiu observamus actionem quoque cordis & cerebelli perdurare; quæ partes, ut causæ socie, reciproce se invicem juvant, se invicem conservant, & sic automatæ præcipuum nostri corporis, quod sine animæ directione movetur, & artificiosissimum, PERPETUUM MOBILE, ut vulgo dicunt, quale vel præstantissimi adhuc Mechanici perficere nondum potuerunt, constituunt, in quo cor per sanguinem ad cerebellum propulsum actionem hujus, secretionem scilicet liquidi illius subtilissimi præstat; cerebellum, contra, per nervos hoc liquidum continuo rursus ad cor demittit, ejusque ope motum cordis singulo ejus pulsu instaurat, & quamdiu animal vivit, conservat, atque sic hoc perpetuum mobile, quod stupenda prorsus ratione per centum sæpe annos, sine ulla interruptione per centum sæpe annos, sine ulla interruptione, constanter noctes diesque movetur, centies fere millies singulo die pulsatur, atque sic vitam hominis reliquasque omnes actiones in corpore conservat; (b) ad quos motus nullum principium immateriale sive anima requiritur; sed hi motus ob solas corporeas atque mechanicas

[a] Vid. ejus Instit. Med. §. 401.

[b] Hoc non modo in comp. anatom. §. 261. ubi de motu cordis agitur, sed & postea uberius VVACHTERUS in diss. de vera perpetui mobilis in homine viva idea, sub præsidio Fr. HOFFMANI, Halmæ 1731. edita, exposuit.

nicae illas rationes fieri possunt. Ut vero hoc aliquo simili illustretur, placet producere *mola exemplum*, in qua videmus rotam maximam, quæ ab aquæ motu aut lapsu movetur; reliquas rotas interiores & minores, una cum ingentibus lapidibus molaribus movere, subjectumque frumentum comminueret, idque tamdiu fieri, quamdiu molæ machina est integra & affluxus aquæ moventis non deficit: Quemadmodum vero illas rotas & lapides ab affluente aqua moveri videmus, sine animæ alicujus directione; ita & quamdiu ille affluxus spirituum sive liquidi cerebelli in cor non desinit, tamquam in machinam, quæ apta est ab hoc liquido moveri (quia via huic liquori per ligaturam præclusa mox desinit moveri) atque machina corporis integra est, *motus ille cordis conservari & quam diutissime*, ut dictum, *instar perpetui mobilis continuati sepe solet.*

*Quomodo
alia actiones
natura-
les.*

21. Sic eadem ratione rem se habere Mechanici statuunt in aliis visceribus, quorum actiones per se fiunt, atque animæ voluntati non sunt subiectæ; verum quæ inscîa & non advertente anima, & ubi anima nihil mutare, actionesque accelerare, neque retardare potest, contingunt, adeoque automaticæ sunt: quales, ut supra jam diximus, sunt *viscerum concoctioni ciborum famulantium, glandularum aliarumque partium, ubi secretiones variorum* in corpore humorum perficiuntur actiones: ut *hepatis, renum, vesiculorum, ventriculi, mammarum, &c.* ex quibus exempli loco unicam modo partem ob prolixitatem nimiam hic vitandam, paulo intimius considerabimus, & quidem nominatim ventriculum, concoctionis organum primarium.

*Spectamus
rationes
vegetationis.*

22. Hujus actionem, concoctionem scilicet ciborum, animam pro lubitu neque accelerare neque retardare posse, sicut de corde diximus, experientia loquitur; interea tamen ventriculus sanus intra certas horas certam alimentorum assumptorum copiam concoquit, digerit, & in fluidum, quod chylum vocant, resolvit, eadem fere ratione, ut *mola intra certum temporis spatium, cerram frumenti copiam conterit & in farinam resolvit.* Nullus adeo demens est, qui credat animam esse, quæ actiones molæ bene fabricatæ & semel in motu constitutæ, dirigat, quia tam ordinate hic omnia procedunt, sicut in horologio; sed potius vel rustici agnoscunt, hæc omnia, quæ mola perficit, ob mechanicam fabricam, quam habet, ita fieri. Quapropter etiam opus non est, ut in corpore humano, quod machina est longe excellentior, quam mola aut horologium, aliter de ejusmodi actionibus spontaneis sive automaticis, quales digestio & secretiones sunt, sentiamus & judicemus. Nam

ventriculus ob fabricam & figuram, quam habet, aptum receptaculum præbet alimentis assumptis, eisque, quantus satis est, retinendis; *humores dissolvendi potentia præditi* ex ore, œsophago & ipsa ventriculi substantia continuo in cavum ejus *influent*, aut potius sub tenuissimi vaporis specie, dum copiosissimis vasis sanguiferis & nervis instructus est, per quæ ope pulsus cordis & arteriarum propelluntur, exhalant, ut sic tanto melius ac facilius in subtilissima interstitia assumptorum sese insinuare, atque sic ipsorum resolutionem efficere possint. *Aer*, qui in foraminulis assumptorum hærebat, dum deglutiebantur, jam a calore ventriculi & vicinorum *vim suam elasticam innatam exercet*, atque alimenta, liquore calide in ventriculo semper fota ac macerata, sensim molliora fiunt, atque ab aere in foraminulis eorum contenta, tanto facilius jam dissolvuntur. Quando denique ad hæc omnia adhuc accedit alterna ipsius *per tunicam suam musculosam vegeta constrictio* & relaxatio atque sic perpetua conquassatio, ut & *motus ac pressio partium vicinarum*, diaphragmatis præsertim ac musculorum abdominis, utpote a quibus, maxime quando homo in exercitationibus corporis versatur, concutitur, digestionem, sive resolutionem ciborum, cum primis antea in ore bene manducatorum, solis his recensitis physicis ac mechanicis causis perfici posse, immo etiam *revera fieri*, non est, quod dubitemus, & quidem *sine ullo animæ concursu*; dum omnia, quæ hic fiunt, ex causis, ut dictum est, mere physicis & mechanicis, sicut in mola aut horologio bene constructo, fieri possunt, atque revera etiam fiunt. Quam enim ob causam anima hic concurrere debeat, tanquam res quasi supervacanea, non perspicio. E contrario *Dei sapientia in fabrica corporis nostri tam magna & mirabilis est*, ut teste GALENO, (a) aliisque prudentioribus, *nihil ad finem destinatum obtinendum in eo vel deficiat vel abundet*.

23. Quemadmodum vero Mechanismi veritatem in præcedentibus demonstravimus, ita etiam haud difficile hoc esset de organis & partibus reliquis, *ubi secretiones, vegetatio, nutritio, aliæque actiones naturales, animæ imperio haud subiectæ*, in corpore humano contingunt, quoque demonstrare; verum quia nimis longus fieri cogerer, lectorem ad BELLINI scripta, itemque ad BOERHAAVII vel HOFFMANNI Physiologiam, KEILII libellum de secretionibus animalibus, MICHELOTTUM de *separatione fluidorum in corpore animalis*, aliosque supra laudatos Auctores ablegamus, ubi hæc

b

res

[a] Libr. de usu partium & Wolffius de finibus rerum.

res ex mechanicis fundamentis satis mihi evicta esse videntur, ita ut Medicinæ Mechanicæ, præ Stahlianis in Physiologia nondum probatis principiis, præstantia satis cognosci queat.

Speciatim ratione vegetationis.

24. Unicum solum ratione *nutritionis & vegetationis* hic adhuc addam phenomenon, quod Stahlianæ doctrinæ quam maxime est contrarium: nimirum, quod si nutritio & vegetatio corporis esset in animæ potestate, atque plerorumque *hominum animæ corpus suum magnum, venustum ac robustum desiderant*, sequeretur plerorumque corpora etiam magna, venusta ac robusta esse; verum quantopere etiam anima fere uniuscujusque hominis hoc desideret, tamen plerique ad illam magnitudinem & formam, quam *anima ipsorum maximo desiderio vult, desiderat, exoptat*, non perveniunt; sed plerique minores, minus obesi & venusti manent. Immo e contrario in quibusdam regionibus multi exoptant, ut minores manerent, quam sunt, verum, *anima etiam reluctante, majorem proceritatem quam desiderant, acquirunt*; unde patet, omnia hæc fieri contra animæ voluntatem & non secundum eam, adeoque & vegetatio & nutritio ab animæ directione nullo pacto procedunt.

Stahlii sententia S. S. contraria.

25. Denique sententia Stahlianæ, quod *vegetatio, nutritio & incrementum corporis ab anima directione & voluntate proveniant*, ipsi sacræ Scripturæ, quod nullus, quantum novi, adhuc notavit, aperte est contraria. Stahliani enim dicunt, animam struere corpus, animamque vegetationem & nutritionem ejus perficere; Christus vero ait, (a) *neminem statum suæ cubitum addere posse*. Ergo dum hoc ultimum quam verissimum esse novimus, non solum, quia os veritatis hoc dixit, verum etiam, quia id experientia omnes didicerunt, sequitur, Stahlianam sententiam tanto magis hic falsam esse, quia & sacræ Scripturæ & experientiæ quotidianæ contrariatur.

Quomodo in respiratione.

26. In respiratione autem, quæ actio est *partim animalis, partim naturalis*, res paulo aliter sese habet; hæc enim animæ voluntate dirigi, accelerari nempe ac retardari potest; at tamen sponte quoque, ut *automatum*, nocte dieque viget, quando dormimus & anima de ea nequidem cogitat. Hoc vero inde fieri plures, & speciatim BOERHAAVIUS (b) egregie demonstrarunt; quia scilicet *organa respirationis nervos*, adeoque & spiritus accipiunt *partim a cerebro, partim a cerebello*, atque si hi tantum agunt, sponte æqualis respiratio contingit; sin vero illi, scilicet cerebro prodeuntes, qui animæ famu-

(a) Vid. Evangel. Matth. VI. 27.

(b) In Instit. Med. Cap. de Respiratione.

famulantur, respiratio etiam voluntaria est, & pro animæ voluntate, in magnos usus corporis nostri, atque in multis actionibus voluntariis, exercitationibus corporis, nisibus magnis, ponderibus gravioribus elevandis, modo accelerari, modo augeri, sive profundior ac fortior fieri potest.

27. *Unam adhuc haud levis momenti controversiam, quæ inter Stahlianos & Mechanicos intercedit, prætermittere hic non possum, antequam ulterius pergam, quæ est, quod Stahliani cava nervorum adeoque & subtilissimam illud liquidum nervum sive spiritum, ut plerique illud cum veteribus appellare malunt, HIPPOCRATI partes impetum facientes dicti, quod in iis movetur, atque ita & omnes actiones, usus & effectus, quos Medici alii a longo tempore cerebro, nervis & spiritibus adscriperunt, negent, eosque omnes usus & effectus, forte ut quam brevissime se semper in difficultatum multarum resolutione expedire queant, animæ adscribant. Mechanici vero Medici & cava nervorum & liquidum nervum sive spiritum admittunt, eosque simul usus & actiones; quos veteres ipsis adscriperunt, quoque tribuunt, atque ab horum legitimo e cerebro & medulla, quæ in spina est, per fibras minimas in partes influxu, sensum, motum, nutritionem & actiones harum deducunt. Atque ut brevitatæ causa alias demonstrationes jam taceam, quæ a BOERHAAVIO (a), Burgravio (b), & me (c), magna sat copia prolata sunt, vel unicam tantum nunc commemorabo, quam Stahliani evertere hæcenus non potuerunt, nimirum quod nervo ligato, sensus, motus & nutritio partis solantur, quæ eo non ligato in corpore sano vigeant. Stahliani sensum & motum, qui manifeste per nervos perficiuntur, non spirituum per hos influxui, sed certæ cuidam vellicationi, tensioni aut vibrationi nervorum adscribere volunt, quam anima in actionibus illis efficeret. Sed præterquam quod hanc tensionem sive vibrationem nullo modo probaverint, neque sensibus percipi queat, non video, quomodo filum, quo nervus aliquis ligatus aut constrictus est, tensionem, vibrationem, tractionem, aut quacumque alia ratione hanc animæ actionem appellare velint, impedire possit. Contra si cum Mechanicis ac veteribus Medicis statuitur, actiones nervorum prædictas fieri per influxum liquidi alicujus subtilissimi summeque mobilis, clarum erit, quare actiones & effectus,*

*Liquidum
nervum
dari pro-
batum con-
tra Stah-
lianos -*

b 2

Etus,

(a) In Instit. Medic. §. 274. & seqq.

(b) De existent. spirituum

(c) In compend. meo anatomico §. 301. quæ ab iis, qui eas adhuc ignoreant aut non legerunt, legi ac probe perpendi mereantur.

etus, qui antea a transitu eius fiebant, nunc iis ligatis impediuntur, aut prorsus tollantur.

28. Nec obstat, quod regerant, hoc liquidum subtilissimum nerveum & cava in fibris nerveis conspici non posse; cum sciamus & quam manifestissimum sit, succum valde crassum in vegetabilibus per fibras eorum, quæ revera subtilia vascula sunt, & speciatim per pedunculos, verbi causa cerasorum, prunorum similiumque fructuum, transire, indeque fructus, carnem satis crassam non solum, verum ipsius nucleï duri substantiam, longe adhuc crassiorem, transiisse; cum tamen in fibris sive vasculis horum pedunculorum nulla cava æque ac in nervis appareant. Ex effectibus vero, sicut aliis multis in rebus, per certissima ratiocinia de rei veritate dictis in fructibus & nervis æque certe persuaderi & convinci possumus, ac per manifestissimas demonstrationes geometricas alias fieri solet; dum talia argumenta & observationes fortissimarum demonstrationum vim obtinent, iique profecto nimis crasse de Spiritibus seu liquido cerebri & nervorum atque cavis horum judicant, qui illud tam crassum, hæc vero tam ampla esse putant, ut oculis conspici queant aut debeant: dum cava vasorum non solum pedunculorum dictorum fibris, verum & in multis rebus aliis, ac præsertim etiam in insectis perexiguïs, maxime pedibus ipsorum conspici non possumus; ubi tamen ex effectibus & actionibus eorum, vegetatione scilicet, nutritione aliisque phænomenis vascula & cava in his existentia, quæ liquidum vehunt, revera adesse, quam certissime persuademur.

29. Unicam vero adhuc superesse video objectionem, quam Stahliani Medicis Mechanicis objicere solent, de primo in corpore humano motore. Nam dicunt, quamvis etiam partium, quæ functionibus naturalibus famulantur, fabrica, organa & aptitudo ad motum certasque perficiendi actiones adsint, tamen quis est, qui motum cordis auspicatur, adeoque quisnam est primus ejus motor? Partes corporeas ad motus inchoandos ineptas esse dicunt, adeoque necessario ab anima eos inchoari, atque deinde etiam, quamdiu vivimus, continuari. Veram respondemus, hoc nullo modo verum esse, quod corporeæ sive materiales partes, mechanica structura præditæ, per se & sine anima rationali ad motum ineptæ sint, nam hoc refellunt quam manifestissime automata, ut horologia, veru, automatum, aliaque, quæ vel elateris vel ponderis ope motum inchoant & continuant; hoc refellunt etiam mole, quæ vel aqua vel vento moventur, sine anima rationali, aut alia qualicumque.

Quoniam vero factus rudimenta, ut in feminibus plantarum, faba, verbi gratia, phaseolo, piso, &c. ita & in ovo mu-

Alia ob-
jectio de pri-
mo motore
est.

muliebri, dum DEUS & natura magnam inter plantarum & animalium generationem, ut recentiores Botanici demonstrarunt, (a) analogiam servat, existunt, dum ovulum muliebri in concubitu a semine virili fecundatur; staminibus sive rudimentis ejus hoc ipso motus & vita a parente impertitur; id quod ovuli post coitum intumescencia & incrementum demonstrant; hunc motum postea hac ratione per vim elasticam illorum rudimentorum, quæ fibræ sunt, dum quolibet fibra, quodlibet vasculum corporis animalis vi elastica a Deo præditum est, quam paucis ab imprægnatione diebus punctum, saliens dictum, in ovo incubato ostendis, (b) ceteraque fabricam mechanicam jam ante imprægnationem præsentem, licet adhuc subtilissimam; sicut forte in minimo, quod existit, insecto, continuat, sensim quando partes robustiores fiunt, auget, atque tamdiu ob eandem causas continuat, quamdiu animal vivit & sanum est, sicut id suprâ §. 28. jam prolixius exposuimus, ita ut ex his satis patere existimem; præsertim, quia hæc res eodem modo in brutis animantibus, ut in homine contingit, nullam animam rationalem ad actiones naturales & vitales vel auspicandas vel continuandas & perficiendas necessario requiri; sed ex solis causis mechanicis fieri posse, atque etiam revera fieri; præsertim, cum de anima hoc nullo modo, ut sæpius jam diximus, probatum sit.

30. Sed tempus nunc est, ut ad Pathologiam me conferam, & atque etiam præstantiam Medicinæ Mechanicæ præ Stahlia & in hac evincamus. Quoniam autem in Physiologia præter opinionem paulo jam prolixior fui; brevior in Pathologia esse studebo; id quod tanto melius fieri poterit, quia multæ veritates Pathologiæ jam ex præmissis facile demonstrari possunt. Ut exempli causa, quando Stahlia volunt & statuunt, animam humanam rationalem causam esse tam ætiosum in statu naturali, quam in statu p. n. & speciatim febrium, inflammationum, dolorum, spasmodum, sanguinis profusionum spontanearum, distensionum nervorum sive convulsionum, relaxationum nervorum, epileptiarum, et si qui sunt alii, hosque morbos non esse nisi molimina sive conatus, ut vocant, naturæ salutares, quibus noxium e corpore expellere studeret.

[a] Vid. CAMERARIUS de sexu plantarum, VAILLANTIUS de florum structura, van ROYEN de amiribus & continubis plantarum; itemque LINNAEUS in script. suis botanicis.

[b] Vid. MALPIGHIUS de ovo incubato, BAYLI Instit. physico

An morbi
sint moli-
mina na-
tura.

31. Verum admodum lubrico & infirmo stare fulcro hanc sententiam, ex eo rursus facile patere arbitramur, quod *nima non solum harum actionum*, quod scilicet eas exciter, sibi haud sit conscia; sed e contrario, si in ejus potestate hæc res præter naturam essent positæ, *ear potius impediret*, aut alia saltem eaque longe securiori & blandiori ratione noxium e corpore, quam molestis illis dolorificis, & sæpe horrendis, ut in epilepsia, ac periculosis actionibus expelleret. Immo si anima rationalis, *quam ad avertenda omnis generis vitia & interitum corporis semper intentam esse fingunt Stahliani*, intelligeret aut cognoscere posset mala imminetia, causas eorum maturius & mox in principio, dum malum adhuc parvum est, per consueta corporis excernicula eliminaret, antequam, ut Poeta canit,

-- per longas invaluerit moras.

Verum si animam nostram interrogamus, quando male valemus, *an ipsa ejusmodi mala morbi que presentis causas cognoverit*, præviderit, atque vel febrem, vel inflammationem, vel dolores, vel hæmoptysin aut epilepsiam, vel alium ejusmodi morbum *produxerit*, illa *hoc negabit*; & numquam in mentem hoc sibi incidisse affirmabit, immo se causam vel auctorem esse horum malorum & tumultuum, qui jam nos tam misere affligunt, Stahlianis in faciem negabit, atque injuria ea ipsi, quæ non fecerit, tribui constanter asseverabit.

Et profecto anima rationalis, quæ *ens cogitans* haud prorsus inepte a CARTESIO appellatur, quia natura ejus non melius, quam per cogitationes nobis innotescit, eamque a corpore hac ratione distinguit, *conscire profecto deberet*, quid agat, aut quod nuperrime egerit, quemadmodum & aliarum rerum, quas perficimus aut nuperrime adhuc perficimus, præsertim si ad eas serio attendimus, conscii sumus. Verum quantopere etiam mente ad res has reflectamus, tamen *numquam ex ea intelligere possumus, quod hæc faciat*, multominus, quod id certo demonstrari queat; adeoque fundamentum morborum ac medicinæ practicæ nimis infirmum & incertum præbet, & injuriam ipsi inferunt, dum injuste *animæ innocenti tribuunt facta mala, quæ numquam perpetravit, aut perficere voluit*, & de quibus antea numquam cogitavit.

Stahlianorum
sententia de
caussa hæ-
moptysis.

32. E contrario sunt quamplurima, quæ hanc Stahlianorum sententiam labefaciunt, aut potius prorsus evertunt: quorum speciminis loco nonnulla nunc tantum, ob nimiam prolixitatem evitandam, ex quamplurimis hic proferam, quæ jam olim aliquando Medicis ita sentientibus oppo-
sui.

fui. (a) Nimirum primo causam sputi cruenti, quod hæmoptysin vulgo vocant, Stahliani non morbo aut vitio culpando, sed prudenti animæ consilio sive decreto adscribunt, ut corpus hac ratione ab abundante & noxio sanguine liberet: igitur animam aperire vel disrumpere vasa pulmonum, atque supervacaneum sanguinem in salutem sui corporis expellere perhibent, ut postea reliquis in vasis sanguiferis & cæteris visceribus commode pro corporis sanitate ac vita conservandis circummagi atque officia sua præstare possit, hæcque etiam prorsus ratione de aliis quoque profusionibus sanguinis indicare & sentire solent.

33. Verum hæc morbi hujus sæpe periculosissimi ætiologia Medicis Mechanicis minime satisfacit, adeoque nec pro vera ab iis sumi potest. Nam primo anima rationalis profecto non rationalis aut prudens, sed irrationalis & stultissima esset dicenda, si in homine, præsertim sapiente (dum sagacissima ingenia sæpe hoc morbo afficiuntur) ad sanguinem abundantem expellendum, vasa pulmonis, visceris adeo nobilis, & ad vitam & sanitatem adeo necessarii, tanto cum vitæ periculo perumperet; quia inde non raro tanta sequitur sanguinis profusio, ut quandoque una cum sanguine ipsa anima effundatur; aut ob difficilem disrutorum vasorum visceris hujus, perpetuo in motu constituti, glutinationem, ulcus sæpissime pulmonis sive phthisis & mors ipsa subsequuntur. E contrario si anima deliberato consilio, ut Stahliani dicunt, & pro arbitrio sanguinem abundantem in corporis sui salutem & conservationem expellere posset, locum, unde nullum, vel saltem non adeo magnum detrimentum esset metuendum, nates scilicet vel anum, pro hac excretionē eligeret; verum hoc hic non fit, sed per pulmones, reluctante etiam anima, expellitur.

Porro si anima ejusmodi hominis, qui hæmoptysi graviori laborat, aut aliquando laboravit, quæritur, an hanc laticis vitalis incongruam evacuationem effecerit? ejus facti non modo sibi non est conscia, verum potius contrarium affirmat, omnibusque viribus sanguinis e pulmonibus profusionem periculosam inhibere ac impedire studet. Itaque secundum Stahlianos anima hujusmodi ægri vult & efficit hanc sanguinis rejectionem; sed si animam sive ægrum ipsum examinamus, an hoc verum sit, anima hujus nominis hoc negat & eam potius cohibere magnopere adlaborat. Quomodo itaque anima, in una eademque re, velle & etiam simul anxie nolle, & duo manifeste contraria simul & desiderare & facere

(a) In dissert. de morbis adolescentium & juvenum Hippocratis, jam Ann. 1722. 4. Helmstädtii edita.

possit, cum sana ratione & prudenti ratiocinio nulla ratione continere mihi videtur; sed potius a Philosophis omnibusque prudentioribus pro re contradictoria, immo prorsus absurda habetur, quæ in una eademque rationali animali anima simul subsistere haud possit. Immo animum asseverare, *numquam rationalem aliquam animam de excitanda suo corpori hæmoptysi vel solum serio cogitasse, saltem numquam ejusmodi vidi.* Quamplurimi contra sunt & fuerunt prudentissimi homines atque inter hos etiam Medici egregie docti, qui non modo omni animi contentione, sed etiam remediis quibuscumque præstantissimis sanguinis hanc profusionem e pectore prohibere sibi studuerunt; (quia animæ ipsorum eam valde noxiam & quam sæpissime funestam esse probe cognoverunt;) *verum animæ hæc frustra omnibus suis conatibus & actionibus nihil hac in te efficere potuerunt;* sanguis enim e pulmonibus, quicquid etiam egerint, prorumpere non cessavit, atque tandem propterea e vita quam maxime inviti decedere coacti sunt.

*Quænam
causæ a
mechanicis
hujus
mali indi-
centur.*

34. Unde satis patere existimo, *animum rationalem non esse causam periculosissimi hujus mali,* eique hanc actionem jure nulla ratione tribui posse, sicut Stahliani injuste faciunt: dum anima egri longe aliud, immo profus contrarium vult & agere conatur; sed aliunde causas hujus mali esse repetendas. Videamus igitur nunc, *an Mechanici magis certas ac perspicuas; magisque rationales hujus morbi causas reddere valeant;* cum Stahliani non nisi causas a ratione & experientia prorsus alienas hic exhibuerint. Scire igitur juvabit, ex prudenti ordinatione divina, ob sufficientem rationem in juvenibus, quibus hic morbus frequentissimus jam ab HIPPOCRATIS tempore observatus est; (*a*) *ut plurimum plus sanguinis confici, quam pro eorum nutritione & conservatione requiritur,* ut nimirum materia pro eorum uberiori incremento, sine qua alias eorum corpora ad debitam perfectionem pervenire non possent, præsto sit. Quando vero corpus tandem non amplius expanditur, cibi tamen & potus desiderium in eis, sicut plerumque fieri solet, bene viger, immo hæc ætas ingluviæ & voracitati plerumque indulget, hinc a ventriculo & intestinis vegetis ac valentibus plus chyli, atque a cæteris visceribus bonis ac robustis plus sanguinis conficitur, quam ad conservationem eorum requiritur; adeoque copiosior hic chylus & sanguis vasa sanguifera & viscera, ac speciatim pulmones, plus justo replet ac distendit, quem statim corporis plethoræ vulgo appellant, id quod ratio & experientia docent, atque Stahliani

ni

ni ipsi concedunt. Vasa etiam ac viscera molli sanguinis aliquamdiu & sæpe multum cedunt, antequam vasis ruptura aut morbus aliquis inde producat. Sed quemadmodum canales, per quos aquæ ducentur, vel oræ rivulorum aut fluviorum, vel aggeres etiam circa littus oceani, vel a copia aquarum nimia, vel ab impetu earum, *iis præsertim in locis, ubi debiliores sunt*, adeoque vi aquarum minus resistunt, perfranguntur, vel foramina quædam canalium minora valde dilatantur ac prorsus diffinguntur, ut tandem modo minor, modo major aquæ moles ex terminis suis erumpat. Ita nimia sanguinis moles cor, pulmones & arterias vehementius distendens, eas ad fortio-rem veniunt & constrictionem excitat, aut vehementior ejus a quacumque causa agitatio, qualis esse potest, exercitatio sive motus voluntarius fortior, vini potus largior, salia acrida aut bilis acrior in sanguine, vasa, quibus coercetur, in locis debilioribus aut minus venientibus sæpe disrumpit, aut foraminula eorum insensilia, quæ poros vulgo vocant, ita diducit, ut nunc minori, nunc majori copia prorumpat. Quod si in pulmonibus contingat, oritur hinc ille morbus, de quo hæcenus egimus, nimirum hæmoptysis; si in alio in loco, alia hæmorrhagiæ species: Ad quod pro partium corporis diversa innata aut aliunde acquisita debilitate, fortuitum plane esse & non a naturæ Stahlianæ directione, multis rationibus vel observationibus persuademur.

35. Nullo enim modo Stahlianis credere hic possumus, evacuationem hanc sanguinis per pulmones prudenti ac deliberato animæ consilio fieri; verum si sanguis ibi prorumpit, hoc vel casu mere fortuito, ob pulmones in hoc reliquis partibus debiliores accidere, vel externis causis eam adscribendam esse censemus. Ut enim canales hydraulici, per quos aquæ du-
tuntur, & aggeres fluviorum vel oceani modo in hoc, modo in alio loco, non certo consilio, sed fortuito, ubi natura debiliores sunt, vel ibi, quo impetus aquarum maxime vergit, & ubi accolæ hoc sæpius quam minime expectant; ita etiam in corpore humano, ubi partes aut vasa debiliora, ut jam dictum est, sanguinem copia & impetu, vel & acrimonia forte simul urgentem transmittunt. Unde fit, ut in multis per narium vasa erumpat; in aliis per pulmones, tanquam viscum in juvenute valde adhuc tenerum ac spongiosum; in aliis per ventriculum, intestinum rectum, vel per urinae vias, aliave loca profluat; prout homo forte hanc vel illam præ aliis partem habet debiliorem. Nam verissima esse deprehenditur illa CELSI observatio, (ad quam Stahliani non satis attendunt) magni in Medicina usus, quando scribit: (a) Neminem facile esse, qui

Stahliani
uberius
hanc ob-
servationem
confu-
santur.

non

non habeat partem aliquam imbecilem; adeoque etiam frequentissime observatur, in eis, qui sputo cruento sunt obnoxii, pulmones vel natura, vel ob causam quandam violentam esse debiles, atque ut plurimum simul sanguinis abundantiam, ac motum ejus fortiozem, id quod ex florido faciei colore, quem plerumque hi homines, antequam nimis debiles sunt, præ se ferunt, dignosci solet, hic peccare. Ut de causis externis, quæ hæmoptysin producere solent, contusionibus scilicet, lapsibus, saltationibus, vehementioribus aliis motibus quibusque, vociferationibus vehementioribus, vulneribus pulmonis, &c. quæ causæ omnes mechanica ratione agunt, brevitate causa nihil dicam, utpote, quæ non tantum sputum cruentum producere solent; verum etiam pulmonibus inde semel debilitatis, efficiunt, ut, curata etiam semel hæmoptysi, ex levi causa, ob partem jam debilem, alio tempore facile redeat: eaque profecto non ob animæ in hoc negotio prudentem aut salutarem actionem, sed ob rationes mechanicas indicatas, pulmones scilicet debilitatos, sanguinisque copiam aut impetum sustinere non valentes; unde facile denuo rumpuntur, & malum pristinum redit. Igitur cum causæ hic adsint adeo manifestæ, physicæ & mechanicæ, hujus morbi, quid opus est ad incertas, nunquam probatas, immo & sanæ rationi manifeste adversantes actiones animæ confugere, easque tanquam veras eruditibus ac discentibus obtrudere velle? Nam revera illa anima, quæ hæmoptysin induceret, cum loco securiore sanguinem expellere posset, merito pro stultissima esset habenda; quia hoc ipso non sanitatem, sed plerumque interitum corpori procurat. Atque hoc modo quoque de aliis sanguinis profluviiis periculosus, ut vomitu & mictu cruento, sentiendum esse judicamus; quæ potius prudentiori modo avertere deberet, si ipsa ejusmodi vim in corpus, qualem Stahliani, ipsi reluctanti & neganti, obtrudere volunt, haberet.

*Febrim
caussa
Stahlia
impugna-
tur.*

36. Progrediamur nunc ad febrium quoque causa ex mente Stahlianorum examinandam. Hanc quoque nihil aliud esse perhibent, quam conatum animæ, prudenti consilio noxium, quod ipsa in corpore cognosceret, in ejus utilitatem ejiciendi. Verum febrem inde quam minime deduci posse hinc judicant Mechanici, quia anima ægri, febri quadam laborantis, neque ante accessum febris aliquid adeo noxii in corpore suo cognoscit, dum quamplurimos ægros inopinato invadit, neque ut plurimum in ipsa febri, quid noxii in corpore sit, aut ubi hæreat, quod eliminandum est, novit. Provocamus ad testimonium, fidem & experientiam omnium eorum, qui vel semel vel sæpius febri quadam laborant, an anima ipsorum tale quid cognoverit? omnes enim, quos hanc ob rem examinavi, hoc negarunt, animæque ipsorum talis

zalis cognitionis aut scientiæ haud erant conscia. Mirandum esset, si anima noxas tales in corpore suo cognosceret, quare non in principio & citius, quam causa peccans in salutem copiam, vel in tam malum, ut saepe fit, morem increpceret, qualis præsertim in febribus malignis observatur, ubi multi fere moriuntur, antequam se egrotare recte percipiunt, leviori minisque periculosa ratione in tempore, hoc est, in primo initio, illud malum e corpore expelleret.

37. Præterea in febribus intermittentibus paroxysmus ægros sæpe tempore quam maxime incommodo invadit, ubi ægri, præsertim Magnates, aut qui his sunt a consiliis, vel auxiliis, vel belli Duces, aliique haud raro gravissima negotia expedienda habent. Si ab anima actus ille paroxysmi dependeret, anima prudens vel alia ratione a malo illo se liberare studeret; vel saltem, si sine paroxysmo negotium hoc expedire non posset, aliò eoque magis opportuno tempore, quia in intermittentibus plerumque non adeo magnum periculum est in parva mora, eum institueret, dum ab anima, secundum Stahlianorum sententiam, tota res dependet. Verum ægri, licet hoc quam ardentissime sæpe velint, tamen illud omni animæ vi conatu & sollicitudine obtinere nequeunt; sed paroxysmus statò tempore redit, sicut in horologiis statò tempore hujus vel illius horæ numeris, secundum mechanicas horologii leges, insistit. Itaque potius ille reditus regularis paroxysmi mechanicas magis rationes, quemadmodum horologium, veru automatum, clepsydra, aut aliæ similes machinæ, habere videntur, quam animæ directionem; quæ vero de re infra plura. Quomodo enim ab hac oriretur, quia anima hominis libero arbitrio prædita est, ut ille qui sui juris esset, paroxysmum talem eo tempore institueret, quo ipsi minime molestum esset? Verum hoc animæ suæ voluntate & imperio efficere non valet. Anima igitur ejusmodi hominis maximo sæpe ardore ac molimine vult, (quod Stahliani negare non possunt) ut paroxysmus febris vel omnino avertatur, vel ut saltem in magis opportunum tempus differatur; Stahliani contra quoque dicunt, animam ejusmodi hominis re vera illum paroxysmum, eundemque prudenti deliberatione atque consilio concitare: itaque una eademque anima eodem tempore, secundum Stahlianos, paroxysmum vult & non vult, ideoque duo contraria in una eademque re & uno eodemque tempore desiderat, id quod profecto absurdum ab omnibus Philosophis habetur, atque ab una eademque anima prudenti & quidem tam sæpe proficisci posse, nulla ratione verisimile videtur: præsertim cum id fiat, quod anima manifeste non vult.

38. Atque idem absurdum: haud adeo difficulter ex convulsionibus & epilepsia ejusque horrendis ac periculosissimis paroxys-

Etiam in febribus intermittentibus.

Et veritas alius in morbis.

roxys-

toxyſmis, itemque ex inflammationum, angine, ophthalmiæ, peripneumoniæ, pleuritidis, apoplexiæ, vigiliarum involuntariarum, abſceſſuum, fiſtularum, ſtrumarum, tumorum cysſicorum, dolorum, calculorum, ſuffuſionum, herniarum, aliorumque quamplurimorum morborum generatione demonſtrari poſſet; quos omnes tamen Stahliani promiſcue ab anima voluntate & prudentiæ ejus directione in ſalutem corporis produci perhibent, atque contra omnem ſanam rationem credenda tironibus commendant: quamvis hæc ſententia, ut ſæpius jam monuimus, ab ipsis non ſolum non probari, ſed potius contrarium, ſicut modo de febribus earumque paroxyſmis diximus, quod ſcilicet ex mechanicis & phyſicis cauſis, vitio ſcilicet vel partium ſolidarum vel fluidarum, omnes hi morbi oriuntur & producuntur, facile demonſtrari & evinci queat.

Cauſſa fe-
brum me-
chanica
indican-
tur.

39. Ut tamen veram, aut ſaltem magis, quam Stahlianorum eſt, veriſimilem ſententiam de cauſſa februm, ex certioribus phyſicis & mechanicis fundamentis, producamus, ex phaenomenis earum judicandum; atque, cum in omni febris motus cordis atque arteriarum naturali velocior, percipiatur; id quod Stahliani, experientia edoſti, concedunt; aliquid præter naturam in februm generatione in vaſa ſanguifera adeoque & in cor ingredi, (quod Stahliani quoque non negabunt,) quo illud, præſertim quia intruſ ſenſili tunica inveſtitur, una cum arteriis, ad frequentiores motus excitatur; unde motus ſanguinis neceſſario augetur; ab aucto vero iſto motu, & attritu vaſorum globulorumque ſanguinis inter ſe oritur (ſicut vulgaribus mechanicis experimentis quam plurimis conſtat) calor auctus, quem præter naturam vocamus, atque ex hoc poſtea ſiccitas oris & faucium, unde tandem reliqua februm accidentia, ut ſitis, dolor capitis, vigiliæ, anxietates, inquietudines, deliria, aliaque ſymptomata, immo & ipſa mortis cauſſa haud adeo difficulter deduci poterunt.

Et uberius
proban-
tur, primo
ex bile.

40. Quo vero hæc cauſſa febris proxima, quam ſtatuiſmus, atque ex phaenomenis demonſtraviſmus, uberius probetur; conſideremus paululum cauſſas februm nonnullas remotas, ex quibus febres ſæpe ſequi experientia, optima rerum experimenta, jam docuit: Oriuntur nimirum febres, & intermittentes & continuæ, ſæpe poſt iram, quod forte nemo negat. In ira bilem, quæ liquor eſt in ſtatu ſecundum naturam jam ſanguine acrior, longe majorem adhuc acrimoniam acquirere; morſus hominum aliorumque animalium ira percuſſorum, ſatis evincunt. Quando igitur acrior ejuſmodi bilis poſt iram vehementem, eaque majori, quam par eſt, copia in ſanguinem impellitur, facile concipi poteſt, quod cor atque arteriæ, partes egregie ſenſiles, fortius quam alias, atque eodem

eodem fere modo irritentur, ac si acre quid in oculos incidit, qui inde in contractiones frequentiores adigitur, quibus anima resistere non potest; quæ etiam prius haud cessant, quam causa illa irritans rursus ex oculo expulsa vel ita correctæ est, ut stimulare amplius nequeat. *Si itaque aliud ejusmodi irritans præter naturam in sanguine hæere cogitas, simili ratione cor & arteriæ, aliæque partes sensiles in frequentiores contractiones, etiam contra animæ voluntatem sollicitantur, quæ adeo vehementiores erunt, quo vehementior illa causa irritans est, quæque etiam non prius cessant, quam irritans illud vel correctum & ad blandum morem redactum, vel e corpore eliminatum sit; vel donec ægrum, si corrigi aut expelli non possit, interfecerit. Posse vero bilem aut alios humores acriores partes prædictas in motus vehementiores & p. n. concitare, uberius probamus ex eo, quod sæpissime post iram venter vel ad vomitum, vel intestina ad fluxum alvi, immo haud raro ad choleram ea stimulentur; ubi humores acres & per vomitum & per alvum vehementissime rejiciuntur: qui vero morbi omnes ablato stimulo illo irritante p. n. ut experientia & præstantissimi quique practici testantur, tolluntur.*

41. *Febris quoque, sive motus illi cordis & arteriarum frequentiores, cum calore p. n. sæpe concitantur a crapula, sive copiosiori vini aliorumve inebriantium potione. Hæc enim cum particulas acres irritantesque, larga copia possideant, in promptu ratio est, cur cor & arterias ad illos motus velociores excitare, atque sic febrem producere valeant. Cum vero & aliis quamplurimis causis, ejusmodi irritantia in sanguine produci queant, quæ cor contra voluntatem animæ irritare apta sunt, immo spina infixe, festuca ossium aut alia res p. n. in vulneribus hærentes & nervos irritantes febres concitent, pater inde ex aliis jam dictis rationibus quam manifestissime, Stahlianam hypothesein circa febrium causam, valde incertam, aut prorsus falsam esse; cum cor, ut probatum est, agat contra voluntatem animæ: e contrario Mechanicorum sententiam ex observationibus certis, phænomenis, causis, itemque ex effectibus clare demonstratam esse.*

42. *Quemadmodum vero varia in sanguine acria febrem producere possunt, ita & sanguis tenax, & viscidus mechanica quoque ratione eam concitare valet, sicut demonstratu haud adeo difficile est, atque ex eadem hac causa ratio paroxysmorum, qui in febribus intermittensibus occurrunt, egregia quoque dari potest. Viscidum vero in his febribus sæpe, si forte non semper, peccare prudens & expertus Medicus facile negare nequit; dum id rursus probant causæ remotæ, ut victus errores,*

*Deinde ex
crapula a-
liisq; ir-
ritanti-
bus.*

*Febris et-
iam a vi-
scido o-
riuntur.*

rores, cibi crudi, duri, crassi, viticidi, difficilis concoctionis, iique præsertim magna copia assumpti & non probe digesti; deinde *bonitus & rejectio materie valde tenacis ac viscidæ*; denique *stagnationes humorum in vasis*, ac præsertim *cutis*; unde ob motum ibi sublatum pallor & frigus itemque os siccum & sitis oriuntur. Quando autem vasa minima a materia illa viscidæ, quæ sensim parietibus minorum vasorum adhæret, fere obstructa; adeoque sanguis a corde projectus libere ea transire nequit, majori copia, quam par est, in arteriis & in corde tandem accumulatur; hæ partes necessario inde solito magis distenduntur, fibræ autem earum nerveæ musculosæ & elasticæ, quo magis distenduntur; eo magis renituntur & ad contractionem instigantur; ut ex mechanicis patet, adeoque eo fortius reagent, ac simul eo fortius etiam in sanguinem viscidum agunt; eum vehementius commovent, exagitant, compellunt, comminuant, calefaciunt, atque tandem comminutum rursus propellant. Hinc eo tempore frigus ægri mutatur in calorem, pulsus parvus in magnum ac frequentem, hisque aliquamdiu continuatis, humoribus viscidis sic rursus *digestis ac resolutis*; tandem in toto corporis ambitu *tanquam resolutionis effectus*, prodit *sudor copiosus*, & *tum urina multæ particule crassæ, viscidæ, terrestræ*, lateribus tritis sæpe similes, expelluntur, quæ demonstrant, sub actu hoc mechanico sanguinem crassiorem non solum atteri ac digeri; verum etiam ipsum re vera rursus fuisse digestum & attenuatum, atque simul quoque magnam mox materię febrilis copiam & per sudorem & per urinam rejectum: Quo facto, dum, *libero circulo sanguinis iterum restituto*, illa cordis atque arteriarum distentio violenta cessat, cessat etiam *violenta illarum contractio*; pulsus fortior & calor p. n. in statum naturalem redeunt; atque *sic paroxysmi finis est*.

De reditus
paroxys-
morum
ratione.

43. Quando autem, hoc absoluto, nova ejusmodi materia vitiosa ex primis viis, quæ ex erroribus dietæ ibi genita est, ut e ventriculo, vel intestinis, hepate aut vesicula fellea, vel etiam ex pancreate, glandulis intestinorum, aliave quacumque parte, per vias consuetas chyloferas ad sanguinem influit, parva quidem copia ad stagnationem ejus producendam non sufficit, adeoque nec paroxysmum mox producere potest. Quando autem sensim sensimque in vasis sanguiferis *materia illa noxia magis augetur*, (id quod ad certam ac sufficientem copiam in ea vehendam certum tempus requirit,) fit, ut *determinato tempore tandem novus paroxysmus rursus producat*, & ut ægri jam ante paroxysmum lassitudinem, *oscillationes & pandiculationes*, tamquam *initia obstaculorum libera circulationis* perferant, donec tandem ipse novo horrore

rore

rore & frigore, ut antea, ægrum invadat. Sed hæc ex pathologia, ad demonstrandum, quod Mechanica Medicina Stahlianam præstantiam superet, retigisse hic sufficiat. Pergamus ad therapiam sive Medicinam practicam, ut ex hac quoque eminentiam ejus ostendamus.

44. Quoniam vero in præcedentibus satis evicimus, Stahlianam primariam de animæ in corpus potentia fundamenta non nisi falsas aut dubias esse hypotheses, quas probare, aut evidentes ac certas reddere nondum potuerunt, idcirco forte non opus esset, ut speciatim hic ea adhuc uberius refutem, quæ in curatione morborum caducis hisce fundamentis superstruuntur. Verum ut tanto melius Mechanicæ Medicinæ & in curatione, tanquam principe Medicinæ parte, præstantiam demonstrarem, nonnulla etiam hic speciminis loco adducemus, atque inter hæc prius generalia quædam considerabimus, & postea ad speciales quosdam morbos progrediemur. Inter generaliora autem Stahlianorum fundamenta merito referendum est, primo, quod animæ ejusque prudenti directioni vim omnes morbos & producendi & rursus sanandi, corpusque a morbis liberandi, audacter adscribant. Verum quia hæc vis sive potentia non magis probata est, quam quod actiones naturales & p. n. excitet, sicut in præcedentibus ostendimus; nullæ autem propositiones, aut sententiæ, de quarum veritate non constat, in rationali Medicina sint assumendæ, ideoque & hæc pro vera assumi non potest.

Animam vim sanandi habere, negatur.

45. Denique cum in scriptis Medicorum ab Hippocratis usque temporibus vocabulum NATURÆ sæpius occurrat, ut v. g. quod natura sit morborum medica, quod Medicus sit natura minister, quod natura cum morbo luctetur, quod bona aut robusta natura magnum in curandis morbis sit auxilium; debilis contra Medicum & egrotum in curatione deserat, atque sine naturæ auxilio eum nihil efficere posse; multos morbos sponte natura, sæpe sine Medico & medicamentis sanari, præsertim apud vulgum & pauperes: hinc cum, quid hoc natura vocabulum sibi velit, STAHLIUS & affectu ejus intelligere non potuerint, eam tandem, contra omnem præcedentium Medicorum sententiam, in opinionem, quod anima rationalis hæc natura sit, venerunt, hisque duobus vocabulis animæ & naturæ pro synonymis, sicut supra jam §. 4. diximus, ut sunt, atque sic, quod Hippocrates, Celsus, alique Medici natura, id Stahliani animæ tribuerunt. Verum quamvis vocabulum hoc quamplurimas habeat significationes, sicut ex controversia, quam Celeb. STURMIUS & SCHELLHAMMERUS publicis scriptis quondam de hac re agitarunt, iremque BAYLII Institut. physicis & aliis quamplurimis videri potest, adeoque subinde aliquam obscuritatem invol-

Naturam esse animam, negatur.

involvat; tamen in morborum curatione animam hoc nemine haud intelligi posse, ex multis patere potest documentis, quorum nonnulla tantum pro sententia nostra roboranda nunc proferemus.

*Naturam
fabricam
corporis
esse, pro-
batur.*

46. Nimirum quando dicitur, *hunc hominem gaudere bona aut robusta natura*, profecto anima hic nullo modo *naturæ* vocabulo intelligi potest; sed potius *robustum corpus*, sive, quod idem est, *robusta corporis fabrica*, quæ sæpe vix credenda perfert: atque plerumque ea gaudere dicuntur rustici ac plebei, milites, juvenes, &c. Contra *debilem naturam habere perhibentur* is, qui *debile corpus*, sive *imbecillam corporis fabricam obtinent*, & qui propterea multa perferre nequeunt: atque inter imbecillos hos plerumque referendos esse CELSUS ait, *magnam partem urbanorum, omnesque pene litterarum cupidos*. (a) Si anima esset natura, *eruditis potius & sapientibus natura robusta esset* adscribenda; id quod vero est contra experientiam, dum *urbani homines & litteris dediti fere semper minus robusta natura gaudeant*, sæpiusque & periculosius quoque ut plurimum ægrotent, quam *rusticæ ac plebei*, qui duris laboribus se sustentant, atque injurias aeris ac victus, quam imbecilli perferre non possent, sine omni incommodo sæpissime perferunt, atque etiam, si aliquando ægrotant, sæpe sola natura a morbis rursus liberantur. Adeoque ex his etiam clarissime patet, in Medicina non animam, sed corporis fabricam, sive de natura robusta sive imbecilla sermo sit, & a vulgo & ab eruditis intelligi. Ita etiam juvenibus præ senibus robusta adscribitur natura, atque in illis etiam facilius omnes fere morbi, & speciatim vulnera, ulcera, luxationes, fracturæ, febres, &c. curantur: non quod anima ipsorum anima senum sit sapientior; sed quia, experientia teste, illorum fabrica corporis magis integra & vegeta, adeoque seniorum fere jam destructa robustior est.

*An hæc
prudentes
actiones
perficere
queat.*

47. Sed Stahliahi regerunt, si natura corporis esset fabrica, quæ in rebus mere corporeis consisteret, hanc tanta prudentia neque in statu naturali agere, neque in statu p. n. tanta sapientia noxium corrigere, atque e corpore eliminare posse, quam in morborum plethorumque curatione fieret; ergo rationale principium, anima scilicet, hoc dirigeret: dum modo per hæmorrhagiam quandam, modo per sudorem, modo per alvum aut urinam, &c. illud expelleret, atque hac ratione ægrum a morbo liberaret. Verum his responderetur, eam divinam corporis humani machinam (forte ob neglectum anatomes & mechanices accuratioris studium, ejusque inde pendentes admirandas vires) non satis considerasse aut intellexisse. Nam
sicuti

sicuti illi, qui numquam horologium & cumprimis internam ejus fabricam accuratius inspexerunt, vix credere possunt ejus effectus ex mera corporea fabrica provenire, ut minuta prima, minuta secunda, horas, dies, lunæ cursum, mensem & quæ sunt alia; verum etiam pro lubitu hominis levi externa facta alicujus tuberculi pressione, repetitionem horæ ejusque minutorum, idque toties, quoties libuerit, sono vel pulsû indicare possint, & hoc a rationali principio oriri putant, sicut de Americanis referunt, cum primum Europæorum horologia conspexerint; dum omnia illa, quasi cum judicio, certo temporis spatio & ordine, ab eo peragantur: id quod vero fabricæ horologii peritis non adeo obscurum, sed conceptu facile est, qui illud non rationali principio, sed a pura pura mechanica ejus fabrica fieri norunt.

48. Ita quidem etiam minus cautis videtur, ac si machina nostra in actionibus naturalibus cum prudentia ageret: verum cum ille effectus, qui prudens videtur, non a prudentia machine dependeat, ut pote quæ, ut horologium, licet artificiosissimum sit, nec cogitat, nec deliberat, adeoque nec prudens dici potest; sed ob artificiosam suam fabricam, quam summus atque sapientissimus Artifex consecit, actiones suas, quasi cum prudentia eas faceret, perficit, quæ tamen, ut in horologio, omnes a sola ejus fabrica & motu, quibus prudentia tribui nequit, dependent. Quod vero ut clarius pateat, sciendum, quod omnis mutatio in corpore humano fiat per motum & fabricam partium, ubi quælibet pars ob peculiarem ac diversam suam structuram, quam anatomæ, immo & externa facies demonstrant, in determinatum finem a Deo conformatum, certas mutandi vires, suæ fabricæ convenientes, ut ex physiologia jam constat, obtinet: qua ipsæ mutationes illæ non animæ directione aut imperio, verum necessitate quadam mechanica, sicut in horologio aut mola quadam producuntur, quæ quidem ordinatæ & prudentes videntur, licet revera, ut antea dictum est, non sint, sed solum a mirabili earum fabrica, variisque physicis & mechanicis conditionibus proveniant.

Videtur prudentia, quæ tamen ea non est.

49. Ad eoque cum ab adorando machinæ nostræ effectore corpus nostrum tanto artificio & ad modum perpetui mobilis, sicut supra §. 20. evictum est, sit constructum, ut sine concursu animæ circulatio sanguinis, digestio ventriculi, secretiones, &c. in nobis omnino fieri queant, & quod deinde cutis, viscera & glandulæ nostræ talem a Creatore adeptæ sint fabricam, ut in statu naturali omnis generis functiones, liquidorum mutationes & secretiones, ut jam supra §. 21. 22. probavimus, perficere queant; cur non etiam, quando vel humorum copia, vel eorum prava qualitas & nominatim bilis vi-

Quod ubi-
berius ex-
ponitur.

tiosa, vel *sanguis nimis spissus*, ut §. 40. ad 42. ostendimus, corrigenda & eliminanda sint, motorem primum corporis nostri, cor nempe cum arteriis, ita in motus excitare poterunt, ut non solum his motibus nimis viscosi humores atterantur, attenuentur & propellantur, verum etiam supervacanei & noxii, sicut in febribus, locis modo citatis, expositum est, vel per consueta sua excernicula, cutem nempe, renes vel alvum, vel quandoque etiam per narium aliamve hæmorrhagiam excernantur. Nam certissimum est quod supremus conditor, qui corpus nostrum quam sapientissime ita fabricavit, ut in statu sano, ope suæ fabricæ & sanguinis per tam multa viscera circuitus, humores suos in requisita qualitate sive temperie non modo conservet, sed ut etiam abundantes, inutiles aut effœtas sanguinis particulas per debita emunctoria expellat, illud quoque ita struxerit, ut noxios etiam & superfluos humores in statu p. n. ob summam fabricæ suæ perfectionem, quam habet, ope ejusdem motus & circuitus mutare, subigere, digerere & expellere, sequi ipsum hac ratione restituere valuerit. Atque ex hoc profecto quam maximum divinæ potentie, sapientie & providentie argumentum petere licet; dum ex eo, quam egregie hæc machina non modo sanam sæpe quam diutissime se conservet, verum etiam, si forte vitium aliquod cepit, seipsam quoque suis hisce viribus, a Deo ipsi datis, per meras causas sive vires naturales & mechanicas, sine animæ auxilio restituere valeat, cognoscere licet: omnes enim corporis humani partes a sapientissimo Numine in determinatos fines & usus, tam in statu naturali quam morbofo fabricatæ, viribusque ad hos obtinendos necessariis instructæ sunt.

*Mechanici quis
naturæ, &
que sensu
vocabulo
hoc utun-
tur.*

50. Adeo ex hætenus demonstratis omnes hodie prudentiores & Philosophi & Medici Mechanici naturam hominis minus, quam animam, sed re ipsa nihil aliud esse, quam fabricam illam artificiosissimam mechanicam sui corporis, nobiscum statuunt: (a) in qua mirabili modo solida liquores, & liquores rursus solida in motum reciprocum concitant, quo ipsi autem motu & peculiari partium fabrica, in eo, ut in horologio vel mola certæ ac determinatæ, ex mechanica necessitate,

(a) Ex Philosophis, vid. Christ. WOLFFII omniumque, qui cum eo sentiunt. scripta; ex Medicis autem nonnisi SYDENHAMII, Fr. HOFFMANNI & BOERHAAVII scripta, WITTERBACHII dissert. qua functiones cordis hum. & ægritudines necessitate mechanica fieri asserit; SCHREIBERII *Elementa Medicinæ*, & GROSHII *Verum Medicinæ Principium in structura corporis humani mechanica repetendum*, Halmæ 1732. impressum, citabo.

itate, sunt actiones; quo autem motu cessante, cessant etiam hæ actiones, & neuter sine altero motus persistere potest. Huic etiam, quæ de ea a veteribus & recentioribus dicta sunt §. 46. egregie competunt, & quæ ea etiam omnia efficere potest, quæ tam in statu naturali quam p. n. ut modo §. 49. probavimus, ei semper tributa atque adscripta sunt. Igitur Mechanici quoque cum HIPPOCRATE, CELSO, aliisque Medicis utuntur vocabulo nature, verum ita ut eo non animam, sed fabricam illam corporis intelligant, eique etiam illas functiones & mutationes in corpore adscribant, quæ a Stahlianis animæ adscribuntur, ast revera a motu & fabrica ejus parium, tam in statu naturali, quam p. n. perficiuntur. Adeoque & Mechanici recte dicere possunt, quod natura sit morborum medica, quod natura cum morbo luctetur, quod hic homo robustam, alter debilem obtineat naturam, & quæ sunt alia. Quo etiam pertinet CELSI elegans monitum prædicum, quando ait: (a) Ante omnia scire convenit NATURAM CORPORIS: quia alii graciles, alii obesi sunt; alii calidi, alii frigidi, alii humidi, alii sicciores, alios adstricta, alios resoluta alvus exercet: quæ profecto de anima minime dici aut intelligi possunt. Quid igitur opus est, cum hæc res adeo clara sit, ad incertum, nondum probatum ac dubium prorsus actionum nostrarum principium, animam scilicet recurrere? præsertim cum hoc nullum prorsus in curandis morbis effecerat usum; dum remedia nostra non in animam, sed in corpus agunt.

§ 1. Igitur cum corpus nostrum revera machina sive automatum artificiosissimum sit, & omnia, quæ in eo fiunt, ex actionibus & fabrica ejus deduci possint, nemo autem automati aut horologii defectus recte novit, aut cognoscere, multo minus corrigere vite potest, nisi qui structuram ejus atque actiones, singularum partium probe callet, atque imprudens ille merito suo judicaretur, qui horologium nobile ac pretiosum rustico cuidam aliive rudi in his rebus homini reficiendum committeret. Ergo cum veri Mechanici Medici, qui semper simul Anatomici & Physici, ob tanto meliorem corporum naturalium cognitionem, esse debent, partium corporis situm, figuram, nexum, communicationem cum aliis partibus, structuram, actionem & usum optime sciunt, sine dubio in curatione illis præstant, qui hæc ignorant, aut ob ignorantiam, vel ob præjudicatam opinionem proterve contemnunt; de quibus vero recte dici potest, artem non habere osorem, nisi ignorantem: id quod quamplurimis, ac potissimum ex Chirurgia, tamquam parte Medicinæ, depromptis exemplis, ex quibus nunc

solum luxationes, fracturas, gravia vulnere, suffusiones & fistulas oculorum, hernias, calculum vesicæ nominare sufficiat, quam manifestissime demonstrari potest.

Ductus
nature
non semper
se-
quendus.

52. Porro Stahliani tamquam fundamentalem regulam practicam assumunt, *naturæ ductum in morbis esse sequendum, & Medicum non nisi naturæ esse ministrum*. Sed quemadmodum jam dudum multis rationibus & exemplis, in dissertatione de Medico naturæ Domino (ad quam lectorem brevitatis causa nunc remitto) hoc posterius, quam tritum & verum illud etiam multis minus cautis visum est, falsum esse docuerim, & quod Medicus potius Director ac Dominus naturæ esse debeat, demonstraverim; ita paucis hic examinabo, an prius illud pro certa & firma regula, cui cum Stahlianis promiscue fidere possimus, in medicina facienda assumendum sit. Haud quidem ignoramus, hoc dictum a Medicinæ Parente, HIPPOCRATE provenire; verum postquam cum CARTESIO jugum auctoritatis excussimus, HIPPOCRATI (adeoque & aliis) non aliter credendum, quam ubi ejus præcepta cum ratione & experientia conveniunt. Nam ejus præcepta atque aphorismos quam plurimos non in universum, sed solum in certis casibus certisque limitationibus; vera esse, experientia & quamplurimi egregii Medici jam dudum obser-
varunt.

Ubi se-
quendus.

53. Mechanicus igitur Medicus & hoc & alia ejusmodi præcepta non sequitur, nisi ubi ea cum ratione & experientia probe convenire didicit. Ut e. g. quando in febre, aut post errores in victu, æger quidam de sapore amaro, nausea & conatu vomendi conqueritur, ratio autem & experientia sæpius docuerint, vomitum in ejusmodi casibus ad vitiosum ex primis viis ejiciendum, prodesse, ductum naturæ recte hic sequitur, quæ indicat, noxium ad superiora vergere, adeoque remedium pro hoc excitando idoneum merito ei exhibet. Deinde quando morbus occurrit, ubi cognoscimus, naturam vitiosos humores vel sudore, vel exanthematibus per cutem expellere velle, ob eandem modo dictam rationem ductum hunc, jam in aliis multis ejusmodi casibus utilem observatum, & regimine & medicamentis convenientibus, recte sequitur. Porro si in dolore capitis, vertigine, oculorum & aurium inflammatione, variolis ut & calore p. n. qualicumque, sanguinem e naribus prodire observet, quia hæc excretio in ejusmodi malis, (nisi forte nimia sit) plerumque salutaris observata est, eaque natura a noxio vel abundante sanguine se liberat, eam non impedit, sed promovere satagit; atque idem etiam in plerisque casibus de mensium & hæmorrhoidum fluxu, itemque de multis alvi fluxibus facit: ita ut illud Hippocraticum; quo natura vergit, eo ducenda, per loca scilicet

convenientia; (a) probe observetur. Verum quia multi casus & exempla, quæ contrarium quoque evincunt, facile afferri possunt, sequitur inde *hanc regulam non pro universali*, neque adeo simpliciter, sicut a multis Stahlianis proponitur, *habendam*, sed per prudentiam practicam multis in casibus magnopere limitandam esse. Inprimis vero genuinus Medicus ex historiis morborum & felicibus curationum successibus probe perspectis, nosse debet, ubi, aut *quibus in morbis ductum nature sequi*, & *ubi eum non sequi conveniat*; alias ipsum sæpissime graves in errores deducet: Si enim in machina nostra omnia, sicut decet, tam in sanitate quam morbis succedunt, *ut bonus eques aut auriga*, cujus equi officium suum rite perficiunt, *nihil mutare, sed naturam recte agentem sibi relinquere debet*, quia alias tantum turbaretur; id quod etiam in bono horologio est observandum. Sin vero aberrat & quidem tantum parum, blanda ratione in rectum tramitem est reducenda: nam multis in casibus, id quod etiam probe sciendum, natura blande duci, sed vi non vult cogi. *Quando autem malum est vehementius*, ut leni modo scopum assequi non valeamus, tunc, ubi medicamenta parum sunt, *ferrum & igne sæpe cogenda*, juxta HIPPOCRATEM: *Quicquid medicamenta non sanant, ferrum sanat; quod ferrum non sanat, ignis sanat; & quæ hæc non sanant, insanabilia sunt habenda*. Aphor. 6. Sect. VIII.

54. Ut igitur *quam falsa & inepta hæc de natura sequenda sit Stahlianorum doctrina practica*, per exempla demonstrem, sumamus rursus *hæmoptysin*, morbum notissimum, de qua non solum, ut supra jam diximus, asseverant, *illam esse excretionem sanguinis noxii, a prudenti (si Diis placet) natura; in salutarem finem institutam*, ad corpus a sanguine illo liberandum: immo ut hoc magis probent, etiam dicunt, *animam magnos labores per motus tonicis; & nescio quos alios; impendere*, ut sanguinem corpori illi molestum *ad pulmones compellat*: adeoque hinc spirandi difficultatem, palpitationes cordis, angustias præcordiorum, tussim & alia mala inducere, *donec tandem scopum suum, perrumpendo pulmones, affecta sit*, & sanguinem pleno æmine per illum rejecerit: Nunc gaudent Stahliani & quasi tripudiant, *quod anima ipsorum tam feliciter finem suum consecuta sit*, & tam nobilem sive heroicam prorsus actionem perfecerit, laudantque quam maxime ejus prudentiam & providentiam, quam pro sanitate hujus hominis in procuranda hac sanguinis excretionem

Ubi eum non sequi conveniat; exemplo hæmoptysis, ostenditur.

adhibuerit. Verum cum *eventus hujus excretionis sapissime*, ut supra jam diximus, *funestus sit*, phthisinque perquam frequenter atque mortem post se trahit, *hunc ductum naturæ sequi solidum potius*, atque a sana ratione alienum, adeoque omni modo, quia non fit per locum convenientem, prout Hippocrates hoc requirit, *evitandum esse* cum sanioribus Medicis Mechanicis esse arbitramur.

Quomodo
Mechanici
cum
confide-
rent.

55. Quid itaque Mechanici in hoc morbo agant, & eorum sententia atque curandi modus melius cum sana ratione & experientia conveniat, prudentibus dijudicandum paucis nunc proponemus. Accidit nimirum aliquoties, ut mihi ejusmodi ægri, quos Stahliani antea tractaverunt, curandi offerrentur, quibus hi Medici egregie quidem *illam salutarem*, ut vocabant, *animæ* in excitando hoc malo *actionem laudaverant*, multaque remedia ad hunc naturæ ductum, ut fideles ejus ministri, juvandum, adhibuerant; verum his ipsis, redeunte sæpius hæmoptysi, tantopere tandem debilitati & ad incitas redacti fuerunt, ut mortui magis quam vivi hominis imaginem referrent. Quoniam vero cognita facile est, *temere hic agi, si qui ductum hunc naturæ sequi aut juvare velit*, qui a prudenti directore anima, *quia per locum convenientem non fit*, minime oriri potest; dum illa alia potius ratione, si in ipsius potestate hoc esset, alioque in loco se a noxio liberaret, quam in adeo periculo: sed potius ex hoc ipso actu contra Stahlianos cognosci posse existimo, *malum hoc non ab anima, sed ex causis mere mechanicis oriri*, sanguinemque per ea loca erumpere, ubi vasa sunt debiliora. Itaque & hic minime ductum hunc naturæ sequi consultum duco; sed potius omnem primo curam eo dirigendam esse puto, ut *copia sanguinis alia via aliaque ratione imminuatur, sanguinis motus vebementior temperetur, impetus sanguinis a pulmonibus avertatur*, atque tandem *pulmo latus probe rursus glutinetur ac roboretur*.

Quomodo
cum
curen-
t.

56. Ad copiam igitur sanguinis minuendam per manifestas rationes mechanicas egregie confert primo *parca victus ratio*; deinde *sanguinis per venas detractio*, ter vel quater, pro diversa ægrorum natura, per annum instituta; ac denique ob eandem causam *frequens*, sed blanda *per alvum evacuatio*: quæ vero medicamentis *calefacientibus*, quæ sanguinem exagitant; qualia sunt aloetica, myrrhata & similia resinosa, immo & ipsæ adeo a Stahlianis decantatæ *pilule Beccherianæ & Stahlianæ*, quas tamen in plerisque sæpe morbis, tanquam panaceas extollunt & commendant, *feri non debet*; sed potius temperatis refrigerantibus, e. g. *decoctis ex tamarindis, foliis sennæ, rheo & manna* aut similibus, convenienti copia sæpius adhibitis: quippe a quibus

egre-

egregiam utilitatem in his ægris sæpius expertus sunt, præsertim ubi jam novas in pectore congestiones ac molestias, quæ novam rupturam in pulmonibus minabantur, perceperant. Præterea quoties aliquem calorem p. n. sive sanguinis quasi ebullitionem sentiebant ægri, quæ ab acri alcalico vel bilioso sanguine, aut etiam a nimia vi elastica solidarum oriri solent, remedia temperantia & spasmos sive rigiditatem fibrarum minuentia, qualia sunt lap. cancror. aut conchæ acido citri saturati, salia media, præsertim tartarus vitriolatus, arcan. duplic. nitrum & cinnabaris, in pulverem redacta, bis vel ter in die ad drachmam dimidiam, ex aquis refrigerantibus jubeo, donec illa mala remittant. Pro pulmonibus denique læsis sanandis & roborandis, infusa berbarum traumaticarum, ut veronicæ, scabiosæ, tussilaginis, pilosellæ, solidaginis, saniculæ, cum radice glycyrrhizæ & malvæ, itemque dactylis, passulis & ficubus remixtis, ad modum herbæ Theæ, bis vel ter in die, tepide, interpositis subinde blandis balsamicis, haurienda præcipio, eisque, præsertim ubi ægri a victus erroribus quam solertissime abstinerint, modiceque corpus quotidie exercuerint, non paucos, qui morti vicini videbantur, Deo benedicente, hoc modo restitui. Atque hæc ipsa quoque vera sunt, atque agenda in vomitu & mictu cruento.

57. Eandem fere & curandi & perseverandi rationem in eis observo atque observandam suadeo in illis, qui *consillarum & faucium inflammationi*, aut *ophthalmiæ*, *otalgiæ* vel *odontalgie*, ob sanguinem abundantem sæpe obnoxii sunt, quos omnes morbos *salutari naturæ intentioni adscribunt Stahliani*. Adeoque quia in his, secundum hos naturæ intentio est, a nimia sanguinis *per hæmorrhagiam* narium vel *per abscessum* sese liberandi copia, *juxta eorum doctrinam minister naturæ ductum hunc naturæ sequi deberet*. Verum quam incerte ac difficulter hic scopus his in morbis peraritem, sine metu graviora mala ægris inducendi, obtineatur, illi optime sciunt, qui in Medicina & observationibus faciendis ætatem fere consumserunt; non vero illi, qui hypothesen in museo ex ingenio fingunt.

Rectius ergo longe & securius omnes ii morbi curantur, si ductum illum naturæ non sequimur; sed ut Medici rationales Mechanici, qui experientiam simul semper considerant, agimus. Exempli loco in *faucium inflammationibus*, quia prudenter rem ponderando cognoscere licet, minime sapientis naturæ institutum esse posse, per valde dolorificam inflammationem aut abscessum harum partium, qui sæpe maximis doloribus & suffocationis periculo comitari sunt, corpus a nimia sanguinis copia, quia plerumque *vix dimidiam puris unicam continet*, liberare velle; quippe a qua exigua

Ductus naturæ sequendus inflammationibus.

quantitate tanta mala non essent pertimescenda: id quod & de aurium, dentium, aliarumque partium inflammationibus & abscessibus intelligi debet. Sed oriuntur potius hi tumores ex mechanicis & physicis causis, quando v. c. cuidam hæ partes natura sunt debiliores, sicut sæpe homines videmus, qui a prima juventute hisce malis sæpius exercentur, & vel aliqua humorum abundantia vel ebullitio, vel spissitudo, vel aer frigidior, corpore præsertim calente; accedat, facile ejusmodi mala concitantur.

Quid potius facienda. 58. In his igitur nullo modo ad ductum naturæ, qui nullus vel malus hic est, respiciendum; sed potius quando ejusmodi morbum imminere & humores abundare cognoscimus, sicut boni Mathematici aquas abundantes, quæ noxam aliquam ædificio, muro, vallo vel integro cuidam castello, urbi aut regioni inferre minantur, per alias vias a loco læso vel ledendo derivare solent; ita quoque Mechanici Medici boni humores faucibus, auribus, vel oculis ruinam, vel saltem ingentes dolores, abscessus noxasque alias minitantes, ut mox dicetur, per alias vias abducunt & evacuant.

Quid potius facienda. Præterea ad humores in faucibus hærentes dissolvendos sæpe prodest vel solum infusum herba theæ vel aliud simile sæpe haustum & gargarisma resolvens, quale egregium & euphoristicum paratur ex spiritu vini & aqua flor. sambuci vel solis, vel pauca salis ammoniaci, vel nitri aut aluminis admixta quantitate, vel aliud ejusmodi tepide sæpius adhibendum, præsertim si simul pulvis temperans ac resolvens §. 56. aliquoties in die assumatur, atque victus & aeris conveniens regimen fervetur. Sequenti die, matutino tempore, si prædicta ad malum digerendum forte haud suffecerint, egregio cum successu ad humores in faucibus vel auribus congestos avocandos ea potiuncula purgans, quæ eodem loco indicata est, usurpetur, post cujus usum ejusmodi mala sæpissime sublata, & per alvum educta esse novi, ut aliis remediis haud opus fuerit. In casibus vero, ubi major calor p. n. in sanguine, faucibus, auribus vel oculis percipitur, vel eodem adhuc die, præsertim circa vespæram, quando malum a prædictis non minui observamus, sanguinem per cucurbitulas sub auribus, in collo, & in dorso adhibitas, (pedibus simul in pediluvium tepidum revulsionis gratia immisis) quam saluberrimo consilio evacuare ac simul revocare, & sic hominem ut plurimum his in integrum restituere possumus. Hoc si forte sequenti die nondum factum sit, vel potiuncula laxans, si ante cucurbitulas nondum fuerit adhibita, vel venæ sectio in pede aut brachio magno cum fructu adhibetur, hisque ipsis hæc mala plerumque quam felicissime tolluntur, quamvis nullo modo ductum naturæ sequamur.

§9. *Pleuritidem; peripneumoniam & spirandi difficultates* nonnullas Stahliani, licet quamplurimas alias easque manifestas causas habere possint; *sapienti tamen quoque sua nature directioni eas adscribunt*, cujus intentio esset, *sanguinem vitiosum vel abundantem, quem hic congestis, per spatium vitientium & pulmonibus expellere*, quæ vero ob certa & sæpe haud cognita obstacula, scopum suum assequi non posset, adeoque sanguis in pulmonibus, ac pleura hæreret, atque sic inflammationes in his partibus prædictosque morbos produceret. Sed præterquam quod haud verisimile sit, *sapientem animam sanguinem noxium ad organa vitæ primaria, summo cum vitæ periculo compellere*, ille profecto, qui hanc ipsorum doctrinam sequi velit, efficere deberet, *ut in omnibus hisce malis hæmoptysin produceret*. Verum periculosa & a sana ratione aliena hæc esset curatio, partim ex iis, quæ de hæmoptysi modo §. 54. diximus; partim ex eo, quod ipsi prudentiores Stahliani ab hac curandi ratione recedant, atque experientia edocti aliam curandi viam in his malis, quam hypotheses eorum requirunt, sequantur.

60. *Quid igitur faciant in pleuritide exquisita & peripneumonia, itemque in spirandi difficultate, quæ a copioso & viscido sanguine, circa præcordia hærente, oriuntur, Mechanici?* Abundantem & viscidum sanguinem hic congestum partim per largas sanguinis missiones a pectore revocare, partim diluentibus & resolventibus medicamentis reliquum resolvere & in motum naturalem redigere student. Efficitur hoc, ut in præcedenti §. dictum est, *infusis herbarum resolventium moderate calidis, pulveribus §. 56. laudatis diaphoreticis resolventibus atque camphoratis, immo & essentis ac potiunculis ejusmodi temperantibus his subinde interjectis, cum regimine blando diaphoretico & potu sufficienti aqueo, subacidulo; atque externe, fomentis calidis digerentibus, præsertim aqua vel lacte calido, vesicæ incluso*. Quibus ipsis, si stagnantis sanguinis, qui obstructionem vel inflammationem fecit, resolutio obrinetur, quemadmodum sæpissime fit, etiam morbus tollitur. Quia vero Stahliani hos morbos fere eadem ratione curant, quis non perspicit, quod in his & similibus pluribus aliis malis, si recte curare velint, *necessum sit, ut hypotheses suas deserant, illosque ductus nature, qui ad curationes noxias deducunt, pro erroribus nature, ad quos tunc, tanquam ad asylum confugiunt, declarent, atque secundum rationalem mechanicum modum curationes suas instituant?*

61. *Atque idem quoque in quamplurimis aliis morbis, si limites dissertationis hoc admitterent, & speciatim in vomitu ac mictu cruento, lue venerea, herniis, visus & auditus vitiiis,*

Nec in pleuritide ductus nature sequendus.

Quomodo procedendum.

Mechanici nulla absque supponunt.

tumo-

tumoribus, scrophulis, carcinomatibus, &c. facile ostendere possem. Interea tamen ex his pluribusque similibus, *præstantia Medicinæ mechanica elucet, quæ nusquam adeo incertis, absonis & contradictoriis*, ut vocant, *hypothesebus nititur*; sed omnia secundum mechanicas leges, sanæ rationis scilicet & experientiæ normam, instituit, ut vel ipsi *Stahliani ad eorum methodum sæpè confugere cogantur*, quando suppositam naturam vel animam ipsorum errare, ne & ipsi simul hic graviter errent, deprehendunt. Pergamus itaque, ut *nonnullas hic adhuc ex præcipuis Mechanicorum curandi regulis exhibeamus*, ex quibus prudens facile, quod rationales sint, judicare poterit.

*Leges mechanico-
rum cu-
randi in
solidis.*

62. *Si partes solide sunt nimis laxæ aut debiles, ex, vi contrariorum, (nam universalis fere regula practica est, contraria contrariis curanda) sunt roborandæ; sin nimis adstrictæ & rigidæ, relaxandæ. (a)*

2. *Si cohesio sive unitas soluta, ut in vulneribus & fracturis, ea rursus sunt conjungendæ & conjunctæ ope fasciarum & quiete servandæ; ita beneficio circuli sanguinis affluunt humores idonei ad partes læsas rursus glutinandas. Deus enim pro immensa suæ sapientia, partes nostri corporis ita fabricavit, ut in ossibus succus osseus, qui in callum abire & ossa fracta rursus glutinare potest, vi fabricæ ipsorum præparetur, qui etiam ea glutinat; in musculis autem, cute & reliquis mollibus partibus succi quoque ipsarum naturæ conveniens, ita, ut frustraneum prorsus sit animæ directionem dubiam, quæ hoc efficiat, cum Stahlianis hic advocare, atque ejus hac in re sapientiam aut vim, quam non habet, collaudare; cum ex sola harum partium fabrica & generatione hoc secretionis & glutinationis negotium satis apte explicari comprehendique queat.*

3. *Si partes naturales clausæ aut p. n. coherent, illæ sunt dividendæ & divisæ servandæ. (4.) Si ex situ naturali dejectæ, sicut ossa in laxationibus, intestina in herniis, uterus in uteri prolapsu, &c. in naturalem situm & ordinem sunt redigendæ, atque in eo quoque, quantum satis est, continendæ. (5.) Si quid in corpore abundat aut supervacaneum adest, illum qua fieri potest, commodissima ratione auferendum; sin deficiat, addendum. (6.) Si mala aliqua conformatio corporis peccet, ea est emendanda; quæ vero omnia non melius, quam mechanica ratione, præstari posse, res ipsa loquitur.*

In fluidis.

63. *Deinde in partibus fluidis peccantibus in universum quoque apud Mechanicos Medicos generalis valet illa regula,*

con-

(a) Hanc regulam veterum Medicorum de laxo vel stricto & Stahliani Mechanici Medici diligenter & recte, quæ valde rationalis est inculcare solent.

contraria contrariis curantur: ut si sanguis abundat atque morbos creat, aut creare minatur, hi, ut alii Mechanici, qui, ubi nimis aquæ loco cuidam, quem satis roborare nequeunt, noxam intendunt, eas vel minuunt, vel ad alia loca deducunt, sicut §. 58. dictum est, sanguinem quoque minuunt, & per alia loca, missionibus sanguinis, purgantibus, diureticis, diaphoreticis, sudoriferis, aliisque evacuantibus educunt. Si ventriculus & intestina saburra sordium aut rerum noxiarum nimis repleta sunt, ea quoque, ut alias Mechanici impura receptacula & canales mundant, aqua, vomitoriis & eis, quæ per alvum educunt, expurgant. Si defectus humorum adesse percipitur, sicut Mechanici alii aquis aliunde adductis hunc defectum refarcire, ita & Medici deficiens idoneo potu, victu & remediis restituere satagunt. Si prava sanguinis qualitas peccat, eam quoque suis contrariis, ex physica & chemia cognitis, corrigunt. Ubi spissitudo, eis, quæ humores spissos resolvunt, aqueis scilicet, decoctis, salinis, alcalicis & mediis, quandoque & mercurialibus, ubi hæc professe usus docuit, resolvitur: ubi tenuitas nimia, ea lacte, gelatinis, farinosis, gummosis &c. inspissatur. Si humores sunt nimis salsi, aqua & lacte ii demuleentur; si acidi, alcalicis; si alcalici, acidis corriguntur ac simul aqueis. Quando in nimio motu & calore sunt constituti, illi motus nimii, una cum calore p. n. minuuntur, nitro, blandis acidis, cinnabari, potu aquæ, regimine frigidiusculo. Sed si motus sunt nimis languidi & calor deficiens, excitandi vino, spirituosis, aromaticis, aqua cinnamomi, cort. aurantiorum vel citri aliisque similibus, varia ratione adhibitis: quo etiam sæpe referri possunt martialia, cort. chinæ, resinæ & gummata nonnulla. Sed natura Stahlianæ hic, prorsus nihil efficere valet, licet hæc virtus præ ceteris ei ab ipsis tribuatur; nam experientia docet, eam nimis languidos cordis motus non excitare, & nimis celeres haud quicquam voluntate sua retardare posse.

64. Denique quoniam nonnulla corporis vitia vix nisi specificis apte corrigi possunt, sicut in febribus intermittentibus, *Quid de specificis* sentio nunc; *sentio nunc* lue venerea, affectibus uterinis, vigiliis & doloribus nimis; *sentio nunc* conspicimus; Mechanici etiam specifica remedia, quæ speciatim huic vel illi malo contraria esse per experientiam cognoverunt & postea etiam ex parte per rationemprehenderunt, haud continentur; quia omnia, quæ vel ratione vel experientia vera atque proficua esse cognoverunt, in Medicina faciendâ assumunt, & ex præiudicio, sicut Stahlani cum cortice peruviano, marte, camphora, opio aliisque nonnullis contra experientiam tot egregiorum Medicorum faciunt, non contemnunt; præsertim si debita prudentia, in subjectis idoneis, opportuno tempore atque apta quantitate, immo & præmissis, ut ajunt, præ-

præmittendis, adhibeantur: dum revera, si his cum observationibus usurpantur, ut multi ex Stahlianis, qui vel clam vel palam iis uruntur, ipsi agnoscunt, nullum damnum inferunt; sed quam maxime salutares effectus, qui ab aliis frustra expectantur, exerunt.

Mechanica in Medicina chirurgica maxime excellit.

65. *Nusquam vero magis & manifestius Mechanicæ in Medicina præstantia, quam in antiquissima & præstantissima illa Medicinæ parte, quæ Chirurgia appellatur, se ostendit: quippe omnia, quæ in hac fiunt, mechanica ratione contingunt, atque aliter fieri profecto nequeunt, animæque Stahlianæ impotentia quam maxime in Chirurgia cognoscitur. (a) Nam luxationes & fracture ossium non nisi mechanica ratione restitui possunt; vulnerum oræ mechanico modo junguntur & glutinantur, atque profusiones sanguinis eorum meris mechanicis artificiis, ut compressione, ligatura, torcularibus, &c. cohibentur. Venæ, arteriæ, abscessus, fistulæ scalpellis inciduntur, ossa cunelis, forcipibus aut ferris resecantur; peregrina & vulneribus & aliis locis, digitis, vulsellis, forcipibus, hamis, specillis aut uncis extrahuntur; vulnorum ac laborum leprosum oræ acubus adunantur; calvaria aliave ossa cerebri, si opus est, perforantur; luxationes subinde non nisi machinis iisque sæpe artificiosissimis restitui possunt; scarificationes, ustiones, suffusiones, fistulæ lacrymales, aliæque multæ operationes oculorum, nasi, aurium, dentium, sua peculiarissima ferramenta & artificia mechanica desiderant, id quod & de collo & dorso incurvato, pedibusque distortis in ordinem redigendis recte dici potest. An non acus illæ triangulari cuspidate donatæ, quibus aquam hydropicis atque hydrocele laborantibus educimus, & vincula, quibus herniæ curamus, itemque illa ferramenta, quibus urinam & calculos & vesicæ educimus, secundum mechanicas regulas agunt? Verbo, in omnibus his Medicus, ut prudens Mechanicus, agit: non solum attendendo ad fabricam & situm partium, ne partes utiles & vitandas lædat, sed etiam ut instrumentis suis ita uti sciat, quo nullum damnum iis inferat; verum quantum fieri potest, tuto, cito & jucunde, actiones suas instituat.*

Præstantia Mechanicæ in Medicina Strömii repositur.

66. Denique ut *Mechanicæ in Medicina præstantiam* paucis complectamur, asseverare hic non dubitamus, 1. quod quicquid boni & certi in doctrina de usu partium habemus, illud omne Medicis, qui mechanice partium fabricam, situm, nexum & actionem pervestigarunt, & secundum illius leges harum usus prudenter exposuerunt, debeamus. 2. Quod & ab iis didicerimus, omnes quoque morbos ex causis mechanicis

in

(a) Videri uberius hanc ob causam potest STENTZELII dissert. de natura Stahlianæ in chirurgiâ impotentia. Vitebergæ 1729. 4.

in corpore oriri, adeoque & eos mechanica quoque ratione tollendos esse. Ex quibus simul sequitur, eas curationes, quæ principiis mechanicis non nituntur, ut quas *sympatheticas* appellant aliasve similes, nihil certi præstare & *sæpe non nisi aniles sapere fabulas*, sicut frequens experientia docuit. 3. *Mechanici ad laudem summi numinis docuerunt*, quod artificiosissima nostri corporis machina ab ipso tam mirabili sapientia efformata sit, ut non modo seipsam, sine animæ adjumento, quam diutissime sanam conservare, verum & *sub natura nomine*, quando male afficitur, *sæpe sola rursus noxia emendare aut expellere*, seque ipsam sic in statum sanum, ut §. 49. ostendimus, *restituere valeat*. Immo 4. & Mechanicis Medicis debemus *inventionem tot præstantissimorum instrumentorum chirurgicorum*, quibus complura gravissima corporis mala curare possumus, & *sine quibus Medicina practica admodum manca*, quamplurimi autem ægri miserimi & insanabiles essent. Testes hujus rei sunt *scriptores & veteres & recentiores*, qui *res chirurgicas descripserunt* atque idonea ferramenta delinearunt, qui *revera Medici Mechanici fuerunt*; quos autem, ne nimis longus sim, hic recensere nolo, sed ad Chirurgiam meam lectores ablegabo; in qua quidquid fere hucusque boni in hac Medicinæ parte præstitum est, quasi in compendio videri poterit.

67. Atque sic *Medicine Mechanicæ præstantiam*, præ *Stabliana* cæterisque forte simul reliquis sectis, quæ a Mechanica recedunt, satis nos evicisse arbitramur. Potuissent quidem, fatcor, omnia hæc longe adhuc uberius exponi verum quia jam ob rerum hic dicendarum copiam prolixior fui, ut brevior sine obscuritate esse vix potuerim, hæc nunc pro argumento hoc demonstrando sufficiant, dum plura ex ipso hoc libello petere possunt; quem post diuturnam experientiam, ut ægrotis & Medicinam discitentibus hoc ipso prosim, conscripsi, & ut malevolos, qui, me non nisi Chirurgum esse atque internorum morborum curationes ignorare, apud Magnates sæpe calumniati sunt, hoc ipso aliqua ratione confundam, & quænam mea sit fueritque curandi methodus demonstrarem.

Conclusio.

CONSPECTUS

CAPITULUM

QUÆ

HOC IN LIBRO

CONTINENTUR.

CAP. I. De plethoræ morbis.	3
II. De febribus in universum, & speciatim de intermittentibus.	11
III. De febribus continuis, & 1. acutis.	22
IV. De febribus exanthematicis, & speciatim de variolis ac morbillis, quibus purpurata, petechialis, & scarlatina subjunguntur.	41
V. De febribus acutis stomachicis & intestinalibus, quibusdam mesentericis dietis.	53
VI. De febribus lentis hecticis,	68
VII. De inflammationibus.	74
VIII. De hæmorrhagiis sive fluxibus sanguinis.	87
IX. De hæmorrhagiis sive fluxibus sanguinis suppressis.	98
X. De congestionibus & doloribus.	107
XI. De cachexia & cachecticis affectibus.	132
XII. De obstructionibus.	158
XIII. De fluxibus, sive fluxionibus, iisque maxime serosis.	178
XIV. De præcipuis sensuum morbis.	195
XV. De motus læsionibus.	219
XVI. De	

- XVI. De ventriculi & intestinorum morbis. 233
 XVII. De morbis sexus fœminini præcipuis. 251
 XVIII. De morbis infantium ac puerorum. 266
 XIX. De venenis. 283
 XX. De aquarum medicatarum natura & u-
 su : 297



NOI RIFORMATORI

dello Studio di Padova

Concediamo Licenza a *Giambattista Remondini* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato: *Laurentii Heisteri Compendium Medicinæ Practicæ*: osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 16. Settembre 1761.

(Angelo Contarini Pr. Rif.

(Polo Renier Rif.

(

Registrato in Libro a Carte 100. al Num. 360.

Giacomo Zuccato Segr.



LAURENTII HEISTERI
COMPENDIUM
MEDICINÆ PRACTICÆ,

*Sive de optima morbos internos & cognoscendi,
& curandi ratione.*

INTRODUCTIO.



I quis artis salutaris Candidatos firma solidaque Medicinæ practicæ, quæ victu & medicamentis medetur, *fundamenta*, (nam de Medicina, quæ manu sanat, alibi diximus,) ratione facillima, optimaque docere satagit, ei utilissimum, immo quam maxime necessarium esse existimo, ut postquam *theoreticam*, quam vocant, *Medicinam*, non ex fictis aut suppositis, sed ex *anatomicis*, & *physicis*, atque mechanicis principiis, tamquam genuinis & veris illius *fundamentis*, probe addidicerint, memoriaque comprehenderint, morborum curandi rationes, non ordine alphabetico, neque secundum corporis partes, ut haud pauci Doctores artisque salutaris Professores fecerunt, tradat, quippe quod multis repetitionibus molestis, aliisque incommodis obnoxium est; sed ita potius rem suam instituat, ut morbos *affines*, tamquam *species*, ad unum *genus* sive *classem* pertinentes, simul & sub una quoque classe (sicut fere in re herbaria fieri solet) *comprehendat*, atque sic uniuscujusque classis morborum ideam, naturam, causas, signa generalia, effectus, mutationes, eventus, rationem medendi, & quid in unaquaque classe potissimum observandum, faciendum

A

fugien-

fugiendumque sit, ipsis generatim bene exponat; ita enim specialiorum morborum, ad quamvis classem pertinentium, natura & curatio (quæ maxime ex parte ipsis communis est,) longe melius quam in antea dictis tractandi modis Æsculapii filiis patebunt, eorumque memoriæ imprimetur, ut deinde quid in quovis occurrente ægro ac morbo optime sit agendum, facilius intelligere, rectiusque dijudicare atque efficere valeant. Hoc itaque est, quod in hoc libello, jam a longo tempore in gratiam potissimum Auditorum meorum quam facillima ratione, attamen haud perfunctorie, neque sine magno ac diuturno labore, quia ejusmodi satis idoneum aut perfectum (a) compendium, supra dictis fundamentis superstructum, haud prostat, præstare annisum sum, atque hætenus in multis fructum ejus percepi uberrimum, speroque ut & in posterum diligentiores eum abunde sint percepturi.

(a) Boerhavius quidem Aphorismi egregium ex hisce principiis conscriptum est compendium; sed quia primo multos morbos & quidem admodum frequentes, & graves omittit, eorumque curandi rationem prorsus prætermittit, ac deinde scribendi genere per quam difficili utitur, quod multi intelligere vix possunt, pleniori ac faciliiori compendio tironibus opus esse judicavi.



C A P U T I.

De Plethora Morbis.

I.



UM vero *quamplurimi morbi multas ob rationes a plethora* mihi oriri videantur, quia scilicet plerique homines quotidie fere plura alimenta assumunt, quam pro nutritione corporis & vitæ suæ conservatione indigent, atque simul otio nimis, quam par est, indulgent, motumque corporis ac labores, sanitati adeo utiles ac necessarios, intermittunt, immo omni studio fugiunt; mirum non est, copiam sanguinis in ejusmodi hominibus plus justo augeri sive coacervari, atque sic id, quod Græci *plethorā* vocarunt, generari, idcirco vasa sanguifera, ab ea nimis repleti, distendi & quasi infarciri, eamque sic minora vascula vel obstruere vel comprimere, vel, dum a vegeto corde, causisve violentis fortius urgetur, perrumpere, unde sanguinis profusiones, vel saltem circulum sanguinis expeditum ac liberum impedire, cordique, propter pondus hujus auctum, valde resistere, ita ut necessario multis, eisque gravissimis malis, ut obstructionibus, tumoribus, doloribus, spasms, profusionibus sanguinis, quas *hemorrhagias* vulgo appellant, inflammationibus, febribus, convulsionibus, epilepsiæ, vertigini, apoplepsiæ, aliisque morbis quamplurimis hoc ipso ansa præbeatur: hinc a plethora præxeos nostræ medicæ initium facere consultum duximus.

II.

Est vero plethora vel *simplex*, quando sanguis bonus, nondum depravatus, aut vitiosus, copia solum excedit, si-
ve majori quantitate adest in corpore, quam ejus conserva-
tio & sanitas requirunt, aut vasa commode ferre, vel cor
apte propellere valent; vel *complicata*, quando is spissitudi-
ne sive crassitudine notabili, acrimonia vel salina vel bilio-
sa, atque inde producto calore p. n., orgasmo, aut alia vi-
tiosa humorum qualitate simul peccat. Præterea plethora
vulgo dividitur in eam quæ est vel *ad vasa*, vel *ad vires*:
illa dicitur, quando venæ a sanguine ita impletæ vel reple-
tæ sunt, ut valde turgeant; hæc vero, quando cum abun-

dantia sanguinis ex causis (N. I.) nata, sine notabili vaporum expansione, insignis torpor, lassitudo, aut debilitas corporis simul adfunt.

III.

*Pletho-
ram dari,
prostat.*

Dari autem *plethoram*, inter alia, contra *Helmontium* ejusque assecclas, patere existimo. 1. ex modo dictis (N. I.) de nimia satietate sive excessu in victu; 2. ex motu voluntarii & laboriosi apud plurimos defectu; 3. ex spontaneis sanguinis profusionibus, sæpissime ægros & sanos a variis malis levantibus, aut omnino liberantibus; 4. ex manifesta utilitate evacuationum sanguinis artificialium in præsertione & curatione morborum quamplurimorum, quam experientia frequens, a longissimo tempore docuit; 5. ex morbis & symptomatibus evacuationes sanguinis naturales suppressas, vel naturaliter etiam cessantes, sæpissime consequentibus; 6. ex frequentissima & manifesta noxa, quæ evacuationes sanguinis consuetas naturales suppressas, vel artificiales neglectas, brevi, ut plurimum, excipere solet.

IV.

*Diagnos-
is.*

Cognoscimus vero *plethoram* adesse in homine, licet forte ejus vasa haud turgeant, 1. ex *lento victu* prægresso, imprimis si accedat simul vita otiosa; 2. ex *appetitu bono* & *facili ciborum concoctione*, dum bene se habent; 3. ex *corporis & speciatim faciei constitutione florida & rubicunda* in sanguineis; in cholericis vero & melancholicis, ex venis notabiliter turgescitibus; 4. ex *formo* in nonnullis, præsertim sanguineis & laxo corporis habitu præditis, multo, profundo; in cholericis vero & melancholicis, inquieto, turbulento, cum anxiis sæpe insomniis; 5. ex *inusu corporis, artuumve torpore & gravitate*; 6. *subita defatigatione* a labore, ambulatione, vel motu qualicumque inconsueto aut paulo fortiori, cum *respiratione difficili, aut palpitatione cordis*; 7. ex *vertigine*, præsertim si caput subito deorsum & iterum sursum movetur; 8. *gravitate aut dolore capitis* frequentiori aut diuturniori, sine alia causâ manifesta; 9. ex *pressionis & anxietatis sensu* frequenti circa præcordia; 10. ex *hemorrhagiis spontaneis* sæpe accidentibus; 11. *levamine ex spontaneis aut artificialibus sanguinis evacuationibus*; 12. ex *evacuationibus sanguinis naturalibus suppressis*, vel artificialibus consuetis neglectis.

V.

Subiecti igitur sunt plethoræ quam maxime, 1. homines *Quinam*
victu largo sive pleno *utentes & simul otiosi*, aut vitæ seden- *plethoræ*
 tariæ dediti; adeoque, & cumprimis litterati, si parco non *Subiecti.*
 fruuntur victu, cujuscumque etiam sint ætatis, senes æque ac
 juvenes; 2. qui *evacuationibus sanguinis spontaneis* quibuscum-
 que antea adlueti fuerunt, quæ vero jam suppressæ sunt; 3.
 qui *evacuationibus sanguinis artificialibus* aliquandiu usi
 sunt, eas vero postea, victu haud diminuto, ob quascum-
 que rationes intermittunt aut negligunt; 4. qui *vitam an-*
tea mobilem aut laboriosam in sedentariam atque otiosam
 mutarunt, & tamen victu pariori, quam antea, non utun-
 tur.

VI.

Hinc *caussa plethoræ primaria* est *victus plenus cum otio*, *Causa*
 aut vita sedentaria conjunctus; & deinde *suppressio evacua-*
tionum sanguinis consuetarum, sive naturalium sive artifi- *ejus.*
 cialium; itemque *transpiratio impedita*, vel prorsus cohibita:
 inde fit, ut plethora multorum morborum sæcunda evadat,
 mater, licet per se morbus primo & proprie non sit.

VII.

Quod *ad prognosin* attinet, sciendum, plethoricos facilius, *Prono-*
 adeoque *sapius morbis esse expositos, quam alios*; præcipue *sis.*
 vero periculosis *profusionibus sanguinis, febribus acutis*, atque
inflammationibus internis & externis, itemque *obstructionibus*,
destillationibus, sive catarrhi *spasmis* ac *doloribus* omnis ge-
 neris, & quam maxime etiam *moribus subitaneis*, ut apo-
 plexiæ, catarrho suffocativo, polyposis concretionibus in cor-
 de vasisque sanguiferis. Speciatim vero *plethora, quæ a sup-*
pressis hæmorrhagiis consuetis provenit, facilius ac citius ple-
 rumque morbos excitat, quam reliqua. Ita & *complicata*,
 ubi simul sanguis valde viscidus aut pituitosus, plures &
 graviores morbos producit, quam simplex; hæc enim quam
 maxime lædit liberam circulationem, respirationem, secre-
 tiones atque excretiones: & hinc obstructions vasorum,
 tumores, inflammationes & corruptiones humorum oriuntur
 quam plurimæ ac variæ.

Si *cum acrimonia*, præsertim alcalica, aut biliosa, atque
 inde nato sanguinis calore p. n. sive *orgasmo* combinata
 est,

est, graviora quoque, quam simplex, mala inducit, adeoque, quantum fieri potest, evitanda.

VIII.

Præservatio & cura simplicissima.

In præservanda vero & curanda plethora duo præcipue requiruntur: primo victus, sive *dieta moderata* aut parca, & deinde *motus corporis frequens*; qui enim hæc rite observabit, a morbis plethoræ liber erit, & præcipua sine sumptibus aut pretio, quæ Deus gratis unicuique largitur, adversus quam plurimos hos morbos novit & possidet remedia. (a) Quia vero plerique delicatiores ac ditiores, gulæ magis indulgentes, quam sanæ rationis ductum sequentes, vilia hæc, licet efficacissima atque certissima remedia, renuunt, & ignaviæ, gulæ, ac voluptatis causa, adhibere aut observare nolunt, hinc fit, ut hi non solum quamplurimis morbis acutis & tardis corripiantur, verum etiam, ut multi eorum morbi chronici, v. gr. articulorum morbi, podagra, hæmorrhoides, hypochondriaca mala, obesitas nimia, cachexia, hydrops, respiratio difficilis, asthma, catarrhi varii, febres chronicæ ac lentæ, hæctica, calculi, &c. funditus curari in eis non possint. Oportet enim, ut divus HIPPOCRATES monet, (b) *non solum Medicum, sed & agrum, immo & adstantes suum facere officium*, si optatum finem hic obtinere concupiscit.

IX.

utilificiosa magis.

Quoniam autem quamplurimi, præsertim Magnatum, divitum, ac gulæ deditorum, ut modo (N. VII.) dictum est, hoc non faciunt aut observant, sed victus rationem, sive uno verbo, *dietam* ac motum negligunt, & tamen a Medicis desiderant, ut eos ab ejusmodi morbis, non solum curent, sed & præservent; quapropter, quia hic diætæ neglectus plerosque morbos post se trahit, adeoque Medicis maxima confert emolumenta, (dum jam diu a priscis *intemperantia nutritrix Medicorum appellata* est), Medicus, ut quantum in se est, ac fieri potest, sanitatis eorum curam gerat, alias easdemque magis artificiosas ac cariores & præservandi & curandi rationes, aliaque remedia, plethoræ adversa, tam ex pharmacacia quam chirurgia, substituere cogitur: & primo quidem præservandi causa *purgationes alvi*, sæpius, singulis circiter mensibus, aut in quibusdam adhuc frequentius, pro rerum, circumstantiarum, & malorum varieta-

(a) Confer. uberius Regulæ pro sanitate conservanda in Compendio nostro Institut. Medicar. datæ p. 14. (b) Aphorism. I. Sect. I.

rietate, repetitas; deinde *sanguinis missiones*, vel per *venæ sectionem*, bis in anno, ut circa æquinoctia, aut quandoque frequentius, ut ter vel quater in anno, singulis scilicet tribus vel quatuor mensibus institutam; vel etiam *scarificationes*, singulis nimirum, aut duobus vel tribus mensibus repetitas: quibus etiam tertio *sudores*, vel saltem largior *transpiratio*; sæpius, matutino tempore, in lecto commode & magno cum fructu,ungi possunt. Atque eadem etiam in *curatione morborum a plethora*, sive sanguinis abundantia orisindorum, sunt facienda, ubi tamen sanguinis iusta & opportuna detractio remedium princeps est.

X.

Ubi vero plethora complicata, & *spissitudo*, sive, ut vulgo dicunt, *cachexia plethoræ juncta est*, tunc præter dicta, etiam remedia hanc *digerentia atque attenuantia* sunt usurpanda, sicuti sunt omnis generis infusa herbarum, radicum, lignorum, corticum, aliorumque remediorum attenuantium, resolyentium, amaricantium, vel grato odore gaudentium, imprimis & nominatim herbæ theæ, veronicæ, betonicæ, salviæ, card. bened. trifol. fibrini, saponariæ, rad. scorzonæ, cichorei, sarsaparillæ, chinæ, lign. sassafras, juniperi, santali, &c. cum aqua fervente, infusione vel leni coctione, parata; præterea omnis generis Tincturæ, Essentiæ, & Elixiria, eamdem virtutem obtinentia, cum primis amara, atque blanda, aromatica, ut Ess. absinth. simplex & compos. fumaræ, trifol. fibrin. card. bened. scordii, cortic. aurant. rad. gentian. amara Hallensis, pampinelinæ, aliaque similia, Elixiria quoque varia stomachica hinc inde in officinis usitata & extracta amara, Tincturæ porro salinæ acres, ut Tinct. tartari, antimonii, tartarizata, liq. terræ foliatæ tartari, ac sæpe ipsæ *aquæ medicatæ* sive *minerales*, egregia sane & valentissima sæpius his in morbis remedia; quæ vero, nisi evacuatio sanguinis sufficiens eorum usum præcedat, debitaque ratione & prudentia usurpentur, parum vel nihil proficiunt, immo perverso usu potius nocent. Ceterum in curatione hujus plethoræ *victus sit parvus*, ac moderatus, vitenturque glutinosa, viscida, pingua, dura legumina, farinosa, & similia.

XI.

Si *æstus sive orgasmus sanguinis concurrat cum plethora*, qui ab acris, alcalicis salibus, vel & a sulphureis sanguinis particulis copiosioribus oriri videtur, tunc *medicamenta temperantia* appellata, ut lap. cancr. & conch. citrat. hisque similia quam plurima, potus aquosus, nitrofa, salia media & lenia acidula conveniunt; ut sal absinthii, card. benedicti,

centrum antimoniatum, arcan. duplicat. tartatus vitriolatus antimonium diaph. pulvis temperans noster, aliufve similis; Tincturæ acidæ, ut Tinctura rofar. flor. bellid. papaveris; spiritus acidi, dulces redditi, & similia. *Vitellus* sit refrigerans & leniter acidulus; hinc pleraque vegetabilia blanda, acrimonia fervida destituta, his optime conveniunt, immo & *usus moderatus fructuum horæum* bene maturorum his non nocet: *carnes* vero & quæ inde parantur *aromata*, cibique & potus omnes *calefacientes* atque inebriantes *periculo* vitentur.

X I I.

Si hæ-
morrha-
gia sup-
pressa.

Si narium hæmorrhagia, menses aut hæmorrhoides sup-
pressæ sunt, harum fluxus propriis remediis, (de quibus
infra suo loco,) est restituendus: quo factò, symptomata
inde producta brevi plerumque cessant, & tunc artificiales
sanguinis evacuationes, si fluxus rite rursus procedat, sæpis-
sime intermitteri possunt; *sin vero hæ evacuationes sanguinis*
restitui nequeant, dum quandoque omnium remediorum vim
eludunt, *sanguinis missiones artificiales* (N.IX.) *substituendæ*
sunt; id quod etiam fieri debet in hæmoptysi, vomitu cruento,
& mixtu cruento, utpote quæ sanguinis vitiosæ excretio-
nes, quando quiescunt, minime irritandæ aut resuscitandæ;
sed potius per artificiales avertendæ: quo ipso autem Medi-
cus ductum naturæ tunc non sequi, ut multi hodie volunt,
& Ministrum ejus agere, sed potius *ejus debet esse director*
& *dominus*; ut uberius evici in Dissertatione de Medico
naturæ domino.

Monita practica.

1.

Qui frugali utitur dieta & motu corporis frequentiori, vel labo-
ribus aut exercitationibus se frequenter exercet, dum sanus
est efficacissima possidet remedia contra plethoram, & om-
nes inde pendentes morbos, atque evacuationibus artificiali-
bus vix aut raro saltem indiget.

2.

Ubi venæ sectio requiritur *plethore solum minuendæ gra-*
tia, perinde mihi esse videtur sive in brachio, sive in pede
ea celebretur. Interim tamen multi malunt, ut *apud junio-*
res in brachio, post annum vero quinquagesimum *in pede*
semper instituitur; id quod tamen non est perpetuum,
quia res id sæpe aliter requirit.

Si

3.

Si hominem morbi plethoræ affligunt in partibus supradia-
phragma, ut in pectore, verbi causa, hæmoptysis aut respi-
ratio difficilis; vel in capite, dolor capitis, vertigo, apo-
plexia; in oculis, inflammatio, &c. phlebotomia in pede
revulsionis gratia utilius plerumque perficitur; *sin vero infra*
diaphragma, eandem ob revulsionis causam, in brachio;
nulla ætatis habita ratione, sanguis educatur. Excipiendæ
tamen mensium & hæmorrhoidum obstructions, ad quas refe-
randas aut revocandas, venæ in pedibus sunt secandæ,
quando vero nimis fluunt, revulsionis gratia, in brachio.
Interea tamen optatio etiam cum successu in variis capitis,
oculorum, faucium & pectoris morbis, & præcipue inflam-
mationibus earum partium, sanguis quoque e venis brachii
educitur.

4.

Sanguinis missio nimis parca in homine valde plethorico nihil
proficit, atque non raro febres aut arthriticos affectus post
se trahit: hinc sufficienti copia pro abundantia, morbi,
aut ægri diversitate, semper educatur.

5.

Phlebotomias in variis paroxysmis, ut febrium intermitten-
tium & arthriticis institutas, aut in fluxu menstruum, aut
hæmorrhoidum, aut narium modico, sæpius nocere, atque
naturam turbare observatum est; adeoque expectandum tunc
est ut plurimum cum sanguinis detractione, si ea opus est,
donec paroxysmi præterierint, atque interea medicamentis
temperantibus, blande resolventibus, ac diaphoreticis agen-
dum. Attamen inde non sequitur, ut nonnulli male docent,
ac si in ullo paroxysmo vena secanda sit; cum potius contra
in hæmorrhagiis nimis quibuscumque, revulsionis causa,
summo cum fructu, immo fere necessario sæpe instituat,ur,
itemque in asthmaticis, suffocativis, & apoplecticis paro-
xysmis, a plethora oriundis, sine periculo omitti aut differri
sæpe non possit.

6.

Sanguinis missiones, quæ præservationis gratia instituuntur
magis

magis prodesse observantur, si circa *aquinoctia*, vere nimirum & autumnno, quam si circa solstitia vel alio tempore fiant. Attamen valde plethoricis, vel ubi consuetudo jam invaluit, praesertim in vegetis ac robustis, *sepius quam bis*, adeoque etiam magno cum fructu circa solstitia sanguis abundans educitur: cumprimis vero iis, qui haemoptysi, palpitatione cordis vehementi, animi deliquiis, metui apoplexie, mictui sanguinis, fluxui mensium vel haemorrhoidum nimio, aliisque similibus plethorae morbis obnoxii sunt.

7.

Qui scarificationes libentius admittunt quam phlebotomiam, vel qui phlebotomiam vehementer, ob quamcumque etiam causam, avertantur, quales multos novi, vel quibus *venae non facile incidi possunt*, ii eundem effectum & utilitatem, quicquid nonnulli obloquuntur, inde expectare possunt, quam a venae sectione, ut saepe observavi, si modo larga satis sanguinis copia iis educatur, eoque certis temporibus, sicuti venae sectiones, pro indeole morbi & aegri repetuntur.

8.

Qui vero evacuationibus ejusmodi per aliquod tempus sunt assueti, nisi vitae genus quietum in mobile sive laboriosum transmutent, aut victu parciori utantur, ut plurimum ad feram usque aetatem, licet etiam octogesium annum superaverint, eas continuare debent, neque temere praetermittunt. Falsum enim est, sanguinis missionem senibus omnibus, ut multi putarunt & adhuc putant, esse noxiam; aut, ut nonnulli dixerunt & adhuc dicunt, senibus sanguinem potius emendum & in venas infundendum, quam educendum aut subtrahendum esse.

9.

Plethorici imbecilles sive valetudinarii ab abusu omnium calorem nimium sive orgasmum sanguini inducentium, tam in victu quam medicamentis, abstinere & sedulo sibi cavere debent.

10.

Itemque a motu nimis violento ac subitaneo, quia palpitationes cordis, animi deliquia, apoplexiam, sanguinis profusio,

flavia, ac speciatim hæmoptysin, aliaque multa gravissima mala hoc ipso sibi concitare possunt, frequentes vero & moderate ambulationes, unctiones, equitationes aliæve ejusmodi modicæ exercitationes his egregie conveniunt; hancque ob causam aquæ minerales tantos sæpe multis in morbis gravibus exerunt effectus: quia homines, in earum usu, frequenti & fere continua utuntur exercitatione ac simul moderato victu, quæ profecto ad sanitatem quam maxime conferunt.

CAPUT II.

De Febris in universum, & speciatim de intermittentibus.

I.

Quoniam Febres morbi sunt frequentissimi & communissimi, ita ut effato celeberrimi Sydenhamii tertia pars ægrorum febribus laboret, & secundum Veteres nonnullos, vix sit sine febre mori; hinc præ reliquis hic earum considerationem trademus, præsertim quia multi admodum male aut obscure de ipsis scripserunt.

Febris morbus frequent.

II.

Febris vero generatim nobis dicitur calor præter naturam, sive intemperies calida, cum virium læsione, a motu cordis & arteriarum frequentiore, prægresso plerumque horrore sive frigore qualicumque, subsequente motu sanguinis vehementiori, & ut plurimum siti ac dolore capitis, modo leviori, modo vehementiori, cum urina plerumque tinctiori, cibi appetitus, variarumque aliarum actionum corporis humani & præcipue virium insigni, nunc tamen majori nunc minori læsione: ita ut calor præter naturam & pulsus celer, sive motus cordis frequentior, cum virium læsione, sponte, hoc est, sine causâ externa, ægrum affligentes, ac per aliquot horas aut diutius perdurantes, sint signum Februm certum sive pathognomicum, atque essentiam febris quasi constituent; quo vero motu frequentiori humores noxii in corpore ægro sæpe subiguntur & expelluntur.

Definitio ejus.

III.

Pro continuatione vero caloris p. n. & pulsus celeris diversa, febres dividuntur in continuas & intermittentes; in his enim post aliquot horas intermittunt vel plane cessant; in illis vero diutius, per unum (scilicet, duos, tres, septem pluresque dies continuant, atque hinc a Germanis fervide febres

Diviso generatissima.

bres appellantur. Continuae vero rursus in *acutas*, & *lentas*, item in continuas continentes, sive *synochum*, & *remittentes*, ut & in *exanthematicas*, & *non exanthematicas*; sed pro minori virium læsione sive prostratione, aliorumque malorum minore vel maiore vehementia, in *benignas*, & *malignas* dispescuntur. Plures earum divisiones vid. Cap. seq.

I V.

Quando febrilis quidam impetus plane aliquandiu cessat, *Febris inter-* *agerque per aliquod tempus a febre, id est calore & pulsu p-* *mittens* *n. liber est, & postea enim novo impetu, novo scilicet hor-* *& paroxysmus, quid.* *rore sive frigore, & subsequente æstu aggreditur, talis fe-* *bris intermittens dicitur. Vocatur autem nova talis aggres-* *sio, vocabulo Græco usitatissimo, paroxysmus, elegantioribus* *Latinis febris circuitus, accessio. (a)*

V.

Sym-
ptoma-
ta.

Incipiunt hæc febres intermittentes, singulique eorum *paroxysmi* ordinatæ ratione cum *horrore & frigore*, leniori aut vehementiori, quem calor præternaturalis lenior quoque aut vehementior, modo citius modo tardius, presso subsequitur pede, tandem in sudorem desinens, qui *paroxysmo* finem facit. Sed præter hæc varia adhuc alia secum trahunt *symptomata*, præcipue oris siccitatem, sitim, dolores capitis sive *cephalalgiam*, appetitum sive ciborum desiderium læsum, dolores ventriculi, nauseam, vomitus, urinæ mutationem, quandoque delirium in *paroxysmo*, modo somnum, modo *vigilias*.

V I.

Divisio
inter-
mitten-
sium.

Paroxysmi intermittentium ut plurimum statum diem *reditus* sive *circuitus* servant; attamen in hora plerumque variant: nunc enim horam unam alteramve anticipant, nunc postponunt. Quæ singulo die redeunt, *quotidianæ*; quæ alternis, *tertianæ*; quæ vero quarto die recurrunt, ægrisque *biduum* integrum est, *quartanæ* appellantur, diæque a febre liberi *intercalares*, aut Græco vocabulo, *tempus apyrexiae*, sive intermissionis, vocantur. Sæpe etiam ex errore vel diætæ, vel curæ, vel causæ materialis, benignioris aut peioris, febres hæc duplicantur, immo multiplicantur, ut inde *quotidianæ, tertianæ, & quartanæ duplices* quandoque fiant. Itaque ex iisdem causis diversa in diversis subjectis producuntur *symptomata*, ut diversum frigus & æstus, sitis maior, aut minor, fastidium ciborum majus vel minus, anxietates præcordiorum, tussis, vomitus, tormina, alvi fluxus, vel obstructio ejus, somnolentia, *vigiliæ*, delirium, &c.

Causæ

(a) Vid. Celsus Lib. II. c. 17, Lib. III. c. 3. &c.

VII.

Causa proxima harum, sicuti ceterarum febrium, est *cele- Causa.*
rior motus cordis, (qui ex pulsu arteriarum celeri cognoscitur,) productus ab irritatione ejusdem, sive ea fiat a plethora sive sanguinis abundantia, sive ab humoribus crudis, tenacibus, viscidis, biliosis, pituitosis, plus, minus acribus, tanquam *caussa antecedente*, in vasis corporis capillaribus & præsertim cutaneis, quasi coagulatis, atque in paroxysmo sere stagnantibus, (unde frigus oritur) e ventriculo & intestinis, ubi potissimum nidulantur, cum chylo, per vias chyloferas in sanguinem delatis; quorum vero. *caussa remota* varii in diæta aut ex rebus non naturalibus errores esse solent, & in primis aer humidus & frigidus, transpiratio suppressa, viscus inordinatus, nimius, crudus, crassus, ira, horror, nausea, &c. quibus vitiosi ac noxii humores, generantur, qui stagnando in capillaribus frigus, sive initium paroxysmi producant; postquam vero hoc ipso vasa, fibræ, ac præsertim cutis, itemque cor irritantur, quemadmodum oculus a corpore peregrino illapso, vel ventriculus a re molesta aut irritante in vomitu, intestina in diarrhœa vel dysenteria, fortius & frequentius moventur, constringuntur, eoque sanguis & humores commoventur, exagitantur, propelluntur; quo fit, ut frigus sensim sequatur calor sive æstus, flagrantium humorum exagitatio ac resolutio, propulsio, attenuatio, coctio, noxii tam per sudorem quam per urinam expulsio, & paroxysmi tandem finis. In quotidiana tamen, humores pituitosos; in tertiana, biliosos; at in quartana, magis pituitam tenacissimam, acido junctam, peccare, varia symptomata & causæ remotæ indicare videntur.

VIII.

Multi hodie animam rationalem, quam naturam vulgo appellunt, pro febrium causa proxima & efficiente habent. Cum vero anima nihil hac de re sciat, & paroxysmum pro voluntate neque accelerare, neque tardare, neque minuere, multo minus inhibere aut tollere possit, neque in curatione animam curemus, sed causam febrium materialem, humores scilicet noxios; hinc cum illa doctrina, primo probari non possit, maximisque propterea ac multis dubiis sit obnoxia, & deinde multa phænomena ex ea non explicari; ac denique nullam in Medicina habeat utilitatem; merito eam, tamquam incertam, baud probatam, & innumeris difficultatibus subjectam, rejicimus, præsertim quia ex nostra hac sententia omnia clarius ac melius explicari atque intelligi posse existimo.

Stebli-
noram
senten-
tia.

IX.

Diagnosis harum febrium ex antecedentibus jam habetur. *Ad prognosin* vero quod attinet, raro multum periculi eas comitatur: quia paucissimi eis moriuntur; verum plerumque salutarem acquirunt eventum, nisi perversa diæta aut inepta curatione in deterius mutantur. *Quotidianæ tamen & tertianæ facilius curantur quartanis*, quæ intermittentium pessimæ sunt, & plerumque etiam, præsertim secundum vulgarem curandi modum, magis pertinaces ac diuturnæ. Ita & *vernales* facilius plerumque sanantur *autumnalibus*, atque sæpissime post aliquot paroxysmos, servata præsertim abstinencia, sine medicamentis, sive sponte cessant: & nisi præpostere tractentur, aut præmatore per incongrua medicamenta sistantur, meliorem sæpe sanitatem pollicentur; quia iis a multis noxiis rebus corpus per alvum, urinam & sudorem liberatur, unde *salubritas febrium* a quibusdam ultra modum laudatur. Nonnullæ vero *febres intermittentes senum*, quas *vehemens somnolentia* in primis paroxysmis comitatur, tertio vel quarto paroxysmo, inopinato sæpe lethales fiunt, nisi peculiari eaque efficacissima, de qua infra dicemus, methodo tractentur. Confer. doctissim. *Tortus & Werlhoffius* de febribus, item *Lancisius* de mortibus subitaneis. Ita etiam intermittentes pertinaciores, si *ineptis* aut etiam *solum lenioribus*, aut *saltem minus efficacibus remediis tractantur*, facile cachexiam & hydropem post se trahunt, sicut antiquissimi Medici jam notarunt.

X.

Curatio.

In *curatione* febrium intermittentium præ omnibus *primæ via respicienda*, dum plerumque victus errores sequuntur, & saburra viscida, pituitosa, biliosa, incidenda, attenuanda, emendanda, & evacuanda. Deinde dispositio similis in sanguine corrigenda, destruenda, expellenda; ventriculus, quia læsus, roborandus, bona digestio restituenda, & symptomata urgentia mitiganda.

XI.

Extra paroxysmum humores peccantes viscida optime emendantur & attenuantur *atranis & salinis*, tam alcalicis, quam me-

mediis: ut sunt Effent. absinth. simplex & composita. Effent. ^{paroxysmum amara & salina.} gentianæ, cort. aurantiorum, fumariz, centaur. minor. tri-
fol. fibrin. cascarilla, alexipharmaca, aliaque similia, vel
Elixir antifebrile Mynsichti, ejusdem Elixir vitrioli; Eli-
xirium proprietatis, Mixtura simplex, R tartari, R anti-
monii tartarizata &c. &c. ad gutt. 50. vel 60. vehiculo
quocumque, præsertim tamen mane, calido, vel etiam circa
meridiem, & postea vino exhibita. Ex *salinis* omnia salia
alcalica ex cineribus herbarum, præsertim amararum, pa-
rata: ut Sal absinthii, centaur. min., card. bened. &c. Ex
Salibus vero *mediis* sive *mixtis*, tartarus vitriolatus, arcan.
duplicat. Sal digestivum Sylvii, Sal antimoniatum, Sal
aramoniacum, &c. quæ salia singulo trihorio vel quadri-
horio ad ℥j. vel robustis ad gr. xxv. vel 3℥. alternatim
cum Effentis aut Elixiriis illis antea nominatis, ex infu-
so herbæ Theæ, decocto Caffæ, juscule, cerevisia calida,
vel aquis destillatis, ut aqua cardui benedicti, fumariz, men-
thæ, cinnamomi, &c. propinanda; ubi tamen observandum,
quod *frigidioribus magis amara & aromatica*, calidioribus *sa-
lina & subacida* magis conducant.

Plerumque vero *in harum febrium principio* ad purgandas
ac liberandas a vitiosis humoribus primas vias *Vomitoria*
quoque sunt utilia, immo sæpe necessaria, potissimum si ægri
de amaritie oris, angustiiis, constrictionibus atque anxietati-
bus præcordiorum, cardialgia, pressione & ponderis sen-
su circa ventriculum, vertigine aut singulari nausea, vel vo-
mendi conatu conquerantur: quæ tunc, vel *mox in princi-
pio*, vel etiam, pro rerum circumstantium varietate, post
aliquot paroxysmos, usurpatis prius per aliquot dies prædi-
ctis medicamentis, corrigentibus, amaris ac salinis, (N.
XI.) quatuor vel quinque horis ante paroxysmum in quo-
tidiana, vel die intermissionis, in tertiana aut quartana ex-
hibeantur. Dari hunc in finem commodissime potest *tartarus
emeticus* ad gr. j ℥. in debilioribus; al gr. ij vel gr. ij ℥.
in robustioribus, sub forma quacunque libuerit; optime ta-
men datur in forma pulveris cum ℥ss. vel ℥j. alicujus sa-
lis ex prænominatis; vel vini emetic. ʒi℥. ad ʒiii. immo
robustis ad ʒij℥. Si cui vero *radix hypococcone* magis arri-
deat, hæc a ℥j. ad gr. xxv. vel 3℥. exhibetur, subjuncto
postea, si vomitus sequitur, potu frequenti ac copioso a-
quæ tepidæ, vel infusi tenuioris herbæ cardui benedicti, pro
meliori & faciliiori saburræ peccantis solutione & evacua-
tione. Hæc in nonnullis, ubi amarities in ore, cibi fasti-
dium, nausea, vomendi conatus inanis, aut cardialgia con-
tinuant; vel sublata, aut sponte, aut errore in dicta com-
mis-

misso, redeunt, post aliquot dies subinde repetenda sunt: ita hoc modo noxia e ventriculo, intestinis, pancreate, hepate ac liene egregie excurantur, variæque in his partibus factæ obstructions referantur, ut non raro post vomitorii legitimam effectum febris non amplius redeat, sed tota sublata sit. Ubi vero nullum adest indicans vomitorii, æger difficulter vomit, aut debilis est, aliudve contra indicans adest, vomitoria omitti debent; quia ægris valde ut plurimum molesta sunt, debiles magis debilitant, nonnullis vero, ut phthisicis, hæmoptoicis, vomitu cruento, vel hernia laborantibus, &c. aperte nocent.

XIII.

Purgantia

Quod si vero æger sit debilis, aut difficulter nimis vomat, vel nullum indicans vomitorii adsit, aut aliz rationes adsint vomitoria vetantes, e contrario autem prava victus ratio prægressa, flatus, tormina, obstructions, dolores & molestiæ circa hypochondria, aliæ in abdomine mala percipiuntur, *purgantia*, eaque lenia, ac si res exigat, repetita, loco vomitoriorum substitui possunt ac debent: ut rhabarbarum, fol. sennæ, tamarindi, sub forma pulveris, boli, potiunculæ aut vini medicati; pulvis jalapæ, aut *pilule* variz purgantes, hodie usitatiores, præsertim tartaræ Schroederi, Quercetani aut Bontjii, Extr. panchym. Croll. aut *pilule balsamicæ* vel polychrestæ hodie adeo decantatæ, Becherianæ scilicet aut Strahlianz, nostræ aliæve similes; aut sal amarum catharticum Anglicanum vel Bohemicum, ab ℥ss ad ℥j. aut sal mirabile Glauberi, abstinendo a violentioribus, quia turbant & debilitant, atque sic febrem vehementiorem reddunt. Ita & quandoque *Clysteres*, si alvus obstructa, & flatus sive fæces duræ ægro negotium facessunt, ad hæc malâ mitiganda adhibendi sunt.

XIV.

*Vena
sectio.*

Plebotomia, nisi manifesta & magna plethora, aut æstus valde ingens adsit, aut aliud quid eam indicet, in his febribus rectius omittitur; quando autem contra vel manifesta plethora adest, vel consueta sanguinis excretiones suppressæ, & cum primis in mulieribus menses, quam utilissime venæ sectio instituitur; ubi eam sæpius egregio cum successu institui: at si instituenda, eam extra paroxysmum atque die a febre libero, instituere præstat.

XV.

Postea *dyscrasia sanguinis*, quam a corruptis ac vitiosis humoribus e ventriculo & intestinis acquisivit, & quæ febrem fecit, iisdem medicamentis alterantibus, corrigentibus, sive attenuantibus, tam forma fluida, quam solida (N. XI.), continuato usu, emendatur, iisque ipsis etiam *symptomata* simul mitigantur & minuuntur, atque ipsa febris profligatur.

*Uterius
febris &
sympto-
matum
curatio.*

Speciatim vero *sitim*, *estumque nimium moderantur*, ac simul sanguinem spissum attenuant, acremque temperant, partim *sufficiens potus aquosus*, ut infusum Theæ, Caffæ, veronicæ, card. bened. præsertim in principio paroxysmi, aliaque similia: item *cerevisia tenuis* cum paucis nitro, vel frustulis dissecti pomi citri adjectis. Vel, præsertim in progressu paroxysmi aut ejus declinatione, quando cumprimis ægri potum calidum averfantur, *decoctum hordei citratum* aut blandè acidulatum, v. g. Subl. vitrioli, sulphuris clysto antimonii, vel sirupo citri, sirup. ribesior. berberis, vel ceras. acidor. vel etiam *aqua simplex* panis tosto alterata, cum vel sine frustulis citri; vel sirupo acidulo q. s. ad gratum saporē, vel aqua simplex cum paucis vino & saccharo, additis vel omissis citri frustulis; partim *mixture diaphoretica* ex aquis distillatis temperatis, cum pulveribus temperantibus, & leniter diaphoreticis, pro materia vitiosa febrili cum corrigenda rum e sanguine expellenda, ut lap. 69. antimonio diaphoretico, aliisque temperantibus jam supra (N. XI.) laudatis, addito sirupo quodam grato ex modo laudatis. Quibus ita, una cum *dieta parca* & tenui, per aliquod tempus rite usurpatis, hæc febres, præsertim vernaes, post aliquos paroxysmos, intra quatuordecim dies, vel citius quam optime sæpe solent profligari,

XVI.

Quod si vero intra hoc tempus non fiat, primæ tamen viæ bene prius purgatz & vitiosi humores ex parte correcti sint, tunc ad *specifica antifebrilia*, id est, febrem peculiari virtute sistentia, accessus fieri potest: qualia plurima laudantur, & inter hæc maxime *specificum antifebrile Crolii*, aut *Strobelbergeri*, itemque *Regulus antimonii medicinalis*, aliaque similia terrea ad ℥i. bihorio vel trisorio ante paroxysmum exhibita, commendantur. Ita & *mixture febrifuga Crolii*, ex aquæ cardui benedicti ℥ij. Sal. absinth. ʒβ. succ. citr. ʒiij. constans, vel in robustioribus ex Sal. absinth. ʒj.

*Specifico
antifebri-
lia.*

B.

& succ.

& succ. citri; ʒʒ. aut Essent. abſinth. ʒj. cum Essent. vitrioli ʒʒ. ante accessionem semel iterumque data, sæpe juvat. Præterea omnia superius laudata salia, majori paulo dosi & sæpius exhibita, febres has sæpe proſigant. Quidam alumen vel per se, ad ʒj. vel ʒʒ. vel cum NM part. æqual. datum, valde extollunt, sed ob nimiam adstrictionem & inde metuenda mala, valde suspectum est; id quod & de pulvere gallarum, qui a Gallis in Acad. Reg. ad ʒj. valde laudatur, sentiendum esse puto.

Nonnulli piper quoque præsertim phlegmaticis, ad grana xx. & ultra; alii capſicum, quod piper Hispanicum vulgo audit, ex spiritu vini ante paroxysmum aliquoties sumptum, valde commendant; quæ vero ob fervorem nimium facile præsertim imbecillis nocent, & calorem p. n. vel alia mala inducunt.

Alii Nucem vomicam, & huic affinem Fabam S. Ignatii a gran. v. ad x. vel solam, vel cum aliis mixtam, & ante accessionem datam, magnopere laudant (a); alii vitrum antimonii, immo ipsum arsenicum ad gr. j. vel ij, immo gr. iij. pro specifico euporisto habent; quæ vero tamquam violentiora & venenata, aut ad naturam venenorum quam proxime accidentia, non facile, & forte non nisi in casu necessitatis, ubi secuta non præstarent, adhibenda. Flores chamæmeli contra, tam in decocto, quam in forma pulveris aut electuarii, larga dosi propinati, securissimi sunt, & multum sæpe in febribus hisce debellandis præstant. Ita & radix pentaphylli aut imperatorie aut gentiane, vel & cortex cascailla, vel cortices aurantiorum in pulvere vel electuario, larga & sæpe repetita dosi, febres has egregie & tuto sæpe tollunt. (b). Id quod etiam haud raro crocus martis antimoniatuſ, quem Stahliaſi valde extollunt, perficit, itemque pilule Wildegansi dictæ. At si securiora ex his debitum effectum non præstant, sicuti sæpius contingit, aut certioris effectus causa omnibus illis tamquam minus certis, uti nolimus, ne scilicet ægri nimis diu a febre torqueantur, corticis peruviani sive china china legitimas usus (licet multis adeo exosus sit, & multa obloquantur,) intermittentes quascumque certo & tuto etiam proſigat, sub quacumque forma exhibeatur; qui propterea hodie mihi & plerisque bonis practicis præ omnibus aliis specificis usitatissimus, iisque me-

(a) Vid. Valentini Polychrest. exotic. ubi de Fabâ hæc differt, itemque ejus Museum Museor. (b) Conf. Differt. nostra de Aurantiis, eorumque eximio usu medico, q. Helmſtadii 1742. edita.

merito præferendus est. (*) *Externis vero remediis*, quorum varia a nonnullis, ut pulsibus applicentur, vel collo appendantur, tamquam specifica magnopere prædicantur, haud fidendum, quia vel superstitiosa, vel causam non attingunt; adeoque plerumque vana sunt, & non nisi forte fortuna juvant.

XVII.

Dietæ, febre durante, tenuis sit & parca, vel abstinentia aliquot servetur dierum: hac enim, experientia teste, multæ febres omnino profligantur. *Potus*, pro sitis ratione, statatur sufficienti, tenui, aquoso, (N. XV.) & quidem in frigore paroxysmi, calido vel saltem temperato, in calore vero & declinatione paroxysmi (quia ægri a potu calido sæpe abhorrent) paulo frigidior esse potest, vitando tamen nimis frigidum, ejusque præsertim nimiam copiam simul & semel ingestam. Die paroxysmi, æger ante paroxysmum prorsus a cibo abstineat, & si sitis urgeat, nullum potum nisi calidum & aquosum, imprimis vero infusum Theæ vel Coffeæ, vel florum chamæmelli aut card. bened. assumat. *Vitet frigus* & ætatem frigidum aut humidum, atque in paroxysmo, se lectulo mox committat, corporeque bene tecto, sudorem patienter ferat, vix enim ulla febris sine sudore bene curatur: qui vero in paroxysmo egregie promovetur potu calido vel saltem temperato, aqueo, sæpius assumpto, præsertim si in principio sudoris essentia amaræ alicujus (N. XI.), vel diaphoreticæ, aut alexipharmacæ gutt. 40. & 50. in potu calido simul assumantur.

Monita practica.

1.

Febre profligata victus parvus ac tenuis, medicamenta amara, stomachica & roborantia (N. XI.) adhuc aliquandiu sedulo continuanda, haustulus vini genetosi in pastu usurpandus, *frigusque* diu vitandum, & ne morbus hic, quod ei alias solemne est, facile *recredescat*, præsertim si jam antea pertinacioris fuit indolis, aut jam sæpius *recreduit*, bis tertie in die *portio aliqua corticis chinæ*, vel *cascarille*, & quidem in tertianis curatis post octiduum a superata febre, in quotidianis vero & quartanis, tertia quavis post debellatam febrem hebdomade, salutariter usurpanda, subjuncto tempore idoneo motu corporis moderato, & præsertim ambulatione, aut equitatione, aut uestitione frequenti.

B 1

2. Si

(*) Vid. uberius de præstantia hujus corticis doctif. *Fontbeissi* observationes de Febris, & cautiones ejus medicæ.

2.
Si *agri sudores* in paroxysmi declinatione oriundos refrigeratione corporis *impediunt*, augent lassitudinem corporis, morbum protrahunt, varia insolita eaque sæpe gravia hoc ipso symptomata excitant, & febres leves facile in lentas periculosissimas, hæcticam, cachexiam, œdemata, asthmata, hydroperim, aliosque pessimos morbos transmutant: quæ mala sæpe inforti Cortici peruviano, sed falso adscribuntur.

3.
E contrario, quo *tranquillius acri in paroxysmo se gerunt*, patientiusque sudori indulgent, eo citius materia noxia febrilis subigitur & expellitur, eo citius proinde omnia symptomata mitescunt, eo citius febris curatur, & eo melius ac certius prævæ sequelæ avertuntur.

4.
Potus sufficiens tenuis (N. XV.) acri, præsertim in paroxysmo, pro sitis ratione, non solum non denegandus, sed potius *commendandus*; qui vero in frigore, ut dictum, non frigidus, sed calidus, aut saltem, si forte æger calidum bibere recuset, temperatus esse debet; neque spissus aut inebrians, sed aquosus, quique non assatim, aut præcipiti modo, at modicis haustibus sensim sensimque ingerendus.

5.
Sudorifera & amara in paroxysmo, quando æstus minui, & sudor erumpere incipit, magno cum fructu, ad sudorem promovendum noxiumque e sanguine expellendum, exhibentur; si citius, calorem nimis augent, & deliria, aliaque mala sæpe inducunt.

6.
Frigus nimium in paroxysmo quarundam febrium, & præsertim quartanarum, lenitur calore lecti, potu calido, balsamis stomachicis & aromaticis, ventriculo ac spinæ dorsi calide illitis. Item spiritu vini rectificato, linteis complicatis, calide ventriculo impositis, stragulis sufficientibus, lapidibus, aliisve machinis calidis pedibus suppositis.

7.
Febre debellata, si *cibi desiderium diutius deficiat*, R. vitrioli martis Ludovici, aut Elixir. vitrioli Myns. bis, terve in die ad gutt. 50. sumpta, egregie profunt, interpositis lenibus purgantibus.

8.
Cortex peruvianus, aliæve *specificæ febres sistunt*, præsertim vero adstringentia fortiora, si exhibeantur, antequam materia febrilis probe evacuata & correctæ est, graviora sæpe mala inducunt: ut obstructions alvi, angustias præcordiorum, dolores ventriculi, cachexiam, icterum, œdemata, asth-

asthmata, hydropes, inflammationes, febres lentas, hecti-
cam, &c. Minus tamen hæc à cortice peruviano, cascari-
llæ & aurantiorum metuenda, quam ab adstringentibus aliis
fortioribus.

6.

Cortex peruvianus, divinum sane remedium, non *particu-
lis adstringentibus*, aut vi adstringendi ut multi male existi-
mant; sed *particulis suis amaris, roborantibus, ac balsamicis*,
febres pellit ac sanat: hinc tantum periculum, ut multi pu-
tant, ab ejus recto usu non est pertimescendum.

16.

Voracitas in febribus intermitentibus morbum diu proten-
dit; aut morbo superato recidivam ejus excitat: hinc serio
vitanda.

11.

Contra æstum & sitim ægris æqueus potus sufficienti copia
dandus, isque pro majori effectu, gratis acidis supra nomi-
natis est temperandus, vel & paucò vino rhenano & mo-
sellano.

12.

Ægri, quò magis antea valetudinarii aut imbecilles fuerunt,
eo cautius cum specificis & vomitoris sunt tractandi, roba-
rioribus vero minus nocent.

13.

Febres intempestive suppressæ & alia mala, cum primis ab-
dominis duritiem, adstrictiones alvi, & dolores circa hypo-
chondria, excitantes, blande laxantibus, præsertim pilulis tar-
tareis, balsamicis, aut polychrestis, aut vivis medicatis la-
xantibus, optime revocantur; quæ deinde præparato ac pur-
gato rite corpore, methodo præscripta, denuo curandæ.

14.

Oedemata, post intermittentes, ut sæpe vel ob potum ni-
mium sit, vel ob sudorem impeditum, relicta, frictionibus,
motu corporis, exercitationibus, salibus digestivis, atque ef-
fusiis, itemque infusis amaris, cum vino aut cerevisia pa-
tatis, præsertim ex carduo bened. summit. absinth. bacc. ju-
nipet. cort. aurant. & cascariill. imò & ipsius chinæ curan-
tur, interpositis subinde remediis martialibus, lenibusque la-
xantibus, atque observata simul tenui ac parca dieta, &
vitato potu nimio.

15.

Abjurdentia terrea antifebrilia, & antimonialia in febribus
his nimis copiose exhibita venter facile vehementer
ledunt, adeoque nimis eorum usus vitandus.

16.

*In quartanis præsertim senum, aut imbecillium vehemen-
tiora*

B 3



2.
Si *agri sudores* in paroxysmi declinatione oriundos refrigeratione corporis *impediunt*, augent lassitudinem corporis, morbum protrahunt, varia insolita eaque sæpe gravia hoc ipso symptomata excitant, & febres leves facile in lentas periculosissimas, hecticam, cachexiam, œdemata, asthmata, hydropem, aliosque pessimos morbos transmutant: quæ mala sæpe inforti Cortici peruviano, sed falso adscribuntur.

3.
E contrario, quo *tranquillius agri in paroxysmo se gerunt*, patientiusque sudori indulgent, eo citius materia noxia febrilis subigitur & expellitur, eo citius proinde omnia symptomata mitescunt, eo citius febris curatur, & eo melius ac certius pravæ sequelæ avertuntur.

4.
Potus sufficiens tenuis (N. XV.) ægris, præsertim in paroxysmo, pro sitis ratione, non solum non denegandus, sed potius *commendandus*; qui vero in frigore, ut dictum, non frigidus, sed calidus, aut saltem, si forte æger calidum bibere recuset, temperatus esse debet; neque spissus aut inebrians, sed aquosus, quique non assatim, aut præcipiti modo, at modicis haustibus sensim sensimque ingerendus.

5.
Sudorifera & amara in paroxysmo, quando æstus minui, & sudor erumpere incipit, magno cum fructu, ad sudorem promovendum noxiumque e sanguine expellendum, exhibentur; si citius, calorem nimis augent, & deliria, aliæque mala sæpe inducunt.

6.
Frigus nimium in paroxysmo quarumdam febrium, & præsertim quartanarum, *lenitur* calore lecti, potu calido, balsamis stomachicis & aromaticis, ventriculo ac spinæ dorsi calide illitis. Item spiritu vini rectificato, linteis complicatis calide ventriculo impositis, stragulis sufficientibus, lapidibus, aliisque machinis calidis pedibus suppositis.

7.
Febre debellata, si *cibi desiderium diutius deficiat*, R. vitrioli martis Ludovici, aut Elixir. vitrioli Myns. bis, terve in die ad gutt. 50. sumpta, egregie prosunt, interpositis lenibus purgantibus.

8.
Cortex peruvianus, aliæque specifica febres sistunt, præsertim vero adstringentia fortiora, si exhibeantur, antequam materia febrilis probe evacuata & correctæ est, graviora sæpe mala inducunt: ut obstructions alvi, angustias præcordiorum, dolores ventriculi, cachexiam, icticum, œdemata, asth-

asthmata, hydropes, inflammationes, febres lentas, hecticam, &c. Minus tamen hæc a cortice peruviano, cascarillæ & aurantiorum metuenda, quam ab adstringentibus aliis fortioribus.

9.

Cortex peruvianus, divinum sane remedium, non *particularis adstringentibus*, aut vi adstringendi ut multi male existimant; sed *particularis suis amaris, roborantibus, ac balsamicis*, febres pellit ac sanat: hinc tantum periculum, ut multi putant, ab ejus recto usu non est pertimescendum.

10.

IVXCT

Voracitas in febribus intermittens morbum diu protulit; aut morbo superato recidivam ejus excitat: hinc serio vitanda.

11.

Contra astum & sitim ægris aqueus potus sufficienti copia dandus, isque pro majori effectu, gratis acidis supra nominatis est temperandus, vel & paucò vino rhenano & mosellano.

12.

Ægri, quo magis antea valetudinarii aut imbecilles fuerunt, eo cautius cum specificis & vomitoris sunt tractandi, robustioribus veto minus nocent.

13.

Febres intempestive suppressæ & alia thalæ, cum primis ab dominis duritiem, adstrictiones alvi, & dolores circa hypochondria, excitantes, blande laxantibus, præsertim pilulis tartareis, balsamicis, aut polychrestis, aut vivi medicatis laxantibus, optime revocantur; quæ deinde præparato ac purgato rite corpore, methodo præscripta, denuo curantur.

14.

Oedemata, post intermittentes, ut sæpe vel ob potum nimium sit, vel ob sudorem impeditum, relicta, frictionibus, motu corporis, exercitationibus, salibus digestivis, atque essentis, itemque infusis amaris, cum vino aut cerevisia potatis, præsertim ex carduo bened. sommit. absinth. bact. juniper. cort. aurant. & cascatill, immo & ipsius chinæ curantur, interpositis subinde remediis martialibus, lenibusque laxantibus, atque observata simul tenui ac parca diætâ, & vitato potu nimio.

15.

Absorbentia terrea antifebrilia, & antimonialia in febribus his nimis copiose exhibita ventriculum facile vehementer lædunt, adeoque nimius eorum usus vitandus.

16.

In quartanis præsertim senum, aut imbecillium vehementiora

B 3



riora remedia, ut vomitoria, purgantia drastica, volatilia fortiora, itemque V. S. (nisi forte fluxus sanguinis suppressus eam exigit,) ut plurimum nocent: in junioribus contra & robustioribus haud raro rationes adfunt, quæ vomitoria & V. S. ut supra docuimus, requirunt.

17.

In febribus intermittentibus sænum, soporosis dictis, ubi ægro altero vel tertio paroxysmo in soporem gravem, & tertio vel quarto paroxysmo in apoplexiam lethalem incidere solent, ut præstantissimi practici observarunt, mox post paroxysmum, quo sopor ille accessit, cortex peruvianus sæpe & larga dosi est adhibendus, ut sequens paroxysmus avertatur; alias ægri plerumque in sequenti paroxysmo apoplectici moriuntur. Confer hanc ob causam utilissima scripta Celeb. Itali TORTI & WERLHOFFII nostri de febribus.

18.

In febribus inveteratis aliquandiu salia, vina medicata amara, & pilulæ amaræ balsamicæ, interjectis purgantibus, sunt usurpanda, antequam specifica sive sistencia exhibeantur.

19.

Quoties ex quartana hydrops oritur, nullo remedio melius interque curatur morbus, quam cortice peruviano, tam in substantia, quam infuso, recte exhibito. Conf. Filii Dissertatio de quartana & hydropse, per corticem peruvianum curatis, A. 1740. Helmstadii edita.

C A P U T III.

De Febribus continuis & i. acutis.

I.

Febris continua quid, et usque diutius.

Febbris continua dicitur intemperies calida, aut morbus, in qua pulsus celer & calor præternaturalis, (cum variis aliis symptomatibus) usque ad finem morbi, cum periculo perdurat. Dividuntur ejusmodi febres primo in *acutas*, & *lentas* sive chronicas. Acutæ vocantur, quæ brevi tempore vel ad mortem, vel ad salutem decurrunt, & sunt vel *acutæ simplices*, sicuti febris ephemera, synochus, febris catarrhalis, &c. vel *peracutæ*, ut causus, febris petechialis, purpurata; vel *acutissime*, ut sudor Anglicus, febris pestilens, & pestilentia sive pestis ipsa. Dividuntur præterea acutæ in *benignas*, & *malignas*, pro minori vel majori virium prostratione, symptomatumque minori, vel majori vehementia: & in quibus simul *macula vel papula sive pustula* incute, quas Græci *exanthemata* vocant, proveniunt, ut in variolis, morbillis, febre petechiali, scarlatina, miliarum,

fi,

ri, seu purpura, urticata, peste, &c. *exanthematica* appellantur.

I I.

Eodem fere modo ut plurimum incipiunt continuæ, quo intermittentes: nimirum horrore vel frigore, quem pulsus celer & calor præternaturalis modo lenior modo vehementior subsequantur; verum distinguuntur ab intermittentibus *continuatio- ne diuturniori* horum ultimorum, calor enim & pulsus p. n. in his ante febris finem non plane intermittunt, licet in nonnullis quandoque parum remittant: quam ob causam etiam a quibusdam in *continuas continentes*, sive synochos, & in *continuas remittentes*, easque vel quotidianas vel tertianas dividuntur: ad quas potissimum febres ita dictæ *catarrhales* pertinent, quas coryza, tussis vel rauco comitantur, quæ vesperi ut plurimum ægros nova quadam accessione vehementius affligunt, & matutino tempore a vehementia sua aliquo modo remittunt. Nonnulli plures constituunt differentias; sed hæc sufficere possunt: atque hoc solum adhuc notamus, quod vocabulum *continue febris* etiam sæpissime latiori & naturali sensu quoque pro *continente* usurpetur, atque non semper a continente distinguatur.

I I I.

Symptomata, præter jam dicta in his febribus usitata, sunt *cibi fastidium*, sive *appetitus prostratus*, *siuis*, *cephalalgia*, *vigilia*, *virium major minorve prostratio*, *urina saturatius tincta*, *plusque minusve rubicunda*, *siccitas oris*, *faucium & linguae*, harumque *crusta* modo albicans, modo fusca, aut subnigra, quem statum nonnulli barbæ *prunellam* vocant, *deliria*, *anxietates præcordiorum leviores* vel vehementiores, & alia; pro quorum varietate varia recipiunt nomina: ut *ephemera*, *synochus* sive *continens*, *causus*, *angina*, *pleuritis benigna*, *maligna petechialis*, *sudor anglicus*, *morbilli*, *variola*, *purpurata vel miliaris*, *scarlatina*, *urticata*, *catarrhalis*, *biliosa*, *pestilens*, *pestis*, *epidemica*, *dysenterica*, *stomachica*, *intestinalis*, sive *mesenterica*, *castrensis*, *hungarica*, *vulneraria*, *erysipelacea*, *inflammatoria*, *loebialis*, *lactea*, *lenta*, *hectica* sive *phthisica*, *verminosa* &c.

*Differe-
ntia ab in-
termitten-
tibus, a-
liaque di-
visiones.*

*Sympto-
mata.*

*Nomina
februm
varietas.*

*Causa
1. propria
qua.*

Causa *proxima* harum febrium quamvis non sit adeo plana, certa ac perspicua, sed potius valde obscura, mihi tamen esse videtur, ut in intermittentibus, materia quædam p. n. modo acris, modo viscida, peculiaris, partes multas, & cum primis cutem, ad spasmos, sed cor & arterias ad frequentiores contractiones sollicitans, *non acida*, ut olim putarunt, sed *sulphurea* potius aut *alkalica*; id quod calor morbidus, sitis, siccitas oris & cutis, aliaque phænomena evincere videntur: quo ipso deinde sanguis celerius, quam par est, per

vasa propellitur, unde dolor capitis, vigiliæ, deliria, aliaque symptomata explicari apte possunt. *Antecedens* vero hic magis in valis sanguiferis, quam primis viis, in vario nimirum sanguinis vitio, vel quantitate, vel qualitate præsertim acri, alcalica, biliosa, sive *sulphurea* peccantis, consistit, quo cor & cetera partes ad motus ejusmodi p. n. concitantur, aliaque symptomata inducuntur; quod vero sanguinis vitium, qualecumque id sit; hoc motu cordis & sanguinis aucto sapissime corrigitur, vel expellitur, morbusque sic rursus tollitur, eumque motum & effectus *Naturam* vulgo (quæ nobis cor potissimum, una cum arteriis, motuque tonico aliarum corporis partium, verbo, mirabilis fabrica corporis mechanica est, Stahlianis autem *Anima rationalis*) præstare dicunt, id quod etiam sano sensu verum est, dum a sapientissimo Conditore apta nata est, sicut in statu naturali, ita & in morbo, noxia atque superflua secernere atque expellere; atque hinc *Natura merito optima morborum, & cum primis febrium medicatrix appellari potest*, quia eas sæpe sola sanat, cujus etiam ductum, si rite agit, sequi debemus. Contra sæpius occurrunt febres alique morbi, ubi *Natura parum præstare valet*; ars vero multum; ubi *Medicus fit magister & dominus Naturæ*, in quibusdam vero *NATURA & ARS*, ut præsertim in malignis quibusdam, parum adhuc vel nihil efficere possunt.

V.

Causæ remotæ.

Remotæ vero causæ sunt itidem, uti in intermittentibus, erroris in rebus non naturalibus; cibo præsertim, potu, aere, motu vehementiori, vigiliis nimis, & affectibus animi, commissi, atque in primis etiam, maxime in epidemicis, consilium, si scilicet noxium quoddam in aere, quod sanguinem atque simul spiritus vario modo corrumpere, ejus crasin naturalem destruere, atque partes multas, cum primis vero cor ad motus p. n. excitulare; cerebrum vero in suis functionibus vehementer turbare valet. Pro diversitate vero harum causarum, & inde inducta minori vel majori corruptione sanguinis, itemque pro varia corporum dispositione, febres hæ evadunt vel leviores vel graviores, benignæ vel malignæ, varique earum gradus & diversitates oriuntur: quarum tamen causarum & corruptionum ab iis inductarum natura sive indoles a priori hætenus satis cognosci haud potuit; a posteriori tamen observatur, sanguinem & serum in quibusdam magis *spissum* sive *coagulatum*, in aliis vero, præsertim in malignis, nimis *dissolutum*, & ad *putredinem alcalicam dispositum* esse, immo in malignis atque ipsa pestilentia revera in celerem putredinem abire, unde necessario fluidarum ac tandem etiam solidarum partium fabrica, crasis & usus ita læduntur, ut omnia prædicta symptomata cum læsione reliquarum corporis animæque actionum, & sæpe mors ipsa inde subsequantur.

DIAGNOSIS continuarum generalis ex definitione earum (N.I.) constat: Specialis vero ex specialibus circumstantiis & symptomatibus defumitur. *Benigne* enim ex virium qualicumque aliarum actionum constantia; *maligne* vero ex earum subitanea & insigni prostratione, ac pulsu debili, quibus plerumque mentis quædam turbatio sive alienatio, præcordiorum anxietas, & respiratio anxiosa aut suspiriosa, vigiliæque nimia, ut plurimum juncta sunt; dignoscuntur. *Ephemera* sive *diaria* febris ex duratione 24. circiter horarum cognoscitur; *continua simplex*, *synochus*, sive continens dicta, ex signis febrium generalibus, viribus satis constantibus & symptomatibus plerumque non adeo vehementibus, per plures dies durantibus. *Synochus putrida*, ubi graviora adsunt symptomata, major anxietas præcordiorum, fætor excrementorum vehemens, aliaque. *Causæ*, siue *febris urdens*, ex æstu sive ardore, præsertim circa præcordia, intollerabili, & siti fere inextinguibili. *Angina* ex faucium inflammatione, deglutitione & respiratione difficili, cum febre continua. *Pleuritis* ex dolore lateris punctorio, tussi & dolorifica respiratione, junctis signis febris generalibus, ex inflammatione pleuritæ oriunda. *Pneumonia* ex faciei & oculorum rubore insigni in febre continua, itemque capitis dolore insigni, delirio, quod sæpe *furiosum* est, orta ex inflammatione cerebri. *Petechialis* ex maculis cutis, morbis pulicum fere similibus, & cutis superficiei æqualibus, in toto fere corpore, facie tamen plerumque excepta, in quibus vero stigma sive punctum, ut in pulicum morbis, non apparet, sexto vel septimo die ut plurimum se manifestantibus. *Morbilli* papulas sive maculas rubras habent paulo elevatas, sed sine pustulis; cum febri & tussi plerumque juncta. In *Variolis* vero post tales papulas sive maculas, pustulæ lentis vel minoris pisi magnitudine in iis elevantur; nunc purulenta; nunc aquosa sive serosa materia tepletæ; ptiodes *Variolæ veræ*, posteriores *spuriæ*, siue *aquosæ*, vocantur. Variolæ veræ denique nunc *discretæ* sunt, nunc *confluentes*: hæc peioris moris atque sæpe valde *malignæ*; illæ autem plerumque melioris sunt indolis. *Purpura* vel *febris miliaris* distinguitur ex maculis rubris vel papulis seminis milii aut papaveris magnitudinem ut plurimum non excedentibus; quarum tamen hæc *purpuram albam*, illa *purpuram rubram* constituunt. Quædam harum papularum haud raro liquidum perlucidum continent, & hinc morbus hic a nonnullis *purpura crystallina* appellatur.

Urticata vero febris dicitur, quando elevationes sive papulas puncturis urticarum similes cutem exasperant. Febris *scarlatina* cognoscitur, quando in febre acuta maculæ amplæ, rubræ, ad colorem scarlatinum accedentes, in cute hinc inde prorumpunt, æque mox primis diebus, immo quandoque ante-

Diagnos
omnium
continua-
rum.

ante-

antequam febris percipiatur quæ supra cutem non elevantur, & quidem etiam in facie, ubi petechiales vix umquam prodeunt. *Febris catarrhalis* cognoscitur ex eo, quando ita dicti catarrhi, ut Coryza, raucedo, tussis, itemque capitis gravitas, juncta sunt; calor non solet esse adeo vehemens, nec sitis, attamen calor circa vesperam ut plurimum una cum ceteris symptomatibus incrementum solet, atque urina plerumque mox est turbida; sed sine sedimento. *Febris biliosa* vero ex prægressa ira, subsequente sapore bilioso in ore, æstu magno, vomitu bilioso, vel saltem conatu vomendi, cum præcordiorum anxietate, donec biliosa materia vel sponte vel dato vomitorio rejecta sit.

Febres pestilentes appellantur, quando febricula correpti subita virium prostratione affliguntur; nam est species febris malignæ, cum variis aliis febrium malignarum supra indicatis symptomatibus, eisque adhuc gravioribus magisque insolitis, multique ægrorum, quemadmodum in ipsa peste, intra breve tempus, duos scilicet, tres, quatuorve dies, immo subinde adhuc citius inde moriuntur, atque ut plurimum sunt *epidemicæ*: sique belli tempore in castris oriuntur, *febres castrenses* appellati solent, atque speciatim in Hungaria, *Febris Hungarica*, de qua mox plura. *Pestis* vero sive *Pestilentia* ipsa innatescit, quando una cum ejusmodi symptomatibus tumores hinc inde in corpore, qui *bubones* aut *carbunculi* dicuntur, erumpunt. *Epidemica febris* est, quando plures simul eodem tempore, eodem in loco vel regione, ex eadem fere Febre decumbunt; quæ quandoque benignæ, quandoque tamen malignæ sunt. *Sudor Anglicanus* fuit febris olim admodum maligna in Anglia orta & observata, in qua ægri mox vehementi sudore, & virium prostratione corripiebantur, & multi intra unum alterumve diem, ut in peste, ea interficiebantur. *Dysenterica febris* est, si cum calore & pulsu p. n. vehementia tormina & æstus in abdomine, cum frequentibus & dolorificis dejectionibus, eisque vel cruentis, vel mucosis, aut purulentis adsunt.

Febris stomachica vel *intestinalis* mihi est, quam fluxus alvi, & rejectio materiæ feculentæ ut plurimum valde foetidæ comitatur, quam quidam *mesentericam* appellant.

Hungarica, quando ægri, præsertim in Hungaria, vel saltem tempore belli Hungarici, febre peculiari maligna, cum subitaneo virium lapsu, vehementissimo capitis dolore, linguz & faucium inflammatione, ardore, migritudine, atque ariditate afficiuntur, quam nonnulli barbaro vocabulo *pru-nellam* appellant, unde quamplurimi intra paucos dies pereunt. *Vulneraria*, quando calor & pulsus p. n. vulneri, abscessui, vel operationi chirurgicæ graviori superveniunt. *Erysipelacea*,

lacea, ubi febris erysipelas, inflammatoria, ubi ei inflammatio notabilis alicujus partis, sive externæ, sive internæ, conjuncta est; vel ubi inflammationi, præsertim majori, febris supervenit.

Febris lenta sive *hectica*, quando cum notabili corporis tæpe calor longè p. n. attamen continuus, cum pulsu celeriori ægrum perpetuo ac diu affligunt. *Phtisica*, ubi in viscere quædam, præsertim pulmonibus aut renibus ulcus est, una cum signis febris lentæ modo indicatis. *Lochialis* vocatur, quæ lochiis obstructis supervenit. *Febris lactea*, quæ lactis difficilem proventum in novis puerperis comitatur: atque ex his febrium continuarum diagnofin satis patere existimo.

VII.

Ratione prægnoscos continuarum generatim probe notandum est antiquum atque verissimum Hippocratis monitum, (a) *Prognosis.* in acutis scilicet nullas certas esse prædictiones, neque sanitatis, neque mortis: quia adhuc hodie sæpius observatur, eos, qui nobis leviter ægrotare videntur, sæpe inopinato mori, graviter vero decumbentes, præter omnem spem haud raro reconvalescere. Interea tamen eæ, quas gravia comitantur symptomata, periculosiores ut plurimum sunt reliquis; speciatim vero illæ omnium periculosissimæ esse solent, ubi subitanea eaque magna virium adest prostratio, ubi pulsus valde debilis, respiratio anxiosa, præcordiorum magna anxietas, urina tenuis, ignea, sine sedimento, vigilie perpetuæ, inquietudo & jactatio corporis continua, floccorum collectio, tremores artuum & lingue, subsultus tendinum in manibus & circa carpos, quando pullum explorare volumus, mentis alienatio, pudoris neglectus & corporis denudatio insolitæ ad sunt: Pulsus denique myurus, sæcum & urina involuntaria & inscia excretio, oculique caligantes, cum perpetuis deliriis, mortem indicant. Ita & si urina in his morbis prius tincta simul & semel prorsus aquea fit, & quidem subito, deliria brevi instare sæpe certissime significat, ac deinde plerumque mortem. Opiandum esset, ut æque valentia ac certa hic quoque haberemus remedia, quam in intermittentibus; attamen hucusque ea adhuc desideramus. Interea tamen sciendum, plerosque, si rite tractantur, præsertim benignis aut saltem non adeo malignis laborantes, hodie a peritis & prudentibus Medicis resistui, atque longe plures evadere quam mori; licet quam plurimi adhuc optimis etiam Medicis, varias ob causas, sæpissime tamen ipsorum ægrotorum aut adstantium culpa, moriantur.

VIII.

Exitus vero harum febrium salutaris, quando per notabilem Crisi plerumque terminatur. quandam evacuationem, ut hæmorrhagiam largam narium, sudorem

dorem fortem, urinam turbidam copiosam, cum sedimento largo, spūm multum, vel quandoque etiam alvi fluxum, &c. contingit, *Crisis* vocatur; quas evacuationes, si *sufficienti copia procedunt*, brevi euphoria & levitas sequuntur; sin contra, vel nulla, vel non satis larga aut sufficiens contingit, mortem vel saltem morbum diuturniorem aut mutationem in alium indicant. Et licet, ut modo dictum est, aliz evacuationes criticae accidant præter sudorem, quibus ægri servati solent, tamen quia plerique a febre sine sudore, non curantur, ut hic apta ratione, dum natura sæpissime hunc modum ostendit, producat, scribendum, fugiendumque ut plurimum omne, quod eum impedire potest: quia quando impeditur, sæpissime inde mors, interdum febres lentæ, aut innumerabilia alia mala gravia sequuntur. Scire vero juvat *sudorem plerumque non in principio, sed in statu, vel potius jam aliqua facta morbi declinatione*, remittente nimirum aliquo modo caloris & pulsus vehementioris impetu provenire, atque ut plurimum *nubecula in urina*, quam tunc coctam appellant, *indicari*; ideoque ægri in principio sive ante hoc tempus, ut olim pessimo sæpe consilio fecerunt, *ad sudorem non sunt cogendi*; multo minus valde calefacientibus bezoardicis, aut alexipharmacis dictis remediis, ut quondam curant, tractandi, *sed blandis ac lenibus diaphoreticis*, præsertim fixioribus, tincturis ac mixturis temperantibus acidulis & potioriculis diluentibus, ac æstum temperantibus, sic certius reconvalescent. Quia tamen etiam *certa febres acutæ* materiam noxiam per alvi fluxum cum euphoria ægrorum expellunt, quæ in primis viis potissimum hæere videtur, cavendum in his a sudoriferis, & sequamur ductum naturæ, quæ de re uberius in Cap. V. dicemus.

I X.

*Cautio
februm
leviorum.*

In curatione igitur plerarumque acutarum Medicos ab initio & incremento usque ad statum morbi materiam noxiam, tamquam causam febrilem, corrigere, præparare, & ad ejectionem disponere, aut in statu & declinatione eam per convenientia loca, quæ decursus morbi plerumque indicare solet, eliminare debet. Ubi vero præ omnibus, melioris methodi causa, notamus, *febres continuas ac continentes leviores, benignas, ut ephemeras, synochum simplicem, febres catarrhales benignas, urticales, scarlatinas, vulnerarias, lacteas, variolas, & morbillos benignos* frequentissime salutariter decurrere, causamque morbificam a natura sive motu cordis atque arteriarum frequentiori subigi, hoc est, corrigi, emendari, atque tandem quoque expelli, idque etiam sæpe sine medicamentis, præsertim si æger 1. *abstineat a cibis* valde nutritiis, maxime carnibus, & utatur solum jusculis tenuibus; vel omnino abstineat a cibis, præsertim si ab eis abhorret; 2. *potu utatur* sufficiente, frequenti, diluente, aquoso, imprimis tepido, vel saltem temperato; 3. *quiete*, &

4. *sit*

4. frigoris evitacione; his enim utcumque observatis, multi ab his morbis omnino & perfecte, sola sic dicta natura liberantur. Sed hæc si negliguntur, atque circa has res errores committuntur, aut incongrua remedia adhibentur, felix exitus sæpe invertitur, morbiq; graviotes, vel ipsa mors inducitur.

X.

Ubi, utro febris gravioribus stipata est symptomatibus, calori vehementiori temperando, & viscidæ vel acris materiæ præparationi magis studendum: in quem finem danda sunt Di-luentsia, ut potus sufficiens, aquosus, temperans, ex gr. aqua simplex, pura, vel pane injecto alterata, vel decocta ex pane triticeo, aut hordeo, vel avena, vel decoctum hordei aut C.C. succo vel syrupo citri, vel spiritu vitrioli aut sulphuris, vel & spiritu nitri dulci sapore grate acido imprægnatum, & saccharo vel syrupo quodam suave redditum; vel decoctum pomorum fragrantium, aut cerasorum acidorum siccorum, aut tamarindorum, addito pauxillo sacchari q. s. ad gratiam, vel & serum lactis, &c. quibus subinde infusum Thee tepidum, vel veronicæ aut scabiosæ, præsertim mane & circa vesperam interponi potest. Paulo potentius vero tenacitatem sive spissitudinem humorum, in peioribus ac malignis febribus subinde resolvunt, infusa vel decocta sic dictarum plantarum alexipharmacarum & quidem temperatiorum: ut sunt herb. scordii, alliaræ, salviz, millefolii, rad. scorzonæræ, caryophyllatæ, pimpinellæ albæ & similium, itemque horum essentie debiliores mane solum exhibitæ, quæ vero in ægris frigidioribus tantum sunt adhibenda & in calidioribus prorsus omittenda.

*Curatio
graviorum
exi-
gis præ-
paratio-
nem, quæ
fit 1. potu
apto.*

XI.

Pulveres temperantes ac diaphoretici, quales egregii parantur ex lap. canctorum aut conchis, succo citri vel aceto destillato saturatis, atque salibus mediis æstum blande temperantibus: ut sunt nitrum depuratum, nitrum regeneratum, sal altimoniatum, Tartarus vitriolatus, arcan. dupl. &c. vel pulveres temperantes compositi, in pharmacopoliis hic inde prostantes, ex aquis temperantibus, borragin. bogloss. ceras. nigtor. card. benedict. acetosæ, fumar. &c. ter quaterve die ad ℥j. vel 3ss. exhibitæ, ex quibus etiam idoneæ portiunculæ sive mixturæ fieri possunt, quæ vero quoque, præsertim si ægri pulveres averlantur, sine pulveribus dantur.

*2. Pulve-
ribus &
potu
tempe-
rantibus.*

XII.

Blanda acida ad acrimoniam alcalicam, biliosam, aut sulphuream, & æstum temperandum, putredinemque alcalicam præcavendam, & quæ jam adest, destruendam: qualia, præter dicta salia media & nitrosa, sunt succus citri, tanquam acidum corpori nostro amicissimum; syrtus citri, ribesiorum, ber-

*3. Blandis
acidis &
4. emulsi-
onibus.*

berum;

berum, cerator. acidor. rubi idæi, mororum, & Tincturæ rosarum, fl. papav. bellid. vel aquilegiæ, &c. Acida autem fortiora sunt spiritus vitrioli, sulphuris, nitri, clyffus antimonii, spiritus nitri aut vitrioli dulcis, vel R. ex prædictis, cum quarta parte spiritus nitri dulcis, tanquam remedio perquam grato, &c. quæ decoctis hordei aut CC. si modo tussis abest, ad gratum acorem instillantur, vel etiam per se aliquoties in die exhibentur; itemque *Jalapia* grata ex aquis, syrupis, tincturis & spiritibus modo laudatis, refrigerantibus blandeque refocillantibus, quæ ultima remedia pueris, plerumque, aliisque qui a pulveribus abhorrent, gratiores esse solent (a). *Emulsionēs* tenues, ex amygdalis dulc. rec. pistaceis, pineis, sem. cad. Mariæ, aquilegiæ, vel semin. 4. frigid. major. non rancidis, addito panco saccharo ad gratam dulcedinem, pro acrimonia alcalica demulcenda & sanguine temperando.

XIII.

*3. Essentia
sive
sinfur.
diaphor.*

Materia hæc febrilis corrigitur & expellitur quoque medicamentis diaphoreticis sive alexipharmacis, quæ *guttatim* assumuntur, qualia sunt, Mixture simplex, Essentia scordii, helenii, angelicæ, contrayervæ, pimpinellæ, alexipharmaca, Tinctura bezoardica & sin' lia, mane potissimum cum infuso aquoso ad guttas xxx. vel xxx. exhibita; ex quibus vero priora sunt temperatiora, posteriora calidiora, adeoque temperatiora magis ægris calidioribus, posteriora vero frigidioribus sunt danda, atque magis in declinatione, quam in principio morbi, ubi calidiora remedia, præsertim in calidioribus, quam maxime sunt vitanda, reliquo autem diei tempore iis temperantibus remediis est pergendum, quæ §. X. XI. & XII. commendata sunt. Hæc diaphoretica sive *alexipharmaca temperatiora*; illa vero, quæ ex vegetabilibus calidioribus parantur, & quidem cum spiritu vini, alexipharmaca sive *bezoardica calidiora* appellantur.

XIV.

*De Venæ
sectionis
usu in eis.*

Quod ad venæ sectionem attinet, ea locum habet in principio & incremento, quando æger est *plethoricus* & robustus, ubi *magnus æstus*, atque *pulsus fortis* aut vehemens adsunt; quibus in casibus sanguis ad 3vj. viij. & plures, pro ægrotum & symptomatum varietate, evena educi potest ac debet; imò quæ etiam subinde reperenda, si modo dicta symptomata brevi non remiserint. Ubi vero ejusmodi rationes sive indicantia non adsunt, vel ægri valde debiles, vel calor lenis aut valde moderatus, ac pulsus languidus, V. S. omittenda est, præsertim si malignitas adest, & constitutio epidemica repugnat.

XV.

[a] Obs. in cholericis & melancholicis calor melius *nigro*; in sanguineis melius *acidis* temperatur.

XV.

Vomitoria non nisi in febribus illis continuis indicantur, *ubi causa haeret in ventriculo*, ut ubi vel nimia repletia, vel ira praecessit, (praesertim in biliosis) & nausea, amarities oris, vel sapor nidorosus, vel inanis vomendi conatus, vel dolores circa hypochondria, cum praecordiorum anxietate, agrum affligunt; ubi vero lenia sint, & praecipue hic *hypocacoanna* est laudanda tanquam divinum praeter ceteris remedium: quia alia, & praesertim antimonialia, facile hyperemesin aut hypercatharsin inducunt, aut vires nimis prosterunt, aliave mala concitant, quod *hypocacoanna* non facit, sed potius vim simul aliquam alexipharmacam, praesertim in malignis atque exanthematicis exercere solet. Sed ubi danda, mox, si fieri potest in principio exhibenda; quandoque tamen etiam adhuc in progressu locum habent, imo necessaria sunt, praesertim si in principio neglecta fuerunt, symptomata vero praedicta continent; hoc igitur in statu, si aegros ab iis malis, imo ab ipso mortis periculo, liberare volumus, quocunque adhuc morbi tempore cum fructu dari possunt, recorderque me ea aliquoties die demum succedo; duodecimo, imo decimo quarto morbi cum operato successu adhuc dedisse, aegrosque brevi postea convaluisse. Quando vero nulla ejusmodi indicantia adsunt, non promiscue, ut nonnulli suadent, exhibenda; quia tunc non nisi debilitant ac turbant, causamque, quae tunc non haeret in ventriculo, haud tangunt, multo minus tollunt.

XVI.

Purgantia vero fortiora, in his morbis nunquam conducunt, quia debilitant, humores tennes expellunt, morbi cursum naturalem invertunt, naturam in subigenda & expellenda causa morbi e sanguine turbant, facileque fluxus alvi periculosos excitant. Attamen lenia saepe usum habent. 1. in febrium illarum principio, *ubi indicia adsunt* Saburrae noxiae in primis viis haerentis, ut molestiae sive dolores circa hypochondria, murmura ventris, vel ipsa diarrhoea, &c. deinde 2. & cum primis in febribus catarrhalibus, aliisque epidemicis stomachicis aut intestinalibus, ubi ea conducere observatum est; 3. in prima variolarum invasione; libertatis enim sic prius primis viis a materia vitiosa, reliqua deinceps tanto facilius corrigitur: imo in catarrhalibus solo ferre purgante totum morbum saepius debellavi, & quidem portione, quae ex tamarindis, foliis senae, vel rhabarbato & manna conficitur, vel ex sale amaro catarchico, vel pilulis balsamicis Becharianis. In principio autem variolarum commodè quoque datur mercurius dulcis cum rhabarbato, vel jalappa, aut decoct. tamarindorum. In progressu vero aut statu febrium, praesertim exanthematicis.

De Purgantium usu.

maticarum, & cum primis *variolarum*, alvus purgantibus non est irritanda, sed si obstructio alvi molesta, clysteribus tantum blandis emollientibus referenda; nisi epidemica forte constitutio id suadeat.

XVII.

Diaphoresis quomodo procuranda.

Cæterum in tali febre, siue venæ sectione aut vomitorio, aut purgante opus, siue eis opus non fuerit, quando per remedia prædicta (N. X. XI. & XII.) morbus ad statum pervenit, vel calor aliquomodo temperantibus illis jam imminutus est, & in urina coctionis signa apparent, cutisque humida percipitur, atque inde constat, materiam morbi coctam, subactam & ad excretionem præparatam esse, tunc *medicamentis diaphoreticis siue excretionem promoventibus* huic indicationi uberius satisfaciendum est. Hoc præstant. 1. pulveres diaphoretici, ut Lap. Cancr. citrati cum antimonio diaphoretico aut bezoard. minerali & pauxillo nitri, ex aquis diaphoreticis, ut aqua fumar. card. benedi scorzonæ, flor. sambuci, scordii, cinnamomi, cord. frigid. galegæ, ulmariz, ceras. nigror. acetositis citri, vel totius citri, &c. &c. exhibiti, quibus in casibus gravioribus, ubi *anxietates* præsertim adsunt magnæ, vel *deliria*, aut inflammationes, in quavis dosi pulveris camphoræ grana ij. iij. ad iv. magno cum fructu addi possunt, itemque pro ditioribus, lap. bezoardicus; quibus 2. subinde parca dosis præsertim si ægri non facile sudant, aut frigidioris sunt constitutionis, & cum primis matutino tempore, interponi possunt *Essentia diaphoretica aut alexipharmaca*, aut *Tinctura blanda bezoardica varia*: ut vel sola Essent. Scordii, vel Angelicæ ad gutt. xxx. vel cum pauca copia Ess. pimpinellæ alb. vel helenii, vel contrayervæ mixta: vel & harum loco mixtura simplex; aut R. bez. Wendellii, vel & ess. alexipharmaca Stahlii, eadem vel adhuc minori dosi. *Parcissime tamen his ultimis, utpote calidioribus, utendum, ubi magnus calor adhuc in ægro percipitur, vel quando ægri natura sunt calidioris temperamenti, resque tunc præcipue pulveribus & aquis illis diaphoreticis & ad summum essentia scordii, vel mixtura simplici, interpositis moderate acidis peragatur.*

XVIII.

Quid in diuturnioribus faciendum.

Quia vero nonnullæ febres diuturniores, aut minus acute sunt, & per xiv. ac plures sæpe dies sese extendunt, methodo hac generali temperante ac diaphoretica modo descripta, mutatis pro symptomatum ac circumstantiarum rerum varietate remediis ac formulis, usque ad finem continuandum, nisi forte diarrhœa præsens, dolores circa hypochondria, excrementa valde fœtida, laxantia suadent. Quod si vero in lemasi & bestias degenerent, eorum curatio infra peculiari capite tradetur.

XIX.

X I X.

Ratione Dietæ æger loco servetur temperato, vitetur calor *Dietæ*, *cubiculi* & *stragulorum nimius*, attamen & frigus; præstat tamen, ut cubiculum aliquo modo magis ad frigus, quam æstus nimium inclinet. *Potus* congruus, diluens, aquosus, subacidus, gratus, ac pro siti moderanda sufficiens, modo non sit nimis frigidus, concedatur; hoc enim æger multum reficitur ac roboratur, æstus minuitur, humores viscidii diluuntur, temperantur, quies, somnus & sudores promoventur, imo & in *statu morbi*, & adhuc magis in *declinatione*, quando *vires factæ* sunt, etiam haustulus *vini rhenani, mosellani*, vel rubri cujuscumque temperati, vel solus vel cum aqua mixtus, ægro non interdicatur, maxime si vinum appetat, vel saltem illud non adversetur, eive alias assuetus sit. Pro *cibo*, juscula tenuia ex vegetabilibus parata, præsertim farinatea, avenacea & hordeacea, succo citri, vel paucio aceto subacida facta, aut ex pomis parata, &c. item pruna, cerasa & poma cocta, parcissime usurpata, optime conveniunt. *Carnes* vero quæcumque & quæ ex his parantur, maxime hic sunt vitanda, natura hoc dicitante, quæ ab iis plerumque his in febribus abhorret. Nullus etiam *cibus qualiscunque sit, ægro nauseanti, obtrudatur*, quia ut HIPPOCRATES recte docet, *quo plus hor ægros nutriveris, eo plus nocebis*; multum enim omnibus in febribus præstat *abstinentia*, aut saltem si quid appetant, aut aliquid ipsis porrigatur, semper sit parcissimus ac tenuissimus, & quidem, ut jam dictum est, ex vegetabilibus paratur. Atque hæc curandi ratio mihi hætenus optima in his febribus perspecta est: conferantur tamen adhuc diligenter sequentia.

Monita Medica & Symptomatum Curatio.

1. Ut nimius calor, ita nimia refrigeratio, sive externa ea sit, sive interna, per potum scilicet nimis frigidum, in continuis, & præsertim in sudore, summe noxia est, adeoque & *lecti & indusorum mutatio*, maxime in exanthematicis.

2. In omnibus acutis, & speciatim quoque in malignis, atque exanthematicis, ut variolis, morbillis, purpura, &c. regimen blandum diaphoreticum sive diaphoreticum, sed non coactum, atque legitima victus ratio, una cum quiete, præcipuum curationis negotium absolvunt.

3. Evacuationes alvi in his febribus in incremento vel statu, nisi natura viam demonstrat, aut epidemica constitutio id doceat, ut plurimum sunt periculosæ, ipsaque clysmata acriora tunc quandoque non satis tuto applicantur; primo autem initio, præsertim, ubi repletio vel ira præcessit, le-

C

nia

nia ex rhabarbaro vel ex decocto tamarindorum aut foliorum sennæ cum manna, non nocent.

4. Sed si alvi obstructio in incremento aut statu molestias creat, vel lotionem emollientem vel decocto tamarindorum, addito sirup. acetositat. citri vel rubi idæi q. s. ad gratiam loco potus usurpato, solvi potest, idque adhuc magis in declinatione, ubi etiam sæpelene evacuant, ut potiuncula ex foliis sennæ, vel rhabarbaro, vel ex tamarindis & manna, aut etiam sale amaro catarchico dari tuto potest.

5. Speciatim tamen in malignis, petechialibus & castrensis, præmissio leni ex hypecacoanna emetico, causa maligna corrigenda est a idoneis acidis, ut potu ex decocto hordei vel radic. scorzonæræ, aut CC. citrato, cum syrupo ribesiorum, vel rubi idæi suaviter temperato: vel potu ex aquæ part. iij. & vini part. j. pomis citri & saccharo grato reddito, vel & cerevisia tenui, cui aliquot guttæ clyssi antimonii vel spiritus sulphuris ad gratum usque saporem acidum, instillandæ. Ita & 2. infusa ex herb. scoræi aut cardui benedicti, radicis scorzonæræ vel helenii, vel florum calendulæ, ad modum Theæ subinde usurpata, cum vel sine syrupis laudatis acidulis egregie profunt. 3. Rob. sambuci & juniperi, itemque diascordium cum aceto præsertim rutaceo subinde inter prædicta data, specificæ contra malignas profunt. 4. Pulveres ex animonio diaphoretico vel bezoardico minerali, aut conchis citratis, cum nitro antimoniato & camphora, parca sed sæpius repetita, dosi, ex potionibus illis vel aquis diapnoicis dati, acre malignum egregie destruant.

6. In Febris malignis epidemicis, præsertim petechialibus & catarrhalibus, vel ubi alias ægri valde debiles, Venæ sectio ut in peste, noxia plerumque esse solet; adeoque, potissimum, ubi noxia jam deprehensa est in aliis ægris, postea omittatur in sequentibus, nisi ingens forte plethora id suadeat.

7. In febris exanthematicis, ut maculis petechialibus & purpura, itemque variolis & morbillis, si non rite erumpunt, id quod inter alia anxietas circa præcordia indicare solet, valde conducunt emulsiones diaphoreticæ (præmissio ex hypecacoanna emetico) ex seminibus aquilegiæ, cardui Mariæ & napi paratæ, quia hæc semina vim obtinent expellendi, sive, ut dicunt, alexipharmacam; ita Essent. scordii, helenii, pimpinellæ, vel cæscarillæ, subinde ad gutt. xx. vel xxx. ex vehiculo apto, præsertim calido, exhibita, hoc in statu valde conducit, non neglecto potu Theæ aliave calido superingesto. Vulgus nostrum frustulum radicis helenii potui ordinario horum ægrorum haud sine fructu immittit, vel cum Thea commiscet.

8. Ubi metus est exanthemata retrocessura esse, potus calidus cum

cum Essent. scordii, vel helenii, vel pimpinellæ, aliave simili diaphoretica, corpore probe testo optimum est remedium, adhibitis simul, si graviora symptomata adsunt, *cantharidibus* in brachiis & pedibus.

9. Quando vero *exanthemata* jam retrocesserunt, atque tunc mors fere certa est metuenda, Essentia quoque alexipharmaca, ut Essent. scordii, pimpinellæ, aliave similes sæpius, simul cum infuso Theæ, scordii vel millefolii exhibeatur, atque *cantharides* sive *vesicatoria* fortia dorso, brachiis & pedibus applicentur, corpore a frigore probe defenso.

10. In *malignis & peste ipsa*, dato prius laudato, si opus est, emetico, nihil melius *conducit quam quies in lecto*, regimen blandum *diapnoicum* continuum, servando nimirum corpus in perpetuo calore, exhibendoque sæpius potum tepidum, aquosum, infusi Theæ, radic. scorzonæræ, herb. scord. salviæ, millefolii, veronicæ, &c. interponendo subinde prifanas subacidulas. Deinde, præsertim in malo graviore, etiam *subinde danda alexipharmaca temperata*, præsertim tempore matutino, parca sed sæpius repetita dosi, ut mixtura simplex, vel Essentia scordii aut alia quædam alexipharmaca, & *pulveres diaphoretici* ex lapidibus cancrorum vel conchiis, succo citri preparatis, cum pauxillo nitri & camphoræ, qui pulveres vel alternatim cum essentiis sumendi, vel horis solum pomeridianis, sic tamen, ut Essentiæ magis frigidioribus, pulveres magis calidioribus temperamenti, exhibeantur: quibus etiam *potione ex aquis* diapnoicis cum antimonio diaphoretico, vel temperante quodam pulvere paratæ, magno cum fructu subinde interponuntur.

11. Quia in peste, in *Bubonum legitima tractatione*, maxima felicitis curationis pestis pars consistit, hinc opera danda, ut emplastro vel cataplasmate emolliente mature extrahantur, ac maturentur, postea aperiantur, mudentur, & essentia vel balsamo vulnerario consolidentur. Qui plura de his *Carbunculis pestilentialibus* sanandis nosse vult, itemque de *preservatione* ejus, evolvat Instit. nost. chirurgic. Part. I. Lib. IV. cap. IX. seqq.

12. Nocent vero plerumque in *malignis & præsertim in peste*, V. S. vomitoria ex antimonio, purgantia fortiora, omnia medicamenta vehementia, ut nimis calida, aut volatilia, opiata, valde camphorata, ac tegimen quoque nimis calidum, quemadmodum fere omnes scriptores, qui in ultimis pestilentiis vixerunt, testantur. Atque hæc ipsa etiam methodus in *sudore Anglicano* optima quondam observata est.

13. In *febris catarrhalibus*, mane, *premissa* in principio ad materiam vitiosam evacuandam vel potiuncula mannata, vel pilulis lenibus; postea frigidioribus essentia quædam dia-

phoretica, vel liquor CC. succinatus cum leni sudoris regimine, ad materiam noxiam noctu subactam, expellendam, ex infuso herbarum pectoralium calido exhibeatur, & reliquo tempore diei aliquoties pulvis quidem temperans, salinus, resolvers, cum succino & nitro ad materiam vitiosam uberius corrigendam, vel ex simili infuso, vel ex aquis diaphoreticis detur; *calidioribus* vero soli pulveres & aquæ diaphoreticæ exhibendi. Ad *materiam acrem*, quæ *raucedinem* & *suffum* producit emendandam & increasandam *linctus pectorales* conveniunt; pro materia vero *senaci* e pectore evacuanda oxymel squill. ex aquis pectoralibus dandum. In *alvo obstructa* clyfma vel potiuncula laxans mannata adhibeatur. Simulac vero *mador percipitur*, & æstus paululum remittit, aquis & potiunculis diaphoreticis una cum infuso pectorali sedulo continetur.

14. *Bezoardica* sive alexipharmaca calidiora, ut *salia volatilia urinosa*, *spiritus volatiles alcalici*, *spiritus vini rectificatus cum radicibus aliisve calidioribus destillatus*, *Essentie & Tincturae calidioribus parata*, *myrrhata*, *ligna sudorifera*, aliaque medicamenta æstum inducentia, quæ haud adeo pridem a Medicis plerumque hic in febribus acutis adhibebantur, valde noxia sunt, & cum primis calidioribus; ardorem enim augment ac sitim, inflammationemque, anxietates, deliria, summas virium prostrationes, & sæpe mortem producunt.

15. In *Bezoardicis* vero *mere terreis*, qualia fere sunt *terre sigillatæ*, *Cornu Cervi ustum*, pulvis *Pannonicus ruber*, *Mantuanus*, *bezoard. Sennerti*, *Anglicanus*, &c. parum virtutis deprehenditur, nisi forte in *alvi fluxibus nimis*: ubi tamen ipsis cortex *cascaillæ* cum nitro jungendus, si bonus effectus inde sperandus.

16. In *causo & ardore circa ventriculum* externe spiritus Vini camphoratus scrobiculo cordis cum linteis complicatis calide impositus, superimposita *vesica aque vel lacte calido*, præsertim si in eo flores chamæm. costî, repleta, egregie conducit: quia hic inflammatio ventriculi adesse solet, quam potenter resolvit, maxime si camphora etiam interne simul exhibetur.

17. In *febre Hungarica*, præter remedia febribus malignis adversa & modo commendata, conducit sæpe *initio vomitorium*, idque potissimum ex *hypercacoanna*, quia sæpissime ex prava Militum dieta ortum ducit: id quod subinde, si malignitas post primum non satis remisit, repetendum.

Deinde, quia *fauces in ea* plerumque valde *inflammatae*, *aridæ*, *fulcæ & siccæ* sunt, atque capitis dolor vehemens valde molestus esse solet, quæ mala sæpius a nimio potu vini hungarici vel spiritus vini ortum ducere solent, non solum

Vena

Vena sectio in brachio, aut pede, sed etiam in *venis jugularibus & raninis*, itemque gargarismata ex decocto & succo herbæ sedi majoris, vel endivæ cum nitro depurato, vel antimoniato, aut lapide prunellæ, aut sale ammoniaco, cum syrupo mororum necessaria ac proficua esse solent. Ita & *mucilago seminis cydoniorum* aqua rosarum parata, cum syrupo mororum & nitro, faucibus & linguæ aridæ sæpius illita, egregie opitulatur.

18. *Hæmorrhagie quæcumque in his morbis, & imprimis nævium critice* præmature non sunt sistendæ: facile enim ægri his in morbis sine noxa aut vitæ periculo duas sanguinis libras amittere possunt; cohibita vero, citius quam par est, gravissima mala, ut calorem majorem, dolores capitis vehementes, anxietates circa præcordia, præsertim vero deliria & phrenitidem inducere valent. — Quod si vero sint nimie, tandem sisti debent, & quidem externe aceto, vel solutione aluminis aut vitrioli, in aqua cum turundis in nares immisissis; interne temperantibus, nitrosis. Multi quoque hic *busonem* sub axillis alligatum valde commendant.

19. *Vomitus, cum primis in caufa, aut febribus biliosis*, itemque in variis malignis, quia plerumque salutare aut criticæ hic sunt evacuationes, per adstringentia & opiate, ut ab imperitis sæpe fieri solet, præmature non sunt sistendi; sed potius in vomitu potus largus aquæ tepidæ, vel decocti tenuis hordei vel avenæ, vel herbæ cardui benedicti, addito pauxillo hypocacoannæ, ad materiam acrem probe eluendam & ejiciendam sæpe ingerendus, donec sponte remittant; attamen si nimis diu continuant, tandem theriacæ vel diascordii ꝑj. ex aqua cinamomi, cydoniata semel iterumque data conducit.

20. *Alvi quoque fluxus quicumque, non mox adstringentibus curandus*, sed materia peccans per diluentia potius & blanda evacuantia, imprimis *rhubarbarina* & tamarindinata, deinde & absorbentia ac nitrosa, partim evacuanda, partim corrigenda, ita post aliquod tempus plerumque sponte cessat. Aut si his præmissis, non remittat, ægrique debiliores fiant, *Diascordium Fracastorii*, vel *theriaca*, ad ꝑj. ut modo dictum est ꝑ. 19. vel pulvis *caascarillæ*, a gr. iij. vj. ad xij. cum pulveribus temperantibus vel terreis, ut corallis, CC. usto, terra sigillata, pulv. bez Sennert. vel auglicano, vel pannonico rubro, ex aqua cinamomi cydoniata, vel aqua menthæ sæpius, donec cesset, exhibenda; aut Essent. caascarillæ & Essent. scordii aut diascord. propinanda; hæcque potissimum horis matutinis, illa a meridie & circa vespærum.

CrySTALLUS montana præpar. ac nitro aut caascarillæ, aut utrique simul sociata, in diarrhœis excedentibus quoque

egregia est, maxime si magis, quam antea, ad sudorem se componant ægri, eunque patienter ferant. Ita & *emulsiones* ex amygdalis dulc. & semine papav. alb. paratz, ad ℥j. sæpius exhibitæ; non raro solæ has diarrhœas compescunt.

21. In diarrhœis febrium quarumcumque & præsertim malignarum (a), aut si tempus frigidum, præter jam dicta, opera danda, ne æger e lecto facile surgat ad alvum exonerandam; quia diaphoresis, hic adeo necessaria, impediretur, sed potius vas vel patina apta ægro in lecto decumbenti supponatur; vel si hæc desint, aut alias surgendi necessitas incidat, ut vestibus, stragulis, aliisve rebus a frigore probe defendatur, frigus enim hic valde noxium est, adeoque & potus semper vel calidus sit vel minimum tepidus. Nitrum deinde cum absorbente & pulv. cascarillæ junctum, atque parca, sed repetita sæpe dosi exhibitum; remedium hic, & præsertim etiam in variolarum & morbillorum diarrhœa, alias valde periculosa, est efficacissimum: imprimis si emulsio (N. XX.) laudata, addita ℥j. vel altera gummi arabici, ad acre in intestinis temperandum sæpius interponatur.

22. Si Dysenteria feбри superveniat, eadem curandi ratio est adhibenda, vel & sæpius ægro. Ess. rhabarbari cochleare unum, ad materiam noxiam evacuandam, donec malum remittat, exhibeatur, atque etiam ægro in lecto, si alvum deponit, vas subjiciatur; vel si surgere vult, vas aquam calidam continens supponatur, & stragulis vel vestibus probe contegatur; Clysteres ex lacte & theriaca hic quoque egregie profunt; conf. simul Cap. XIII. N. XIV. & seq. ubi speciatim de Dysenteria agitur.

23. In singultu febrium acutarum prodest spiritus nitri dulcis cum essent. quadam alexipharmaca ad gutt. xx. vel xxx. per intervalla ex infuso Theæ vel aqua diaphoretica datus, donec cesset.

24. Ob vigilias aut capitis dolores ægris non facile opiata, præsertim fortiora, exhibenda; quia obstructions inferendo morbum plerumque reddunt graviolem, atque deliria, soporem, aliaque prava symptomata facile inferunt: febre enim, laudatis remediis mitigata, aut superata, symptomata hæc sponte cessant. E contrario potus sufficiens, aquosus, acidulus, medicamenta nitrosa, cinnabarina, & emulsiones tenues præsertim papaveratz, hic multum valent. Externe in principio dolorum capitis, spiritus vini camphoratus fronti & temporibus, vel per se, vel philonio Romano roboratus & cum splenia calide applicatus, prodest; in progressu autem acetum

(a) Quas sæpe salutare esse, præter alios cel Hoffmannus egregie probavit, in Dissert. de diarrhœa in malignis salvari, aliisque scriptis.

tum rosarum vel solum, vel cum nucleis pessicorum aut amygdalis amaris rasis, impositum; vel & *emulso* ex semine papav. & nucleis persicor. cum aqua solani parata, addita portiuncula *camphoræ* egregie conducit, vel & unguentum alabastrinum camphoraque roboratum temporibus illini potest. *Clysmata* etiam emollientia, ubi alvus simul obstructa, hic multum contra dolores capitis & vigilias prodesse possunt: ut & *cataplasma ex fermento panis* cum ruta, sinapi, sale & aceto plantis pedum impositum.

25. In *anxiété* & *cardialgia* *febrium petechialium* aliarumque *malignarum* affinium, præmissa hypocacoanna, thesriacæ ℥j. cum salis absinthii & antimonii diaphor. a gr. xv. ex aceto bis vel ter post intervalla duarum vel trium horarum, si malum citius non remittat, apte exhibetur, subjunctis potiunculis diaphoreticis camphoratis.

26. In *capitis doloribus* & *deliriis harum febrium* præter modo dicta, etiam *sanguisugæ*, temporibus & post aures adhibendæ, itemque *vesicatoria* pone aures, brachii, cervici, & suris pedum, item *sinapismi* brachiis & plantis pedum; revellendi atque avertendi sine, imponendi; interne vero *nitrum* & *camphora*, vel in pulvere cum aliis temperantibus, vel in emulsione sæpius, quovis scilicet bihorio aut trihorio, danda.

27. *Contra tussim* sæpe molestam cumprimis *catarrhalium febrium infusa aquosa* ex speciebus pectoralibus parata, calida subinde sorbilla, itemque *emulsiones* ex amygdalis, sem. card. bened. card. Mariæ, papav. alb. & aquis pectoralibus, ut scabiotæ, hyssopi, tussilag. card. bened. confectæ, præsertim versus noctem sæpius datæ, egregie conducunt; ita & *linctus pectorales* ex oleo amygdalarum dulcium, syrup. violar. vel papav. err. & sperm. ceti, addito pauxillo laudanoliquidi, usum hic habent non spernendum, si circa tempus, quo tussis maxime affligit, assumuntur. *Acida vero mineralia*, quæ ob vehementiam tussim facile augment, tunc sunt vitanda.

28. Quando *saucium inflammationes* percipiuntur, ita ut *agri de deglutendi difficultate* conquerantur, mox *gargarismata* leniter adstringentia & resolventia, ex rad. tormentillæ, bistortæ flor. & fungis subm. flor. ros. papav. rhead. aqua japon. nitro & paucò alumine, vel etiam sale ammoniaco, addito syropo motorum vel nucum, sunt adhibenda. Externe emplastra discutientia, ut Empl. de meliloto camphoratum, vel sacculi ex herb. aut florib. resolventibus applicandi, itemque si alvus obstructa, *clysmata*, vel ipsa *lenia laxantia* ex tamätind. sol. senn. rhabarb. & manna, *revellendi sine*, mature exhibenda, antequam *apertæ*, quæ ple-

rumque in his calibus periculossimæ sunt, superveniant, & quando *faucium tumores, ingruente febre, incidunt*, hæc laxantia optimo cum successu mox in principio dantur.

29. Alias vero, ubi *angine indicia*, ut cum difficili deglutione difficilis quoque *respiratio* incidat, Venæ sectiolar-ga & quidem prius vel in brachio, subjuncto idoneo pur-gante, vel adhuc melius in pede; deinde, si malum non re-mittit, in *vena jugulari*, ac denique sub lingua *in raninis*, si præcedentes non suffecerint, instituenda est, itemque *clysmata* sæpius applicanda, atque vesicantia extus variis parti-bus imponenda.

30. *Aphthæ* in febris malignis, quæ pessimi sunt moris & indicii, abstergendæ Ess. succini & myrrhæ, vel pimpi-nellæ, ope penicilli; vel & liquore myrrhæ per deliquium, interponenda gargarismata ex decocto herb. plantag. aut ve-ronicæ cum melle rosar. & syrupo mororum; vel ex aqua plantaginis phlegmate vitrioli acidulata.

31. In *continuis remittentibus* ante novam accessionem pul-veres salinos antifebriles temperantes, vel adhuc magis, *cór-ticem peruvianum* dare utilissimum.

32. *Sudores nimii* sive *colliquativi* requirunt aerem cubicu-li frigidiusculum, integumenta lecti leviora ac tenuiora, po-tum frigidiusculum, acidulum, ad quem & serum lactis & lac eburatum pertinent, Tinctura rosar. aliæque acidulæ, vel & horum loco spir. nitri aut vitrioli dulcis, ac deni-que terrea, ut terra sigillata, corall. rubr. gemmata & præ-ferim spec. de hyacinth. cum nitro & pauxillo opii, vel & dosi dialcordii.

33. *Vires debiles*, præsertim in *malignis* vel in statu & de-claratione benignarum, potiunculæ analepticæ, cum confect. alkerm. Tinctura coralliorum, emulsiones ex amygdal. dulc. pistaceis, pineis, sem. card. Mariæ, card. bened. aqua borrag. bugloss. rosar. cinnam. flor. aurantior. lilior. convall. totius citri, cordial. frigid. perlat. & camphora roboratæ: item-que *poma citria, aurantia, sinesia*, aliaque similia quocum-que modo exhibitæ; immo & ipsum *vinum* bonæ notæ mo-dice sumptum, præsertim si ægri illud appetunt, tam me-rum, quam aqua temperatum & pauxillo sacchari edulcora-tum, adjectis vel omissis orbiculis dissecti pomi citrei, egre-gie refocillant. *Externo* carpis manuum & quandoque etiam cordi, aqua Anhaltina, Reginæ Hungariæ, carbunculi, itemque aceta varia, ut rosarum, lavendulæ, rutæ, caryo-phyllaceum, &c. tepide applicantur, quæ & naribus pro odoratu sæpius adhibita roborant.

34. Contra *Convulsiones*, in his febris, quæ symptoma-ta sunt periculossima, prodest spiritus cornu cervi, vel
li.

liquor succinatus, sal CC. volatile, itemque pulvis ex sale card. bened. nitro, cinnabari & camphora: quibus nonnulli etiam vel pauxillum opii addunt, vel theriacam interponunt.

35. In Febribus, quæ gangrenam aut sphacelum comitantur, interne ad hæc mala compescenda, ex novissimis observationibus valentissimus sæpe est cortex peruvianus, eadem ratione, ut in vehementibus febribus intermittentibus, sæpius & larga satis copia exhibitus.

36. Post febres acutas omnes & præsertim exanthematicas ac malignas usus lenium alexipharmacorum, quæ simul stomachica sunt, ut Essent. cort. aurant. gentiani. pimpinellæ, angelicæ, helenii, card. bened. cascarillæ, scordii, adhuc aliquandiu continuandus est: ubi speciatim quoque cortex cascarillæ vel in pulvere, vel in electuario, vel ejus extractum in pilulis egregiam utilitatem præstant. His etiam lenæ laxans sub declinatione, immo etiam in fine, antequam aerem rursus ingrediuntur, cum fructu interponitur, sic appetitus ac vires citius redeunt, ægrique rectius reconvaleſcunt.

37. Si post acutas vires & appetitus redire nolint, purgans dandum, & postea stomachica subjungenda: quia ut plurimum tunc appetitus, ob humores vitiosos in ventriculo hærentes, læsus est.

38. Denique reconvalescentes post quascunque tales febres operam dent, ne facile errores in dieta committant; cumprimis ne carnes, maxime duriore, aut pinguiore, præsertim suillam, aliaque concoctu difficilia nimis citò comedant, aut etiam in levioribus copia excedant. Vident etiam adhuc aliquamdiu aerem frigidum, ventosum ac pluviosum, matutinum & vespertinum. Nisi enim hæc observent, facile in febres novas, easque sæpe peiores, immo sæpissime lethiferas; vel saltem in alios graves morbos relabuntur.

C A P U T IV.

De Febribus exanthematicis & speciatim de Variolis ac Morbillis, quibus purpuræ & petechiales subjunguntur.

I.

Quid Febres exanthematicæ sint, & quidem nominatim *Variolæ & Morbilli*, quænam earum differentiæ ab aliis, supra jam Cap. III. n. VI. dictum, earumque etiam curatio generalis eodem Capite tradita est. Interea tamen earum frequentia, dum pauci homines ab his prorsus liberi ma-

De exanthematicis speciatim agendum.

manent, illarum discrimen ac valde dubius sæpe eventus aliarque causæ me permoverunt, ut de iis adhuc specialius hic exponere consultum duxerim.

I I.

*Quatuor
variola-
rum tem-
pora sunt
notanda.*

Inprimis vero in Variolis melioris curationis causa probe cum Sydenhamo notanda *quatuor eorum tempora, invasionis* scilicet, *eruptionis, suppurationis, & exsiccationis*, ut tanto accuratius, quid in quovis optime sit agendum, observare queamus. Tempus igitur 1. *invasionis* sive *ebullitionis* materię p. n. aut malignę vocatur primum morbi tempus, quando ægri languere aut male se habere incipiunt, ad tempus, quo maculę rubrę in cute & præsertim in facie erumpere incipiunt, quo ægri prægresso plerumque levi horrore, plus minusve calere solent, quo ipso tempore nonnulli etiam *convulsionibus*, atque *epilepsia*, cum primis infantes & pueri, ex improvviso sæpe corripiuntur: hocque ebullitionis tempus trium quatuorve dierum spatio circumscribitur.

I I I.

*Tempus
eruptionis
& suppu-
rationis.*

Tempus vero 2. *eruptionis* vocatur, quando maculę rubrę erumpunt & sensim sensimque in papulas elevantur, quod *ut plurimum a tertio vel quarto die ad septimum usque* durat in veris & discretis. 3. *Tempus suppurationis*, a die scilicet septimo ad diem plerumque undecimum, quo papulę rubrę in pustulas pure repletas transmutantur; & 4. *Tempus exsiccationis*; ab undecimo plerumque ad decimum quartum vel decimum quintum in veris & ordinariis. Sed in *spuriis sive aquo- sis* citius & suppuratio & exsiccatio contingere solent, ubi sæpe die octavo, nono, vel decimo omnino rursus exsiccatae sunt, in anomalis vero sive irregularibus ac malignis eas die xvii. imo vigesimo nondum exsiccatas esse memini, sed *Morbillis* citius, & fere ut variolę nothę, intra novem vel decem dies periodum suam absolvunt, & per squamulās exsiccati decidunt, *tussi tamen plerumque fortiori*, quam in variolis, afficiuntur.

I V.

*Causseae-
rum pro-
xima.*

Causa proxima horum morborum & speciatim variolarum est *materia quedam p. n. sive visiosa in sanguine*, quam natura, inde irritata, in hoc actu separat atque per cutem sub puris forma expellit, videturque jam in utero matris cum sanguine infantibus communicari, quia infantes variolis & morbillis pati leguntur, aut eis sæpius primis post partum diebus vel hebdomadibus corripiuntur, ubi aerem nondum ingressi & nullo adhuc alio victu, quam lacte, uti sunt: & quia pferique homines vel citius vel tardius semel eos sustinere coguntur. Interea tamen exempla etiam eorum prostant, qui bis, imo ter iis correpti fuerunt.

Diagnosis horum morborum ex Cap. III. n. VI. jam patet. *Diagnosis* etiam valde cum aliis febribus acutis convenit (ibid. n. VII. & VIII.). Attamen speciatim hic ad-*prognosis* sist.

hoc notandum, quod, quo citius erumpunt, eo plerumque fiant copiosiores, quo vero copiosiores, eo plerumque, sicut in aliis exanthematicis, periculosiores, atque ut plurimum confluentes, quæ longe majus vitæ periculum portendunt, vel saltem faciem imo & oculos vehementius, quam discretæ, corrumpere solent. Quæ vero circa finem diei tertii, vel quarto demum placide proveniunt, plerumque pauciores, discretæ & mitiores evadunt. Hinc haud probandus est illorum mos, qui variolas aliasve quascunque continuas ac speciatim exanthematicas vehementioribus & calidioribus expellentibus, itemque calore magno hypocausti ac stragulorum præmature expellere satagunt: quia his ipsis sanguis, jam quasi ebulliens, qui temperandus est, magis incalescit & corrumpitur, atque ex levioribus & discretis peiores, confluentes & malignæ conficiuntur. Præterea sciendum epilepsiam, quæ tempore invasionis sæpe pueros aggreditur, quamvis parentes aut amicos sæpe vehementer terreat, plerumque nihil mali denotare, & variolas ut plurimum satis bene ei succedere. Quando autem nimis copiose prodeunt, præsertim in facie, aut confluentes sunt, aut malignæ gravioribus & inusitatioribus malis stipatæ, vel collabuntur aut retrocedunt, vel justo tempore non exsiccantur, periculosæ sunt; & contra, minus periculosæ, si blande & tarde prodeunt, si discretæ & paucæ sunt, atque sine gravibus symptomatibus.

V. I.

In curatione igitur lenissima via per blanda temperantia, diluentia, & diaphoretica, ut in aliis continuis, mihi & plerisque hoc tempore bonis practicis optima deprehensa est. *Curatio per inoculationem.* Antequam vero de hac plura dicamus, pauca monebimus de ea curandi ratione, qua multi variolas periculosas malignas & confluentes, per ita dictam inoculationem benignarum, præcavere studuerunt, & quam minime rejiciendam, sed potius maxime salutarem, generique humano utilissimam esse existimamus.

Nam omnino verisimile videtur, jam ab utero materno variolarum materiam sanguini admixtam esse, quæ semel in omni propemodum homine defervesce debet. Quod ipsum quo citius, sive quo minori ætate hoc fit in infantibus aut pueris, eo securius ab eo veneno ut plurimum liberantur, atque eo melius evadunt. Quo autem diutius hæc pestifera materia hæret in sanguine, eo pejor ac malignior ea fieri videtur, dum observatur, adultos plerumque longe gra-

virus inde affligi quam pueros, & quam plerimos illorum veneni vehementia vinci. Igitur quando variolarum benignarum initio præstat, ut citius atque in ipsa infantia, præparato præsertim corpore, deservescere sanguinis istud venenum queat, dubium sane mihi non est, quin homines quam plurimi, præsertim nobiliores & Principes quam aptissime non solum ab ipso mortis discrimine; verum etiam a variis aliis gravibus malis, quæ malignas sæpe comitantur, hoc ipso curationis genere defendi, atque faciei pulchritudo oculorumque integritas conservari queant, quæ alias quam sæpiissime graviter læduntur, immo visus acies haud raro maximo cum ægrorum damno ac molestia omnino tollitur.

Neque curandum, quod timidiusculi hic opponant, cum experientia frequens in Turcis & Anglia, in Germania vero, Hanoveræ, Onolsbaci, Pyrmonti, aliisque locis ejus utilitatem satis comprobaverit. *Quomodo autem hæc inoculatio sit instituenda in Chirurg. nostræ P. II. Cap. XV. docuimus.*

VII.

Curatio leviorum. Cæterum in curatione vario modo, pro morbi varietate & vario morbi tempore, est procedendum. Nam *si blande*, hoc est, *sine gravibus malis invadunt & erumpunt*, ægrique bene se habent, a medicamentis fere omnibus, vel saltem calidioribus aut vehementioribus expellentibus abstinendum, atque *totum hoc opus nature recte agentis relinquatur*, suadendo solum regimen temperatum, quietum ac diaphoreticum, legitimam victus rationem ex vegetabilibus, cum potu cerevisiæ tenuis, vel alio aquoso, ut decocto avenæ vel hordei, ut in aliis febribus levioribus, & imprimis etiam hic *hydrogale potum* ex part. iij. aquæ & part. j. lactis valde idoneum deprehendi, servando ægros extra lectum, quamdiu ambulare possunt ac volunt. Alii pro potu valde commendant *decoctum milii*, nonnulli etiam *lentium*; quæ etiam non contemnenda.

VIII.

*Quæ diffici-
lius e-
rumpunt.* Quando autem opus eruptionis non legitime succedit, sed ægri *anxietates, inquietudines, & æstus nimium*, aliave mala sentiunt, in *calidioribus* nimius impetus est cohibendus: & quia materia sive venenum variolarum tunc peioris est indolis, ea corrigenda & temperanda per pulveres temperantes, cinnabarinos, vel apud eos, qui pulveres averfantur, sicut infantes & pueri sæpe facere solent, per tincturas refrigerantes, ut R. flor. papav. rh. vel aquilegiæ: quibus quarta vel quinta pars spir. nitri dulc. commodè addi potest, itemque per potiones & emulsiones similes, potum sufficientem idoneum (N. VII.) acidulatum, atque regimen fri-

frigidius. Sed in frigidioribus variolæ eruptionis tempore difficilius erumpunt, vel depressores subsistunt, indeque ægri anxietates perferunt, atque vehementius ægrotant: stimulanda atque juvanda est natura lenibus alexipharmacis, ut radicis *helenii* frustulo cerevisiæ tenui, tanquam potui ordinario subjecto, quod vulgi nostri est remedium, vel grana aliquot *myrrhæ*; prædictis pulveribus additis; vel essentia scordii, *helenii*, vel alexipharmaca, aliquoties in die parca dosi cum potu calido, imprimis Thea pectorali exhibita, itemque aquis diaphoreticis & speciatim fumariz, card. bened. aut flor. sambuci, vel etiam emulsionibus ex feminibus aquilegiæ, cardui Mariæ & napi, paratis. Decoctum ex ficibus & herbis diaphoreticis aut pectoralibus compositum, præsertim ubi forte simul tussis adest, egregium hic est, si aliquoties in die calide bibatur, ubi etiam in paulo graviore malo vesicatoria recte brachiis & pedibus applicantur. Cæterum in mitiori sive medio statu, quando variolæ non nimis facile erumpunt, blanda diaphoretica ex prædictis aquis & terreis citratis sive temperantibus pulveribus, cum syrupo acidulo gratis redditis, sufficere sæpe solent.

I X.

In paulo pejori statu invasionis, ubi calor & ebullitio sanguinis est admodum vehemens, præsertim in juvenibus & adultis sanguineis, principio utilissime sanguis larga copia detrahatur: id quod præcipue in eis est faciendum, qui quotidie laute vivunt, vinumque simul & quidem larga copia bibunt, sicuti aulici, nobiles juniores, & magnates; alias plerumque fiunt confluentes, & ægri inde moriuntur. Ubi vero hæc indicia non adsunt, aut ægri defectu virium laborant, consultius intermittitur.

X.

Sic, si eodem tempore nauseam, anxietas, aliæque vomitum indicantia adsint signa, tunc sicut in aliis febribus (Cap. III. N. XIII.), docuimus, præmissa, si æger est plethoricus, sanguinis detractione, vomitus radice *hypercacoannæ* excitandus, vel si vomitorii usum res quædam vetant, aut indicia Saburræ crudorum humorum in intestinis adsint, hi leni purgante ex *rhabarbari*, vel *jalapæ* & *mercurii* dulcis apta dosi, vel decocto *rhabarbari* in aqua vel sero lactis cum manna, vel *tamarindorum* vel *passulorum* cum manna, vel & Tinct. sive anima *rhabarb.* commode evacuari (a), hisque

Quando
evacuan-
tia dan-
da.

tem-

[a] Multi quidem evacuantia quæcumque hic metuunt & prohibent; ego vero aliquæ præstantes Medici ea utiliaprehendimus.

temperantia, *diluentia* ac *diapnoica* sive lenia expellentia, pro materia vitiosa acri corrigenda & expellenda, subjungi, prudenterque per eruptionis, & suppurationis tempus continuari possunt.

XI.

*Quid in
vehementiori
invasione
faciendum.*

Si invasionis atque eruptionis tempore calor *vehementior*, sive nimia ebullitio in ejusmodi ægris percipitur; præter laudata temperantia, N. VIII. ad hanc moderandam *acida* quoque remedia, Cap. III. N. XII. laudata, in potu ordinario & in potiunculis data egregie profunt; eo autem post eruptionem imminuto, *diapnoicis* & *potu sufficiente*, temperante, eruptionis & suppurationis tempore prudenter continuandum. *Epilepsia invasionis tempore incedens*, nulla alia; quam lenia expellentia, addita pauca cinnabari, tanquam nervino, requirit, eisque plerumque variolis provenientibus cedit.

XII.

*Quid si
retrocedere
videntur.*

Si *variola* eruptionis vel suppurationis tempore *retrocedere* videntur, *vesicatoria* brachiis, pedibus & cervici sunt applicanda, atque interne *alexipharma* sive expellentia paullo fortiora, N. VIII. laudata, corpore probe tecto, ex vehiculo calido sunt exhibenda: id quod etiam, & quidem adhuc majori cura est faciendum, quando jam retrocesserunt, alias certa fere mors brevi subsequitur.

XIII.

*Quomodo
tussi
moderandum.*

Tussis in variolis, & cum primis etiam in *morbillis* vehementer sæpe affligens, temperatur, omissis primo acidis mineralibus, *insusis pectoralibus* ad modum herbæ Theæ, aliquoties in die, usurpatis, itemque emulsionibus, aquis & essentis diaphoreticis, N. VIII. quæ ipsa quoque tussi post variolas haud raro affligenti & phthisin sæpe minanti, optime opponuntur, ubi etiam *lintus pectorales* ex oleo amygdalarum dulcium & syrupis pectoralibus cum fructa his adjungi possunt.

XIV.

*Quomodo
oculi
preservandi.*

Quoniam vero oculi in variolis sæpe vehementer afficiuntur, ut non pauci inde visu vel omnino, abcessibus scilicet in ipsis subortis, vel saltem ex parte priventur, quando nimium cicatrices & maculæ in cornea iis concitantur, ad malā hæc præcavenda & avertenda optime conducit, si *alii* a sano homine *manducati vapor* in oculos ægrotantium aliquoties in die inspiratur, vel si *Splenia spiritus vini*, *campbora* & *croco impregnata*, imbuuntur, ad ignem deinde fere rursus exsiccantur, oculisque, aliquoties in die renovata, imponuntur. Ægri vero a splendore solis & ignis, *frictionibus* oculorum rudioribus & *ploratu* quoque sibi cavere debent,

Infantibus, præter vaporem alii, etiam utiliter *lac mulieb* ex uberibus in oculos aliquoties, in die instillatur; vel in hujus defectu, *lac aliud tepidum, croco imprægnatum*, eadem ratione adhibetur.

XV.

Præterea ram oculis quam faucibus a malis metuendis præservandis, (nam hæ sæpe intus valde intumescunt, ut ægri vix deglutire possint) egregie quoque conducit, si quid *croci & camphoræ*, linteolo inclusum, anteriori collo appenditur, atque per totum periculi tempus ibidem relinquitur; imo & dierum trium quatuorve intervallo renovatur. Deinde si jam aliquis tumor fauces occupavit, adhibendum gargarisma reprimens, ex radic. bistortæ, floribus rosarum & malvæ, cum syrupo mororum paratum, atque extus vel crocus vel theriaca cum camphora, collo circumdatur.

Qua ratione fauces?

XVI.

Si palpebræ ob inflammationes sunt glutinatæ, ut sæpe fieri solet; vi nunquam sunt divellendæ, quia inflammatio inde augeretur, & visus læsio inde esset metuenda: hinc, si dolores aliave symptomata defunt, in ægris, qui judicio pollent, ita sine damno relinqui possunt, donec sponte dissolvantur. Sed si dolores aut vehemens pruritus in oculis urgeant, vel ægri infantes sunt vel impatientes, & oculos aperire volunt, referari possunt vel saliva ægri aut alterius hominis sani ac jejuni, vel lacte repido, & cumprimis camphora & croco imprægnato, si eis sæpe foveantur, donec a se invicem rursus recedant. Idem quoque præstare potest oleum ovorum recens paratum & inflammationis minuendæ causa camphora roboratum.

Quid glutinatis palpebris?

XVII.

Alvi obstructio tempore eruptionis, immo & primis purificationis diebus neque clystere, multo minus purgante est irritanda, quamvis per septem vel octo dies duret, præsertim quando æger nullum inde percipit incommodum. Sed si nimis diuturna, aut æger ventris dolores aliave incommoda inde sentiat, primo victu lubricante ex prunis vel pomis coctis, itemque decocto tamarindorum, paucis saccharo edulcorato, loco porus ordinarii solutio est tentanda, quæ vero si parum succedat, aut periculum sit in mora, clystere emolliente est solvenda.

Quid alvi obstructa?

XVIII.

Alvi fluxus contra, qui ut plurimum valde periculosus, cohibetur pulveribus terreis, ut pulv. pannon. bezoard. Senner. vel Anglicano, cortice cascarillæ & nitro roboraris, in primis crystallo montana, vel coralliis rubris præparatis, vel & CC. unto aut terra sigillata, ex aqua menthæ vel

Quid enim nimis soluta?

cina-

cinamomi cydoniata, parca, sed sæpe repetita dosi data, ut in monito 9. & 10. Cap. III. dictum est, curatur. *Dysenteria* vel eadem ratione, vel interposito in malo graviore, præsertim vesperi, leni opiato ex diascordio, vel laudano liquido, aliove simili, itemque clysteribus ex lacte & theriaca subinde injectis, sanatur, ea simul adhibita cura, ne ægri, quando alvum exonerare volunt, e lecto surgant, quod ob refrigerationem, hic summe noxiam, probe vitandum. Atque illa ipsa quoque medicamenta interna in *Vomitu nimio*, præmisso potu largo aquæ tepidæ, sæpe repetitis modicis dosibus, optimo cum successu adhibentur.

XIX.

Quid in
hemor-
gia na-
rium?

Hæmorrhagia siue profusiones sanguinis e naribus *plerumque* hic sunt salutares; adeoque nisi forte nimix, non sistendæ, sed sibi relinquendæ, donec sponte desinant; sin *vero nimie*, ita ut æger valde inde debilitetur, eadem sunt faciendæ, quæ Cap. III. monito 18. commendavimus.

XX.

Quid in
delirio &
convulsi-
onibus?

Contra *deliria* & *convulsiones* pulveribus temperantibus, nitrosis, cinnabaris & camphoræ aliquot grana, immo & paucillum opii vel theriacæ addantur, atque emulsiones quoque cum camphora, aut potiunculæ ac tincturæ acidulæ his sæpe interponantur. *Vesicatoria* deinceps suris & cervici applicantur, atque *clysmata* revellendi & temperandi scopo cumprimis ex sero lactis, nitro & melle, vel saccharo, vel aqua tepida cum nitro, injiciantur, & subinde aliquot gutturæ spiritus CC. vel liquor CC. succinati exhibeantur.

XXI.

Quid in
virium de-
fectu?

In *virium defectu*, quia variolarum recessus metuendus, dandæ essentia diaphoreticæ, alexipharmacæ, vel Tinctura coralliorum, & aquæ roborantes pro fibris languidis stimulantibus, hisque subinde interponatur *haustus vini rhenani* vel alius generosi ac bonæ notæ, quale forte æger maxime appetat. (Conf. monitum 20. Capitis III.) Atque hoc ipsum in *tarda nimis suppuratione* & *exsiccatione variolarum*, quia hæc plerumque ob vires nimis prostratas contingere solent, fieri debet, ubi & myrrha pulveribus expellentibus cum fructu ad aliquot grana additur.

XXII.

Quid in
lingua &
narium
ulceribus?

Lingua & *labiorum fissura* demulcentur mucilagine seminis cydoniorum sæpe illitæ. Sed in *narium vehementi exulceratione* turundæ oleo ovorum imbutæ, in eas immittendæ, & subinde renovandæ, ne inde forte, ut aliquoties vidi, inter se concrecant, & respirationem postea ac loquelam valde corrumpant.

XXIII.

XXIII.

In variolis confluentibus suppurationis tempore, & cumprimis circa undecimum morbi diem, nova quedam febris incidere, eaque ipsa sæpe perniciosissima mala, ac mortem ipsam haud raro concitare solet. In hoc rerum statu, ubi vehementissimæ anxietates aliaque pessima symptomata plerumque oriuntur, nihil magis prodest, quam si alvus lenibus purgantibus ducitur: id quod optime fit decoctis sive potiunculis ex tamarindis, vel rhabarb. aut foliis sennæ paratis, quorum apud adultos unciiis tribus, deinde mannæ ℥j. additur, unde plerumque magnum levamen sentiunt, aut prorsus ab iis malis liberantur. Quod si vero his prima vice prædicta symptomata non valde imminuta sint, eadem medicamenta semel iterumque sunt repetenda, donec ægri melius se habeant. Nam hic periculum a purgantibus ejusmodi non est metuendum, ut quam plurimi hucusque sibi imaginati sunt, cum evacuando materiam noxiam, inorbi tempore intestinis collectam, egregie profint, iisque omisiss vel neglectis, hi ægri plerumque moriantur. Conf. celeb. Angli Freindii Lib. de purgant. in nova variolarum confluentium feбри adhibendis, & *Dissertatio nostra de Manna* ejusque usu in nova hac confluentium feбри.

Quid in
nova con-
fluentium
feбри?

XXIV.

Ad foveas & cicatrices turpes faciei evitandas nonnulli suadent, ut ægri tempore invasionis pediluvia tepida emollientia quotidie adhibeant, atque mox quoque ad impetum a capite & facie avertendum, vesicatoria brachiis & pedibus eorum, revellendi causa, applicentur: quarum vero rerum periculum meis ægris hucusque varias ob rationes suadere nolui. Attamen circa finem suppurationis pustulas majores acicula aperiri jubeo, ut pus effluere atque partes subjectas erodere nequeat. Pustulæ exsiccatae eundem in finem avelli, & loca ulcerata deinde oleo amygdalarum dulcium vel amaranthinarum, vel ovorum illini possunt, ita foveæ vel nullæ vel saltem minus deformes remanent, præsertim si ægri antea in regimine præscripto temperamento servati neque calidioribus medicamentis tractati fuerunt, utpote a quibus alias deformes cicatrices sæpissime producuntur. Pustulis exsiccatis eisque vel avulsis vel lapsis, facies sæpius vapore lactis calidi, vel decocti avenæ foveatur, quod multum ad cutis æqualitatem & levitatem producendam facit.

Quid ad
turpes ci-
catrices e-
vitandas?

XXV.

Morbo superato ægri semel iterumque, præsertim post majores variolas, antequam aerem ingrediuntur, (quod non nimis cito fiat,) probe sunt purgandi, hisque purgantibus semper apta mercurii dulcis dosis est addenda; alias

Quid
morbo su-
perato.

plerumque varia gravia mala & cumprimis ophthalmiz, spina ventosa, tumores glandularum, & ulcera varia variolas sequuntur: id quod etiam in oculorum inflammationibus variolas sæpe excipientibus, est faciendum; quibus vero adhuc diaphoretica varia & imprimis infusa ex herba euphrasiz, veronicæ sem. fœniculi, ligno sassafraz, sunt interponenda & subjungenda, haud omisiss idoneis collyriis aliisque discutientibus, quæ in aliis oculorum inflammationibus prodesse solent.

*Quomodo
peiores
præcaven-
da?*

XXVI.

Quando variolæ epidemicæ grassantur, magnates, nobiles, alique honoratiores a Medicis desiderant remedia, quæ liberos præparent, ne, si forte eos aggrediantur, nimis copiose aut periculose a variolis corripiantur. Ordinavi sæpius & adhuc ordinare in ejusmodi casibus soleo, primo purgans, ætati & viribus aptum, ex mercurio dulci & rhabarbaro, vel jalapa, aut similibus; hocque præmisso, *Tincturam* quandam acidulam ex floribus rosarum, papaveris, bellidis vel *aquilegiz* (a), mane & vesperti conveniente quantitate ex infuso Theæ, vel cerevisiæ, vel aquæ quadam destillata assumendam, una cum modica & apta victus ratione: quibus observatis, plerumque factum est, ut liberi illi vel immunes prorsus a variolis manserint, licet in tota vicinia favierint, vel leniter saltem ut plurimum eis correpti fuerint.

XXVII.

De Morbillis.

*Quid
Morbilli
desiderant?*

MORBILLI (b) eadem ratione ac variolæ curandi, nihilque fere aliud requirunt, quam quia *russis* hos ægros *us plurimum*, aut potius *semper*, attamen modo *lenius*, modo *vehementius affligit*, ut ter, quaterve in die ægris detur insulum vel decoctum idoneum *pectorale*, & huic *linctus pectorales* subinde interponantur, conf. Cap. III. monitum 27. In nimis vehementi, noctu syrupus diacodii vel extracti papav. errat. gr. j. vel alterum, vel aliud blandum opiatum, modica dosi dari potest, & *in fine morbi*, sicut in variolis, *alvus purgetur*.

XXVIII.

(a) Ex hoc genere quondam fuit celebris in Germania Tinctura antivariolosa Dotai & Waldschmidtii.

(b) Horum Diagnosid vid. Cap. III. n. VI. & Prognosis eod. Cap. n. VII. & VIII.

XXVIII.

De Febre Miliari, sive Purpurata.

FEBRIS MILIARIS SIVE PURPURATÆ (a) cura- ^{Quid fa-}
 tio quoque potissimum in blando regimine temperante ac ^{bris mi-}
 diapnoico consistit; adeoque potus sufficiens aqueus acidu- ^{liantis?}
 lus, ut cerevisia tenuissima, vel decoctum panis, vel hordei
 aut scorzonæræ citratum haud frigidum, & remedia tempe-
 rantia, diaphoretica; diluentia sæpius, & cum primis N.
 VIII. hujus Capituli iam laudata, primaria sunt: & qui-
 dem sic, ut mane essentia blande diaphoretica, postea mix-
 turæ, potiunculæ, & pulveres diaphoretici, nitrosi exhibe-
 antur. Interea tamen *in maligna*, vel *ubi nausea vel anxie-*
tas cardialgica adest, usus maturus *radicis hypecacuanne* caus-
 sam horum malorum ut plurimum egregie expellit, ut lau-
 datis remediis temperantibus ac diluentibus curatio tanto
 commodius absolvi queat. Si *in puerperis purpura* a lochiis
 suppressis oriatur, sanguis quoque e pedibus detrahatur, &
 pilulæ Becherianæ noctu simul exhibeantur, ad fluxum eo-
 rum, si fieri potest, restituendum. Si *non a lochiis suppres-*
sis, venæ sectio omittenda, & cetera laudata solum adhi-
 benda.

XXIX.

De Febre Petechiali.

Petechiales & petechizantes febres (b) eadem fere ratione ^{Quid Pe-}
 per lenissima diaphoretica, diluentia ac nitrosa optime cu- ^{techialis?}
 rantur, cavendo sudores coactos. *Ubi vero adsunt nausea*,
vel conatus vomendi, respiratio anxiosa, vel *anxietas* circa præ-
 cordia, principio lene vomitorium, præsertim ex rad. hypoca-
 cuanne, utilissimum, immo necessarium est; id quod et-
 iam, si mala illa & præsertim respiratio anxiosa non remit-
 tunt, repetendum, eisque diaphoretica lenia cum camphora
 interponenda & subjungenda.

Alvi fluxus, si adsit, præsertim moderatus, per adstrin-
 gentia non est cohibendus (c), sed naturæ potius relinquen-
 dus,

D 2

(a) Diagnôsis & Prognosis peti possunt ex Cap. III. N. VI. VII. & VIII.

(b) Harum Diagnôsis vid. Cap. III. N. VI. & Prognosis N. VII. & VIII.

(c) Vid. hac de re *Staphilii Opusc. Chym. Phys.* p. 660. & seq. atque *Hoffmanni Dissert. egregia de Diarrhœa in malignis salutari.*

duſ, vel ejus ſucceſſus, quando ſorte natura ſegnior aut ad expellendum nimis debilis, leni laxante adjuvandus (a), & poſtea a prædicta curandi ratione non recedendum, ſicuti Capite ſequenti uberius exponemus.

Vene ſectio locum non habet, niſi forte ubi magna adſit plethora, vel abuſus potionum calefacientium præceſſerit.

XXX,

De Febre ſcarlatina.

Quid
ſcarlati-
na?

In Febre, *ſcarlatina* dicta (b), quæ per ſe quidem non adeo periculosa, & pueros ſere ſolum aggreditur, quando levior, ſola natura, præſertim ſi aptum regimen accedat, ſæpiſſime ſine medicamentis curatur; ſed ſi paullo gravior, cauſſa morbi optime quoque corrigitur & expellitur ſufficienti potu diluente, temperante, acidulo, potiunculis & mixturis temperantibus ac diluentibus, ut & pulveribus temperantibus & blande diaphoreticis, quando ægri a pulveribus non abhorrent, vitatis medicamentis & alimentis omnibus calidioribus, quia ab his morbus redditur gravior, ſervatoque eodem regimine & viſtu, ut in ceteris exanthematicis ac ſpeciatiim variolis (c). Qua via maculæ poſt aliquot dies ſenſim diſparebunt, cuticulæ ſere tota per lamellas decideret, & ægri tunc reconvaſcunt: quo tempore purgandi, & poſtea adhuc per plures dies in cubiculis, præſertim ſi tempeſtas frigida eſt, conſervandi, ut tranſpiration aliquamdiu libera conſervetur, utpote quod ad ſanitatẽ integrã recuperandã valde hic eſt neceſſarium.

XXXI.

Qua via
anafarca
poſt ſcar-
latinã
curanda?

Quod ſi vero ægri aut parentes hoc negligant, poſt tres circiter hebdomadas *tumore ventris*, immo totius ſæpe corporis, ſive *anafarca*, cum, vel ſine febre corripuntur, immo & *tumoribus glandularum* aliisve ſæpius malis gravibus; *urina* ſimul ſolet eſſe fulca ac turbida, & multi inde moriuntur. Cum vero novus hic morbus, (quem quidam pro altera febris ſcarlatinæ periodo habendum eſſe cenſent) ex retentis noxiis humoribus in corpore ortum trahat, optime ei

(a) Conf. iterum ſi lubet, modo laudatã Hoffmanni itemque Burcharđ. Med Roſſoch. utiſſima Diſſertatio, de Febr. Meſenter. Ann. 1727. edita, ubi uſum purgantium leniorum in his & ſimilibus febribus egregie evicerunt.

(b) Diagnofis tradita eſt Cap. III. N. VI.

(c) Obſervare etiam hic juvat, hemorrhagias narum in hoc morbo plerumque non nocere, ſed potius prodeſſe dum plethora cum reddita graviorem.

si medetur remediis, quæ hos humores e corpore educunt: id quod optime fit; 1. alvum ducentibus, iisque per intervalla repetitis; 2. quæ eos per urinam, utpote quartæ viam natura; urina illa fusca & turbulenta; indicare videtur, expellunt: quales præ ceteris est tinctura tartari bis terve in die ad x. vel xx. guttas exhibita; vel & huic liquor terr. foliar. tartari aut spiritus nitti dulc. commode admisceri potest; 3. quando infantes aut pueri purgantia assumere renuunt, *clysteribus* quoque & decoct. foli. sennæ satis apte purgantur (a); *Sudoriferis* vero hic nihil efficitur, dum sudor vix ulla ratione obtineri potest. Interea tamen *partes tumide a frigore probe sunt defendendæ*: nam si valde frigent, sæpe instantis mortis indicium præbent. Si *febris combinata* est, quæ frequentissimum hujus mali solet esse symptoma; mixturæ & potiunculæ temperantes ex aquis diureticis paratz, horis pomeridianis & vespertinis sedule exhibendæ; Alia symptomata remediis suis propriis sunt oppugnanda.

XXXII:

Denique in omnibus exanthematicis *refrigeratio*; itemque *levis & indusus mutatio summe sunt noxia*; adeoque serio vitanda: nam hæc facile mortem, ut sæpe vidi; aut gravissima saltem mala inducunt. E contrario autem *nimis calor* quoque est perniciosissimus. *Tranquillus* vero *decubitus* in *moderato & æquali calore*, ad blandam & æqualem transpirationem semper conservandam; quam utilissimus est, atque quam maxime commendandus, nisi forte in lenissimis *Variolis*, *morbillis*, *scarlatinis* & *urticatis*, ubi *deambulatio in cubiculo temperato, clauso*, ipsis concedi potest; quamdiu ambulare volunt aut possunt:

Obstundit ratione re: gemitio.

C A P U T V:

De Febris acutis stomachicis & intestinalibus quibusdam; mesentericis dictis:

I:

DENIQUE peculiare adhuc genus est februm acutarum & plerisque Scriptoribus hucusque valde neglectum; quod ratione symptomatum & curationis multum a ceteris differt, attamen apto satis nomine nondum descriptum, adeoque & plerisque adhuc prætervisum esse mihi videtur:

Peculiare acutarum genus.

D 3

II:

(a) De hac febre scarlatina haud pridem peculiarem libellum evolavit cel. Medicus Gothanus, Jo. Storchius; Gothæ 1742, 8. linguae veridacula.

II.

*Differen-
tia a cata-
vis.*

Differt autem a reliquis febribus acutis primo in eo, quod *alv. fluxus ipsam plerumque comitetur, sed innoxius, immo potius salutaris, & quem reprimere periculosum est*; deinde quod non tam medicamentis temperantibus ac diaphoreticis, quibus fere omnes reliquæ acutæ curantur, multo minus sudoriferis aut alexipharmacis calidis vinci queat, verum his exacerbetur, & ægri perdantur; sed potius alvum blande ducensibus, vel & vomitum leniter moventibus, optime profligitur. Adeoque falluntur ii, qui omnes acutas diaphoreticis potissimum aut sudoriferis curandas esse existimant aut docent.

III.

*A quibus
observa-
tum.*

Præcis quidem Medicis hoc febrium genus haud incognitum fuit: nam manifesta ejus vestigia jam apud Hippocratem & subsequentes Græcos, immo & apud Celsum reperiuntur. Deinde etiam ex recentioribus Duretus, Forestus, Sennertus, Riverius, Sydenhamus, Ettmullerus, Baglivius, Medici Ratislavienses, Stablius, Hoffmannus ac Lancisius, ut alios nunc taceam, illud viderunt, & quidam brevius, quidam prolixius descripserunt.

IV.

*Ad mali-
gnas rela-
tum.*

A plerisque hæc febres ad malignas relatae sunt, quia inusitata quædam ac gravia, vel mox in principio symptomata ipsas comitabantur, vel per curationem consuetam diaphoreticam & potissimum sudoriferam eas insequerantur, quæ plerisque ægris præcordiorum angustia, anxietates, dolores circa ventriculi regionem, virium prostratio, deliria, exanthemata varia, & præsertim petechiæ, aut purpura inducta; & in ipsam tandem mortis periculum usæpe conjecti sunt.

V.

*Earum
caussa &
sedes in
primis
visis.*

Febres autem hæc in primis visis, hoc est, in ventriculo, & intestinis potissimum, sedem suam, ob phænomena §. 2. relata, habere videntur; vel si forte sedes aut causa quarundam earum in his, sicut tamen verisimile est, non sit, tamen materia sive causa ipsarum, qua in putrida colluvie consistit, per has vias optime, experientia teste, evacuat; adeoque vel non in sanguine ea hæret, ut plerarumque acutarum aliarum causa, vel saltem per illas vias longe felicius, quam per cutem aut sudorem, vel etiam sanguinis missionem, natura sæpe viam monstrante, eliminatur æque sic illa viscera a saburra vitiosa, putrida vel maligna, has febres inducente, brevissima ratione liberantur, sicut hoc etiam in febribus dysentericis & dysenteria ipsa optime fieri solet.

VI.

V I.

Nonnulli has febres *mesentericas* appellantur, ut *Baglivius* (a) & speciatim *Burchardus* (b) Med. Rostochienſis quondam celeb. ſed nuper magna rei medicæ jaſtura defunctus; quia vel in meſenterio, vel circa illud ſedem ſuam iſſas habere exiſtimarunt. *Sydenhamus*, ſummus ille Medicus, ſimiles quoque febres deſcripſit in tractatulo de *Nova febris ingreſſu*: attamen quia idoneum aliud nomen proprium ignoraffe videtur, generali nomine *nova febris* contentus fuit, & ſub hoc eas ſatis bene deſcripſit.

De nomi-
nibus en-
tericis.

Mihi vero, quia raro forte in meſenterio earum cauſſa, aut ſedes eſt, dum difficile concipitur, quo in meſenterio loco illa hæſere, aut etiam ex eo ope purgantium expelli poſſit, adeoque nomen *febris meſenterica* fallam ideam lectoribus & præſertim tyronibus concitat, de meliori nomine cogitandum eſſe exiſtimo, atque donec forte aptius inveniatur, rectius eas *ſtomachicas* vel *intestinales acutas*, a ſede, quam revera habent (c), vocari poſſe cenſeo; ita ut ad hoc genus omnes fere illæ febres acutæ, quæ fluxu alvi ſtipatæ ſunt, commodè referri queant; quæ tamen deinde rurius *varia nomina ſpecialia* a variis iſſas concomitantibus malis recipere, iſſque in ſuas ſpecies diſtingui poterunt. Abſonum itaque videtur, omnes acutas una eademque ratione, ut recentiores pluriſimi voluerunt, *diaphoreticis vel ſudoriferis*, vel etiam *vene ſectiōe, ſanare velle*; cum naturæ in his alias vias demonſtret, & uſus alios quoque & quidem jam indicatos curandi modos comprobet, immo illis multum præferat.

V I I I.

Maniſeſte igitur ad hoc genus pertinent *dysenterica* & *pe- Species techiales* ſive *petchizantes* (d), alizve congeneres, ad malignas vulgo referri ſolitz; præterea febres nonnullæ *catarrhales* dictæ, itemque *continue quotidiane*, & quam maxime *tertiane*, ut & *febris ſemitertiāna* ſive *hemitritæus*, quo nomine a veteribus eæ intelligi ſolent; ubi ægri vel quotidie, vel tertio quovis die, novam acceſſionem ſive horrorem ac poſtea calorem experiuntur magis intenſum, & ubi ſæpe, quando corpus in lecto commovent, horrore quodam afficiuntur, unde & *epixôdiſ*, id eſt *horrificæ*, veteribus dictæ ſunt,

Species
hujus ge-
neris ſive
varietates
eius & ſi-
gna.

D 4

atque

(a) In Praxi Medica Lib. I. itemque Lib. de Fibr. motrice Cap. XII. & in Ep. II. oper. ejus annexa ad *Andryum*, mihi pag. 701.

(b) In Diſſert. de *Febribus meſentericis* ſupra jam laudata.

(c) Ita enim *Baglivius* quoque ſentit, quando ait l. c. *febres omnes gravioribus ſymptomatibus ſtipatæ vel a viſcerum inflammationibus pendens, vel a pravis contentis in primis viis.*

(d) Conf. ſi placet, *ſtabi. Opuscul. Phyſico Chym. Med. p. 660. & ſeq.*

atque *epixodias* & *hemitritici*. HIPPOCRATI synonyma sunt (a), quas veteres rursus pro symptomatum varietate in plures alias; ut *Typhodem*, *Assodem*, *Elodem*, *Epialam* & *Lipyriam* subdiviserunt: quæ vero *essentia omnes conveniunt*, sed symptomatibus tantum nonnullis differunt, sic, ut nimis subtilis illa divisio entium præter necessitatem fere sit multiplicatio, atque tyronibus minus utilis. *Hemitritici* igitur quæ & *tritophyæ* veteribus dictæ, proprie sunt *febres*, quæ *tertio quoque die horrore exacerbantur*, immo & alias subinde, ut jam dictum est, leviozem horrorem ægris concitant, ita, ut *horroris illa frequens perceptio signum pathognomonicum hemitritici constituat* (b): quare hi ægri corpus semper probe contestum amant; unde vero ii, qui ad sudores proclives, facile in sudores, nihil proficientes, sed potius noxios incidunt; id quod jam HIPPOCRATES notavit (c), dum dicit: *in phricode, qui sæpe & multum sudore diffluunt, miserandi*. Nam mali hujus causa non hæret in sanguine, sed in ventriculo & intestinis; atque sic non per sudorem, (quia noxius in eo observatur;) sed per alvum, aut os quandoque, tanquam vias proximas, quas natura hic sæpe indicat, e corpore eliminari desiderat. Atque hæc febres largis ejusmodi sudoribus præditæ, elodes veteribus dictæ, & valde periculosæ ab ipsis merito habitæ sunt. Dum veto regimine sive diaphoretico sive sudorifero materia noxia ex intestinis in sanguinem propellitur, sed ad transpirationem inepta est, in cute hærens maculas sæpe rubras, vel lividas consitat, sic inde fiunt *potechie*, quem statum tunc, tanquam novam febris mali moris speciem considerarunt; aut malignæ diæ inde concitantur, immo ipsæ pestilenciales; vel materia vitiosa in nobiliores partes ope bezoardicorum pessima metastasi transfertur, ut Sydenhamus & Baglivijs etiam jam notarunt, atque inflammationes in eis producit, sic ut si ad cerebrum transferatur, deliria aut phrenitidem; ad pulmones, peripneumoniam vel pleuritidem; in alijs partibus, alias producat, quibus ægri, orta gangræna, vel brevi jugulantur, vel suppuratione facta, lenta tabe conficiuntur. Quando autem hæc primarum viarum materia vitiosa non adeo mali moris est, & vel ad nares, fauces aut pulmones transfertur, leviores inde proveniunt morbi, quos defluxiones sive catarrhos vulgo appellant; vel febre juncta, febres catarrhales, materiaque illa per hæc loca evacuat; aut quoniam hæc defluxiones hemitriticum haud raro con-

(a) Teste Burchard. Diss. laud. p. 4. (b) Hujus horrois seu frigoris frequentem perceptionem a visiosis humoribus in primis visceribus easque vellicantibus oriri cum Burchard. in citata modo Dissert. p. 5. haud àq̃c tatione existimo. (c) Vid. Duresius in Coacis prænot. p. 9.

concomitantur, eam febris catarrhalis nomine salutabant, & quidem vel benignæ vel malignæ pro magis vel minus gravibus, quos in corpore agri edunt, effectibus.

VIII.

Triphylæ vero febres proprie dictæ sunt; quæ quidem quoque tertio. five impari die suas per horrores habent exacerbationes; verum minus certas, sed erraticas ac majore calore ægros affligunt, atque ad arduos sive causodas magis accedunt, ideoque gradu fere tantum ab ardentibus differat: hinc a recentioribus hæc duæ sub eodem vocabulo febri cholericæ sive biliosæ comprehendi solent, a quibus, etiam haud raro febres putridæ; ob factorem conjunctum, dictæ fuerunt: atque hæc omnes, quod caput fere rei est, sæpe alvi fluxum habent comitem, & in primis vis ut plurimum sedem obtinere videntur. Frequens præterea & molestum valde symptoma est horum morborum, anxietas rixæ præcordia, interdum sine, interdum cum cardialgia, quo in statu Affodæ a veteribus dicta est; unde teneriores subinde syncope corripuntur; a quo symptomate febres syncopales etiam dictæ sunt, adeoque ob vehementiam hæc mala malignis annumerantur. Haud raro his febribus stomachicis atque intestinalibus dolores hypochondriorum perquam graves ac molesti superveniunt, qui, præsertim sitissis accedit, pleuritidem sæpe mentiuntur, & quidem ob cætera gravia mala simul juncta; malignam; ita ut minus cauti minusve exercitatis ejusmodi febris pro pleuritide habeatur, atque pro ea, sed malo cum successu, tractetur.

IX.

Verum omnia hæc symptomata a constrictionibus spasmodicis, tam ventriculi; quam intestinalium, cum tenuium, tum crassorum ab acri in iis contenta putrida materia irritatorum, quæ ad has admodum præclives sunt; oriuntur; quibus ipsis vero simul respirationis organa; ob nervorum nexum, in consensu, sicuti alias in spasmis hypochondriacis & hysteriis fieri solet, rapiuntur; id quod non solum magna pituitæ tenacis ac foetidæ copia; quæ vel clysteribus vel lenibus evacuantibus, sed maxime, quæ sponte natura; magna sæpe copia, cum fructu & haud raro integra morbi solutione expellitur; docet; sicut HIPPOCRATES id satis manifeste jam notavit, quando ait (a): quibus in febre dolore lateris oboriente, alvus multa aquosa & biliosa egredit; hi allevantur.

Alia ad
huc differe-
rentia &
signa.

Causa
harum
variarum.

X. Quæ

*Omnes hæc
Febres in
funda-
mento
convu-
lsum.*

Quoniam igitur hæc febres omnes re ipsa convenire & ejusdem fere nature esse, atque non nisi certis symptomatibus variare, mihi varisque aliis, ex supra laudatis Scriptoribus videntur, omnes commode unico febrium *stomachalium & intestinalium acutarum nomine* comprehendendi possunt, nec opus hic esse existimo, ut jam dixi, entia ac nomina præter necessitatem multiplicare, iisque tyrones confundere, & frequentem errandi occasionem præbere; nomine, ex mea sententia, satis apto (saltem longe, ut opinor, aptiori, quam *mesentericarum* aut ceterorum omnium nominum hæctenus prolatorum), ita enim juniores in his morbis & cognoscendis & curandis minus errabunt: quia sic certius meliusque scient, ubi eorum sedes, quænam sit causa, & denique quid in eis sit agendum: cum eadem omnium, paucissimis pro ægrorum forte diversitate mutatis, sit & indicatio & curandi ratio.

XI.

*Et per evacuationem
curari de-
staurant.*

Observatio enim nonnullorum supra laudatorum Medicorum præstantissimorum docuit, earum naturam ita constitutam esse, ut causa sive materia morbi per alvum ut plurimum educi desideret, & sponte sæpius a natura, licet nullo certo die, dum dies cerri critici hic non dantur, etiam per hanc viam expellatur; minime per transpirationem, ut aliz pleraque acutæ, multo minus per sudorem; quippe quia his, ipso etiam STAHLIO teste (a), semper in deteriorem statum conjiciuntur, adeoque probe ab illis distinguendæ, quæ vel per sudorem vel hæmorrhagiam crinice solvuntur: quod vero, quia paullo difficilins a junioribus Medicis dijudicatur, operæ prætium erit signa hic suppeditare, eaque satis certa, quibus hæc febres, quæ evacuationes per alvum possulant, a cæteris dignoscere queant.

XII.

*Etiam
diagnosis
& r. levissimum.*

Sunt itaque omnes hæc febres tales; 1. ut ægri eis correpti per vices horreant, sed incertis temporibus; 2. dentes, lingua & fauces viscida & spurca pituita, ac speciatim lingua squalore sæpe luteo, sulco vel nigricante, ipsis obstitæ sint, ita ut adstantes plerumque fætoris oris, ægri vero ipsi adversam saporem gustu inde percipiant; 3. alvi fluxus ut plurimum adest, & excrementa, quæ per anum ejiciuntur fætores sæpe pessimum spirent; (b) 4. hypochondria tensa sunt & sæpe simul valde dolent, (sine dubio a copiosis & turgentibus humoribus noxiis, in ventriculo & intestinis contentis;) 5. pavo-

(a) Libro & loco supra jam citatis.

(b) Quæ omnia etiam Baglivius jam bene notavit in *Prax. Med.*

pavores frequentes in somno incidunt, ut propter eos dormire aut quiescere nequeant, qui sensibilibus etiam vigilando haud raro sunt molestissimi, ita ut ex levissima saepe causa concutiantur & vehementer expavecant: atque hos pavores in febribus acutis quibuscumque haud sine ratione pro certissimo indicio habet BURCHARDUS mineram febris in intestinis hærere; quæ etiam ratio esse videtur, quare tritophyas febres HIPPOCRATES terrificas dixerit, atque nali plerumque præfagii habuerit; (a) 6. dolores quoque plerumque adfunt capitis & cervicis, a spasmis, ut videtur, oriundi; 7. urina initio morbi utplurimum naturali similis (forte quia causa morbi tunc nondum est in sanguine,) in progressu turbida fit ac limosum sedimentum deponit; quod sæpius usque ad finem ita durare solet.

XIII.

Atque ex his signis primarum viarum febres acutas satis cognosci posse existimo. Adfunt quidem saepe adhuc alia, quæ vero non tam febres hæc, quam potius gravem & periculosum earum statum, si adfunt, indicare solent; qualia 1. sunt, summa præcordiorum anxietates; 2. dolor ventriculi aut lateris unius circa hypochondria acutissimus, pleuritidem mentiens; 3. vires valde prostrate & lypothimiz; 4. ardor interne, sed externe frigus; 5. motus manuum tremulus, subsultus tendinum, mentis vacillans, singultus, floccorum collectio & sudor frigidus; quæ ultima simul materiam morbi malignam atque summum vitæ periculum indicant; atque simul ex his indicia peti potest præfagium.

2. Graviorum aut malignarum cum prognosi.

XIV.

Sunt & quædam symptomata hisce febribus familiaria, quæ vero proprie non ex natura earum, sed potius & plerumque, sicut in aliis multis, ex malo ipsarum regimine, ac præsertim nimis calido, vel sudorifero, dum scilicet eo ipso, ut supra jam dictum est, materia vitiosa ex intestinis ad sanguinem ac partes nobiliores propellitur, sed exhalare forte e sanguine in cute ob spissitudinem vel aliam rationem nescia, hinc inde in ea hæret, & maculas aut papulas rubicundas aut lividas producit, quo casu tunc febris petechialis vel purpurata dici consuevit; vel si ad aures interne deponitur, surditatem sæpe producit; vel circa glandulas parotides vel maxillares, atque ibidem tumores, inflammationes, & abscessus pessimos concitat; si ad cerebrum transfert, deliria, phrenitidem; atque sic, prout in partem corporis magis vel minus nobilem impellitur, diversa necessario mala ac pericula, ut pleuritidem

Symptomata minus consuetæ.

(a) Vid. Duret. Comment. in Concas prænot. p. 20. & Aph. 67. Sect. IV.

videm; peripneumoniam, hepatis, lienis, ventriculi, intestinorum, &c. inflammationem producit; quæ diversissimam causam & morbum diversum indicare videntur, licet revera unus idemque sit morbus, & una eademque causa, atque vix nisi loco affecto malis que accidentibus inde oriundis differat.

XV.

*Diarrhoeam si-
flore peri-
entiosum.*

Quare si *hæc* in malis alvi fluxus supervenit, *isque* per medicamenta cohibetur, ægri in pejus ruunt (a), quia materia noxia excerpenda retinetur; sed si sibi relinquitur, dum causa primaria in intestinis hærens sic e corpore expellitur, morbum plerumque minuit, aut omnino solvit, quemadmodum HIPPOCRATES generatim de febre lateris cum dolore combinata, sicut paullo supra indicavi & speciatim de surditate & parotidibus. (b) Gerard. Columba de febr. pestilent. alii que supra N. III. laudatis præstantissimis Medicis de petechialibus, mesentericis, epidemicis, catarrhalibus, horrificis; aliisque testantur.

XVI.

*Evacuatio
primarum
viar. neces-
saria.*

Cum autem maligna ac vitiosa harum febrium, ut multa phenomena, (excrementa v.gr. saliva, sudor, foetida & subinde cadaverosa) suadent, *materia non tam in halitiosa quadam; ut Stahlus existimavit* (c), substantia tantum, sed sæpe in *putrida quadam* pravorum humorum colluvie consistere videatur; in ventriculo aut intestinis, vel in ambobus simul collecta; atque attenta observatio & usus docuerint, *eam correctionem*, (saltem per hætenus nota aique usitata remedia) sæpius non admittere, sed *evacuationem potius per alvum desiderare*, quemadmodum etiam hoc in febribus & vermibus oriundis, qui quoque ut plurimum in multa putrida pituita nidulantur, & alii & ego frequenter observavimus, *quæ febres revera sæpe valde vehementes & periculosa* sive malignæ sunt, hinc nisi illa materia vitiosa a natura sponte ejiciatur, sicut id forte sæpius ob tenacitatem fieri nequit; præsertim in illis, ubi calor non est adeo vehemens, sed potius horrores frequentes incidunt, arte a Medico, natorum tunc Magistro, (cujus prudentia & directio hic plus valet quam natura) sed non violenta; verum blanda ratione evacuari debet. (d) Doctissime hac de re etiam disserit celeb. Lancisius, quando ait; In febribus novis, præsertim malignis, castrensibus, petechizantibus, &c. Medicus diligenter

naturam.

(a) Teste experientia & ipso Stahlus Opusc. Chym. Med. p. 612. & seq. (b) Aphor. 28. Lib. IV. & Epidem. Lib. I. (c) In Opusc. Chym. Med. ubi Histor. Febris epidem. Petechizant. exponit. p. 636.

[d] Libro modo citato p. 639. seq. 647.

natura motus observare debet, & quidem sic, ut salutaribus faveat, noxiis obsistat, ægrumque translatione saltem in chronicum morbum, (quod est hac in re, ut admodum frequens, ita summo opere utile) ad salutis portum utcumque perducatur. Exinde fit, ut in hujusmodi febribus raro purgantis, nisi ab initio, & quidem cum absente diarrhœa, quotidie remiserint, aut alternis diebus rigore, aut saltem frigore exacerbentur, juvare solent: tunc enim non levis materie febrilis portio circa hypochondria aut primas vias hæret solet, quæ vel emeticis, vel purgantibus evellitur. Vid. doct. Lancisii Epistola, in Cochii Epistolis Med. p. 23. de Febribus castrensibus, contenta.

XVII.

Modus vero evacuandi materiam corruptam in febribus acutis e corpore varius hæcenus fuit apud Medicos, & quidem plerique hoc per sudorifera, vel saltem diaphoretica, præstare voluerunt. Verum usus docuit, rem hac ratione, si in ventriculo vel intestinis materia noxia hæret, baud feliciter succedere; sed potius eo ipso eam in sanguinem promotam, petechias, aphthas, phrenitidem, anginas, inflammationes; & abscessus periculosos, vel omnino gangrænam, sphacelum partium internarum, ac mortem inductam esse: unde HIPPOCRATES jam miserandos illos dixit, qui in pbricide multum sudant: quia hi ægri his solum debilitantur, causa tamen per ea ex ventriculo & intestinis haud aufertur.

XVIII.

Rectius vero, & per viam longe breviorē hoc fit per os vel per alvum, natura hic sæpe viam monstrantē, atque usu quoque hanc curandi rationem confirmante.

Testes habemus egregios Medicos jam supra N. 3. laudatos, & ex parte etiam Stæblium (a), qui tamen ultimus, licet observaverit, diarrhœam ægris hujusmodi febribus laborantibus non nouisse, iteinque ægros tales longe melius se habuisse, quibus alvus fluxerit, quam quibus obstructa fuit, immo empirici cujusdam remedium alvum ducens indicet, quo quamplurimi febribus petechizantibus, prout ipse eas appellat, si-ve quotidianis continuis, castrensibus aut epidemicis, acutis, decumbentes optime curati fuerint, tamen, quantum ex ejus scripto videre est, ipse lenia evacuantia, licet natura viam per alvum demonstraverit, isque naturæ ductum sequi alias ubique fere docuerit, iis porrigere ausus non est; attamen circa finem illius scripti p. 687. spondet, se brevi aliquid editurum esse, quod emeticorum & catharticonum eis

Alii alio modo curationem instituerunt.

Optime per primas vias evacuantia curantur.

in

[a] Opusc. chym. jam sæpius citatis.

in morbis usum uberius sit expositurum; quod vero an factum sit, dubito; quia illud videre haud memini. Interea tamen & antea laudati Medici, & nonnulli alii postea, ductum naturæ hic sequentes, *felicem evacuantium*, & cum primis *lenium emeticorum & catharticonum usum*, ejusmodi in morbis *tentarunt*, eumque longe saluberrimum deprehenderunt, inter quos præter nominatos etiam est CAROLUS (a), alique forte plures: cum primis vero BURCHARDUS in Dissert. sua jam aliquoties laudata de *Febris mesentericis acutis*, hanc curandi viam diaphoreticæ & sudoriferæ haud sine ratione quam longissime prætulit, & nuperrime etiam adhuc DEGNERUS in libro de *Dysenteria Biliosa*, in Febris Dysentericis. Quamvis autem fluxus alvi sponte iis superveniens *febres has intestinales sæpe solvat*, rectissime tamen Burchardus, *eum in omnibus agrotis sponte non oriri*, naturamque ad noxiam materiem expellendam sæpius haud satis validam esse monet, *aut nimis quandoque a vitiosa putrida materia irritatam, plus, quam par est expellere*, atque sic ægris vires nimis exhaustire, eosque hoc ipso sæpe perdere. Itaque *hiscæ in morbis plus valere Medici prudentiam, quam naturam*; scilicet ut languentem, quæ hic quod facere debet, non facit, blandis emeticis, vel alvum moventibus remediis excitet, & e contrario nimis violenter expellentem ægrumque debilitantem, prudenter moderetur, sicut id ex viribus ægri & pulsu dijudicare debet.

XIX.

Quibus
remediis
evacuatio
instituen-
da.

Durerus antiquo medicamento purgante, *hiera piera* dicto, per aliquot dies in ejusmodi casibus *feliciter cura successu* usus est (b), cujus primarium ingrediens est *aloe*, quod & Baglivius hic valde commendat: ideoque & alia aloetica blanda remedia, ut pilulæ Francofurtenses, Immanuelis, vel Beechamianæ, hiscæ similes, vel alia idonea aloetica composita hic adhiberi poterunt. Alii decocto vel *rhaborbari*, cum aut sine *manna*, utuntur; vel horum loco apte quoque Tinctura sive *Anima rhaborbari*, ad morem Degneri, ad cochlear j. vel ij. per intervalla, dari apte potest; infantibus vero gutt. 20. ad 50. BURCHARDUS *sæpè anglicanum purgans* hic laudat, ejusque ʒj. puerperæ cuidam optimo cum successu exhibuit, quo sedecim secuti sunt sedes, cum perfecta febris ejusmodi intestinalis solutione, adeoque & aliis cum fructu dari potest. Alii ægro *mannam cum cremore tartari & nitro* feliciter dedit. Ego sæpius potiuncula ex leni decocto *tamarindo*.

[a] Sive Carl. Medicus Practicus egregius, & Danicæ Regis Archiater, in scriptis suis practicis.

[b] Vid. ejus Commentar. in Coacas prædict. p. 27.

andorum & foliis fennæ cum manna, feliciter usus sum, vel & animal rhabarbari, vel etiam pulveris rhabarbari 3ss. cum nitri ʒss. vel in mulieribus, ubi forte menses instant, pilulis etiam Becharianis: hisque & similibus evacuantibus dolores ventriculi & hypochondriorum, itemque præcordiorum angustie egregie hic tolluntur. Cum itaque evacuantia ejusmodi lenia egregie hic prosint, sudorifera autem, & quæcumque corrigentia alia hæcenus tentata, noxiam hanc materiam in primis viis non destuant, haud male BAGLIVUS indignabundus quasi in eos, qui febres tales solis alterantibus curare volunt, invehitur Medicos, dicendo: Quantum exardeo, cum video Medicos ad corrigendam & dulcificandam solum materiam occupatos; sed de humore peccante foris eliminando non cogitare.

XX.

Verum præter hæc lenia evacuantia, in eundem scopum simul quoque lubricantia varia apte adhiberi atque illis interponi ac subungi possunt: ut scilicet sunt potus *seri lactis, decocti. C. C. cum pomo citri paratum, decocta ex bordeo cum pomo citri & saccharo, vel ex avena cum passulis confecta; decocta prunorum dulcium aut pomorum fragrantium saccharo grata reddita; emulsiones ex amygdalis & pineis, aut semin. A. frigid. si recentia sunt, quæ omnia etiam roborandi vi pollent, immo & oleum amygdal. dulc. quoque in iis, qui oleosa non averfantur, haud inepte ad acrimoniam in primis viis corrigendam & vias lubricandas subinde interponitur. Infusi herbar. Theæ & decocti Coffeæ potus tepidus, vel quod HIPPOCRATES jam commendavit, bordei tostii, ad modum Coffeæ paratum (quod eundem fere saporem & virtutem habet) itemque potiuncule diluentes ex aquis temperatis, & syrupo paratæ, atque acidulæ redditæ, ad corrigendam materiam acrem, putridam, alcalicam commode etiam porriguntur. Pulveres ex absorbentibus terreis, cum nitro & cinnabari quoque cum fructu inter cætera iis quandoque dari possunt, qui pulveres non averfantur; verum non ob scopum diaphoreticum, & sine regimine sudorifero, sed tantum ad imbibendam & temperandam materiam vitiatam acrem, & motus spasmodicos ac dolores hoc ipso mitigandos.*

XXI.

Quod si laudata lenia evacuantia & lubricantia ad humores noxios extrudendos forte non sufficiant, atque æger de magnis præcordiorum angustis, doloribus ventriculi & hypochondriorum conqueratur, *Clysteres quoque simul lubricantes & demulcentes, qualia sunt decoct. avenæ cum oleo olivar. vel lini, vel decoct. fl. chamæm. in lacte, cum oleo, melle aut saccharo, quod egregium simul est, antispasmodicum & anodynum,*

*Clysteres quoque
uiles.*

num, in usum adhuc sunt vocandi; ut iis non solum exitus corruptorum promoveatur, verum etiam acris materia temperetur, ac spastici motus in intestinis & ventriculo demulceantur: quibus hisce in malis sæpe multum boni efficitur. Si qui vero penitus a clysteribus abhorrent, iis *sal anglicanum*, sicut N. XIX. dictum est, apte dari potest, quod raro spem nostram destituet, quodque eo magis laudandum est, quia æstum febrilem simul tempeiat, & *intra breve tempus plerumque alvum solvit*, ægroque sic cito solatium præbet. *Clysteres* tamen *omnium promptissimum & innoxium* maxime remedium constituunt, semel, bis, terve in die reiterandi, quoties gravia mala, & cumprimis *anxietates* aut *dolores hypochondriorum* id urgeant. Verum *non sint nimis acres*, sed ut dictum, *emollientes potissimum ac demulcentes*.

XXII.

Quando
materia
morbi co-
pus p:it.

Quando *impetus humorum vitiosorum versus caput ferri videtur*, id quod ex capitis dolore, rubore faciei, mentisque alies natione, &c. intelligitur, pedes calidis fovendi, superiores vero partes frigidiores & parum tectæ servandæ sunt, atque ab omnibus calefacientibus ac sudoriferis abstinendum. *Rivierus* tunc quoque industria sæpe mutare jubet *s(a)* quod vero vix suaderem. *Vesicatoria* præterea *suris*, & *rubefacientia*; ut fermentum cum sale & sinapi contuso, atque aceto, plantis pedum calide imponantur, ut sic vehementius a capite revellant. Quem in scopum etiam, præsertim quia *vesicatoria* tardius agunt, *clysmatibus* quoque ex decoct. prunor. cum foliis fennæ, nitro imprægnatis, revulsio a capite procurari debet, eaque ratione sæpe quidam, qui jam desperati videntur, præter spem adhuc restituuntur.

XXIII.

Quid in
singultu
facien-
dum.

Eadem fere ratione est procedendum, si *singultus* incidat; aut si his non cedat, *sal anglicanum Epsamense* est propinandum, vel sicut *Duretus* & *Baglivius* sæpius cum successu fecerunt, *Hiera picra*. *Potus Coffea* etiam in singultu sanando singulari pollet virtute, enimque hic jam pro secreto commendavit BAGLIVIVS. Quando *singultus ab inflammatione ventriculi*, camphoræ gr. ij. vel tria pulveribus antispasmodicis misceri, & Spir. V. camphor. ventriculo extus imponi, cum fructu possunt.

XXIV.

Quid de
S. S. sen-
tiendum.

Sanguis missio, quam SYDENHAMUS fere promiscue in febribus commendat, apud nos raro & nonnisi in valde plethoricis, aut qui vini copiosioris potu dediti sunt, prodest, & qui-

quidem tantum in principio: quando vero rationes eam instituendi adfunt, prius clysmate leni alvus evacuetur, & si ab hoc dolores hypochondriorum & præcordiorum anxietates mitigantur, ab illa abstineri potest; quando autem illa mala redeunt, clyσμα quoque, quoties id accidit, iterandum (a). Sed si ab adhibito clysmate non mitigantur, ad avertendam inflammationem mox in principio sanguis e venis educatur. Si enim hoc demum tertio aut quarto die fit, plerumque magis nocet, quam prodest.

XXV.

Quando natura ipsa in his febribus alvi fluxum facit, tunc & ab evacuantibus internis & clysteribus abstinendum, atque solis fere aqueis tepidis, diluentibus ac lubricantibus supra indicatis, ac potionibus satis largiter haustis, ea juvanda est. His terrea, nitro adjecto, interponenda, ad acrimoniam noxiorum humorum imbibendam & infringendam, atque inflammationes simul præcavendas. Interea tamen Tinctura rhabarbari quandoque etiam cum fructu cochleare interponitur.

Quid faciendum ubi diarrhoea.

XXVI.

Quod si vero natura fluxus alvi nimis vehementes & colligatos concitat, ita ut vires ægri valde prosterantur, extrema frigida reddantur, aliaque prava symptomata inde subsequantur, ægro diaſcordii ℥j. ex aqua cinamomi sine vino vel cydoniatæ ℥iſſ. exhibenda, quod vires non solum roborat & fluxum moderatur, sed & simul blandum somnum conciliat. Sed si alvus inde nondum conquiescat, iterata vice post aliquod tempus exhibitum raro spem Medici destituet, quemadmodum præter nostram experientiam, & SYDENHAM & BURCHARD. p. 29. sancte etiam id confirmant.

Si alvi fluxus nimis.

XXVII.

In anxietatibus præcordiorum & doloribus ventriculi atque hypochondriorum evacuantia, præsertim rhabarbarina §. XIX. laudata dari, atque Clysteres leniter evacuantes §. XXI. sæpius injici debent: ut sic materia noxia a superioribus evacuetur & per inferiora educatur.

Ubi anxietas & ventriculi dolores.

XXVIII.

Videtur ratio in his febribus, quia non sunt summe acutæ, non sit nimis tenuis, præsertim postquam jam aliquot dies præterierunt. Nam quia ad secundam, tertiam, quartam aut quintam etiam hebdomadem sæpius extenduntur & nunquam in lentas tabificas terminantur, in tempore sufficienter ci-

Videtur ratio.

E

ter ci-

[a] Hoc notabili exemplo illustrat & comprobat laud. Burchard. in Diss. cit. p. 26.

ter cibis idoneis levibus sunt reficiendi, præsertim si cibi fastidium abest, ut ad finem usque morbi perdurare possint. Interea tamen in principio multum cibi non requirunt, sed fracto aliqua ratione impetu, quando scilicet cibos non amplius averfantur; nam invitis *cibus non est obstruendus*; at tamen tunc, quando fastidium præterit, offerendus, isque non sit adstringens aut difficilis digestionis, sed levis atque mollis. Et quamprimum solida etiam alimenta rursus appetunt & assumunt, in pastu quoque *haustulus vini generosi ipsis non est denegandus*; sed potius pro digestionem juvanda ægrisque rursus roborandis, commendandus.

XXIX.

Alius curandi modus per emeticum.

Superest denique ut & alium adhuc modum humores noxios & malignos ejusmodi in febribus & imprimis in petechialibus & congeneribus evacuandi, adhuc proponamus, quem haud pridem doctissimus D. WAGNERUS, Helmstadiensis, discipulus quondam noster per multos annos diligentissimus, nunc amicus carissimus atque Medicus Lubecensis celeberrimus, quique ob usum Rad. scillæ in asthmaticis morbis, aliaque scripta egregia jam satis clarus est: qui consistit in *matura, eaque subinde repetita*, ubi opus est, vomitus excitatione, & quidem non antimoniatum, sed radice hyepacocumne, quam methodum etiam ad malignas atque exanthematicas alias, cujuscumque generis, ne ipsa quidem puerperarum & puerilis ætatis purpura cum febris mali moris excepta, summo cum successu & quam frequentissime feliciter se adhibuisse, in litteris haud pridem ad me datis, asseverat, ita ut nulla alia hos morbos curandi via adhuc sit nota, quæ cum hac ipsa ratione felici successus possit comparari; qui tamen modus hucusque a multis contemptus, immo valde noxius proclamatus est.

XXX.

A quibus jam laudatus.

Meminit quidem Riverium, Ettmullerum, Scretam, Apinum, Spiesiumque nostrum, immo & Stahlum in dissert. de febris petechiali & congeneribus, aliosque vomitoria subinde commendasse; verum ea tam angustis limitibus inclusisse & tot cautionibus ac limitationibus restrinxisse, ut vix Medici jam satis experti, multo minus juniores aut tyrones certi inde esse potuerint, ubi vel iis utendum, vel ubi ab iis abstinendum, præsertim cum ea vitanda plerumque docuerint, ubi quam maxime utilia ac salutaria hæc ipsa deprehenderit.

XXXI.

Ego diu jam emeticum adhibui.

Ego quoque emeticis semper in febribus acutis usus jam sum ab eo tempore, quo ut Medicus castra fœderatorum in Belgio Anno 1707. & sequentibus secutus sum, eaque non solum & postea, ubi vomitum indicantia aderant signa, etiam in ipsis

ipsis puerperis adhibui, atque illa quoque adhibenda esse his in casibus in prælectionibus meis practicis auditoribus meis semper suasi. Interea tamen hoc in argumento ulterius progressus est prælaudatus meus *Wagnerus*, qui summa jam cum laude ac gloria per plures annos medicinam Lubecensibus facit.

XXXII.

Modus vero ejus malignas febres curandi primum, præsertim cum Lubecæ militum ultra centum fere simul febre & petechiali & petechizante correpti decumberent, consistebat potissimum in *matura vomitorii sufficientis portione exhibenda*, nec non interdum apud *plethoricos venæ sectionem* insituyendo, administrato deinceps regimine antiphlogistico ac diapnoico per pulveres absorbentes nitrosos & similia remedia; qua ratione plerique ægri curati sunt; postea vero his indutus exemplis alium eumque adhuc *meliozem modum excogitavit, qui in sequentibus consistit*. Nimirum sumpsit Rad. *Hypocacoannæ* pro ægrorum diversitate \mathfrak{D} vel $\mathfrak{Z}\mathfrak{ss}$. cum arcano duplicato probe tritz, eique addidit aquæ cujusdam destillatæ, v. g. Card. bened. aut similis $\mathfrak{Z}\mathfrak{iij}$. vel \mathfrak{iv} . Hujus mixturæ, quavis hora dimidia vel integra cochleare unum alterumve (interponendo subinde mixturam temperantem) donec effectus *hypocacoannæ* sequatur, exhibet; postea mixtura quadam temperante diapnoico diuretica continuat. Sed si posthac intra horas circiter XII. mala graviora, ut vertigo, lipothymia & faucium mala, non valde remiserint; atque pulsus ac respiratio non sint liberiores, cum primis vero respiratio (utpote cujus difficultas merito in petechialibus & congeneribus pro pathognomico signo præcipuo mali moris jure habetur) prædictam potiunculam emeticam repetit, eamque toties pro re nata, exhibet, donec mox laudata indicia in melius conversum morbum demonstrent, neque prius ab usu *hypocacoannæ*, aliquot minimum grana mixturis morbo congruis addendo, abstinere, donec signa malignitatis (nam egregium simul est alexipharmacum) omnino sint sublata, & morbus mali moris in benignum conversus; id quod sæpe, si modo non nimis tarde Medicus advocatus fuerit, intra bidduum obtineri solet. Immo si etiam quarto die & quandoque tardius advocatus fuerit, atque res jam quasi conclamata visa est, tamen hac curandi via quamplurimos, ut retulit, adhuc servavit, qui antea neque *Stabliana*, neque *Hoffmanniana* methodo, (quæ optimæ tamen hodie habentur) summa licet cura adhibitis, servari potuerunt.

XXXIII.

Atque sic quoque egit, sive pauca siue multa exanthemata adfuerint: quia conversio morbi maligni per hanc methodum gradum.

Ubi magnusculus est hic modus.

In exanthematis eodem modo a.

in benignum, caput rei est, ubi istiusmodi symptomata nos a recto hoc tramite abducere non debent. Interea tamen, pro re nata, interdum etiam Vena sectionem, laxantia, clysmata & vesicatoria simul adhibet; quibus vero, si ab initio illa per hyppecacoannam curandi ratio rite in usum vocatur, raro, ut asseverat, opus esset, atque sic hoc modo ab eo tempore fere omnes servauit.

XXXIV.

Exanthematicos morbos mesentericos esse.

Febris denique etiam exanthematicas, purpuram, petechiales & congeneres pro morbis mesentericis sive stomacicis WAGNERUS noster habet, in quibus sanandis, praesertim si grauiore, frustra laborari existimat; nisi ipsarum causa in primis viis haerens atque velociter saepius sese per sanguinem & totum corpus extendens, mature auferatur, ac praedicta ratione e corpore eliminetur: id quod peculiari libro uberius exponere atque evincere fidem mihi dedit, quod, cum erudicio, diligentia & vis iudicandi ejus mihi bene sint perspecta, magnae generis humani utilitati cessurum esse certus confido.

CAPUT VI.

De Febris lentis, & hecticis.

I.

Quid sint.

Febris lentas continuas eas esse febres, quae calore naturali majore & pulsu celeriore per plures hebdomades, menses, immo annos perdurant, supra Cap. II. N. VI. diximus, atque graeco vocabulo *chronica*, saepius tamen quoque lentae aut *hecticae* appellantur, praesertim si labes visceris cuiusdam, & cumprimis ulcus aut scirrhus in pulmone, hepate, liene, mesenterio aliove viscere simul adsunt.

II.

Diagnos.

Signa diagnostica ex definitione patent; quibus adhuc illud, praesertim in ita dictis hecticis accedit, quod aegri aliquot horas post pastum praedicta symptomata paullo vehementius & nova quasi accessione sentiant, cum rubore genarum, sanis sanguineis fere simili, cum ante pastum pallidi esse soleant; & corpus simul sensim contabescat, viresque valde minuantur.

III.

Causa proxima.

Causae febrium lentarum & hecticarum sunt variae, tam remotae, quam proximae. Haec ut plurimum sunt 1. *Obstructiones* quorundam viscerum, ut pulmonis, hepatis, lienis, pancreatis, glandularum, mesenterii, &c. vel 2. *abscessus* cum

cum in partibus externis, tum internis; vel 3. *emulcerationes* quorundam viscerum aut partium, & imprimis pulmonum vel pleuræ, ut in phthisi & emphyemate, vel in renibus, vesica, utero, &c. 4. *peculiaris acrimonia sanguinis* fervida, febriculam perpetuam lentam, & corpus depalcentem efficiens.

IV.

Causse antecedentes & remotæ sunt sæpius febres tam continuæ quam intermittentes, & cumprimis male curatæ; præsertim per adstringentia, materia morbi nondum satis digesta, correctæ, aut evacuata, quibus fit, ut humores viscosi, crassi, pituitosi, serosi hinc inde cogantur, quiescant, hæreant, atque sic *obstructiones* partium, præsertim nobiliorum, febrium harum causas præcipuas, unde cor, dum reliquus sanguis libere has partes transire nequit, ad frequentiores contractiones sive motus concitatur, producant. 2. In aliis eisque magis sanguineis stases hæ humorum sive sanguinis ad *abscessum* vergunt, dum in purredinem & pus fatiscunt, atque hujus irritatione febriculas ejusmodi faciunt. 3. Quotiescumque *ulcera* sunt in visceribus, ex similibus fere causis, febres lentæ & hecticæ inducuntur. 4. Quando autem ab *acrimonia peculiari, fervida, irritante*, ac *depalcente* proveniunt, hæc hominibus quandoque a parentibus aut nutricibus impuris, hecticisve conata est, quandoque tamen a *prava dieta*, potu, cumprimis vini, spiritus vini, aliorumque calidiorum potionum, aut ciborum, præsertim aromaticorum aut salforum largiori & frequentiori usu, ortum trahit, vel etiam a *nimia libidine* & excessu in venere, quo sanguis vehementius incalcescit, nimisque acris & fervidus redditur, quo febricula continua lenta excitatur, & corpus consumitur, cumprimis si illi homines simul, ut sæpe fit, prædictos errores in cibo & potione simul committunt, aut, etiam medicamentis calefacientibus & yenerem eximulantibus abutuntur, aut forte etiam *iracundie* dediti sunt, quibus tanta acrimonia in corpore produci potest, ut hecticæ sive lentas ejusmodi febres sæpius inducat, quas ultimas, (quando nimirum a venere nimia proveniunt) nonnullis *sabem dorsalem* appellare solent; quia in dorso sive lumbis simul dolores & insignem debilitatem sentiunt.

V.

Omnes febres lentæ & heclicæ non sunt sine periculo, præsertim si jam diu durarunt, corpus & vires ægri jam nimis consumserunt, sudores colliquativos, aliaque jam gravia mala induxerunt; præ omnibus tamen ex magnum sovent periculum, quæ scirrhum vel ulcus quoddam grave in viscere quodam nobiliori, præsertim in pulmonibus, conjunctum habent. Si vero adhuc sunt *recentes*, aut alias adhuc levio-

Remota.

Prognosis.

ribus malis comitatæ, si vires adhuc satis constantes, viscera satis sana & integra, vel saltem non nimium corrupta, de illarum curatione non est desperandum, si Medicus & æger simul bene suum faciunt officium. In hæmorrhagiis adstringentia, præsertim præmature adhibita, vitanda, aut si necessitas ea exigat, caute & cum potu satis copioso aquoso sunt exhibendæ, alias facile hæcticam producunt. Juniores homines hæcticæ febres citius jugulant, quam seniores.

V I.

*Curatio si
ab obstru-
ctione .i.*

In curatione ad causas semper probe est respiciendum, & secundum has curatio prudenter est instituenda. Adeoque si congestiones sive obstructions sunt in visceribus aut glandulis, (N. III. hæc, quia a viscido oriuntur, diluentibus, incidentibus ac blandis diaphoreticis sunt digerendæ ac resolvendæ, ut infusus vegetabilium e radicibus vel herbis, vel utrisque simul, ut rad. chinæ, schorzoneræ, cichorei, taraxaci; herb. tussilaginis, scabiosæ, veronicæ, pulmonariæ, chærophylli, &c. ad modum Theæ, bis terve in die ad ℥viij. x. vel xij. usurpatis, itemque, essentia quadam diaphoretica leniori, ut cort. aurant. scordii, helenii, card. bened. pimpinellæ, bis terve in die, ex vehiculo tali aqueo præsertim calido exhibita; vel & loco essentiarum, liquore terræ foliatæ tartari, qui egregie hic prodest, ex simili vehiculo, interpositis circa vespertam bis pulvere quadam temperante & incidente, ex lap. cancror. vel conchis acido citri vel aceto vini aut destillato probe imprægnatis, ac tartaro vitriolato, quibus, ubi æstus major, aliquid nitri commodè additur: & subinde pilule balsamica amara apte interponuntur. Multis ex his etiam prodens usus aquarum medicatarum cum apto regimine egregie prodest, de quibus §. X. præta.

V I I.

Regimen. His adjungenda frequens corporis exercitatio; & imprimis equitatio, potus sufficiens tenuis, aquosus: ut præter infusa illa e vegetabilibus digerentibus, radicibus vel herbis parata, aqua simplex vel ptisanæ apta; victus tenuis, facilis digestionis, modice nutriens: ut omnis generis bona juscula, gelatinæ, emulsionès, fructus horæi cocti, pulles tenues, aliæ lacticinia tenuia; vitando crassa, viscida, tenacia, difficulter digerenda, interponendo subinde roborandi causa haustulum vini generosi, vel dulcis, præsertim si calor p. n. notabilis abest. Sed si calor p. n. & sitis vehemens adsunt, Tinctura flor. papaver. vel rosarum vel alia hujus generis, vel phlegma vitrioli potui commodè instillari possunt.

V I I I.

VIII.

Quod si obstructions hæ post febres intermittentes, a saburra viscida non rite evacuata & subacta sint ortæ, prædictis adhuc penetrantiora amara, resolventia atque blande evacuantia sunt subiungenda, aut interponenda; ut pilulæ ex extract. absinth. card. bened. centaur. min. gentianæ, gumm. ammoniac. galban. myrrha & aloe, vel Becherianæ, aliæve his similes, quarum gr. xv. vel xx. semel aut bis in die exhibendæ, quibus ipsius febris male suppressa sæpe revocatur, quæ postea digerentibus amaris, salinis aliisque idoneis febrifugis rite curanda, ac denique stomachicis, roborantibus sive tonicis, martialibus, immo ipsis aquis medicatis martialibus, legitime usurpatis, noxii humores reliqui sunt corrigendi & evacuandi, ac tonus viscerum restituendus.

Si post intermittentes febres.

Iisdem in casibus si principio indicia saburra biliosa in primis viis adsint, egregie conducit lenis vomitus, vel saltem lenia purgantia; sed si plethora, aut consuetæ sanguinis excretionis suppressa adsint, detractio sanguinis; si utrumque peccat, utraque etiam medela est adhibenda; venæ sectio tamen, si utraque opus, emetico est præmittenda.

IX.

Si abscessus, præsertim externi, in causa sunt, studendum, ut hi, simulac fieri potest, aperiantur, purgentur & rursus glutinentur, alias remedia interna nihil proficiunt; interea tamen, donec abscessus aptus reddatur ad aperiendum temperantia aliquod levamen dare queunt. Sed si exulcerationes viscerum febrem lentam & heclicam continuant tunc, ut ulcus pulmonis sive phthisis, de qua infra; curari debent, & solum hic monemus, quod vomitoria & purgantia hic sunt vitanda, aut lenissima saltem, si forte iis opus, ex tamariindis, rhabbarbo, vel manna porrigenda.

Si abscessus in culpa.

X.

Sed si acrimonia sanguinis in culpa, hæc temperanda, diluenda, ac demulcenda, pulveribus illis temperantibus, supra N. 6. laudatis, & infusis aut decoctis vegetabilium, acrimonia carentium, §. VII. ad Thez similitudinem, vel per se, vel paucò lacte adjecto, itemque emulsionibus, gelatinis sero lactis, vel lacte ebutytrato, & quam maxime etiam aquis medicatis selserensibus, cum vel sine lacte, & cum primis caprillo vel asinino temperatis, quibus plures, immo & ipsos infantes sex, septem, octo, decem

Si sanguinis acrimonia.

annorum ex Orci quasi faucibus eripui. (a) Nonnulli curatione sive *dieta lactea* curantur, quando nimirum per aliquot hebdomades non nisi lacte, pauxillo saccharo adjecto, vescuntur, aut lacte, loco cibi & potus, utuntur, vel simul, si lubet, paucis pane triticeo, vel pultribus ex amylo, oryza, vel amygdalis paratis. Huc etiam referri potest decantata *cura avenacea Lorryi*, quando decoctum paratur ex avena, radice cichorei cum pauxillo nitri, & quotidie certa copia cum apta *dieta* bibitur, de qua uberius legi meretur Frid. Hoffmanni Diss. de *Cura avenacea*. Quandoque, imprimis si *alvus obstructa*, aliave sunt indicantia, *lenia laxantia*, ut rhabbarum, vel tamarindi, cum foliis sennæ & manna exhibenda, atque *dieta* eadem servetur, quæ modo commendata est.

XI.

Quando
caussa
venerea.

Quando *febris hectica a nimia venere aut gonorrhæa* ortum traxit, præter modo dicta, aut quando hæc parum sunt, *aque selterenses* cum lacte, vel ipsa *cura lactea*, quam vocant, purgatis prius primis viis, egregie profunt. Quando autem post *salivationem male institutam* orta sit, decocta radicum & lignorum antivenereorum cum Tinctura antimonii, ad reliquias venereas penitus extirpandas, egregie conveniunt: quibus vero aptissime lac admisceri potest, si ægri ab eo non abhorrent. His quoque parca *mercurii dulcis* dosis magno cum fructu subinde & potissimum vespere interponitur. Quod si vero reliquæ illæ ablatae & extinctæ sunt, *aque selterenses* alizve temperatiores cum lacte; vel etiam ipsa *lactea cura & dieta* (N. X.) ad vires & carnes ægris restituendas quam maxime valent.

XII.

Si a scabie
repulsa.

Si a *scabie retropulsa* per unguenta quæcumque intempestive adhibita, materia acris vitiosa per decocta radicum herbarum & lignorum diaphoreticorum, scabiei & morbis venereis alias dicatorum, una cum Essentiis diaphoreticis, præsertim fumariz, helenii aut lignorum, interpositis pulveribus ex antimon. diaphor. adjecto paucis sulphure & mercurio dulci, accedente regimine diaphoretico, partim expellenda, partim corrigenda; postea ea sunt facienda, quæ §. X. & XI. diximus.

XIII.

Si ab ira
vel marore.

Febris lenta aut hectica si ab ira producta est, præmissis salibus digerentibus, vomitus ad bilem noxiam evacuandam, præsertim ubi sapore amaro in ore se prodit, optime prodest, aut

(a) Conf. Fr. Hoffmanni Dissert. de aquarum selterensium usu cum lacte.

aut saltem hujus loco , si quid forte vomitum vetet , evacuans aptum ex rhabbarbo : postea temperantes pulveres , infusa vegetabilium apertientium , liquor terræ foliatæ tartari , cura feri lactis vel lactis eburyrati , immo & ipsæ aquæ selterenses optime conveniunt .

Si a *māiore ac tristitia* ortum ducat , eadem , omisso saltem emetico , optime conveniunt : in utroque tamen casu *cortex peruvianus* quoque magnas exerit vires , si prudenter adhibetur .

XIV.

Quandoque hæc febres etiam ab *inebriantibus* & cumprimis ex vini & spiritus vini *abusu* generantur ; rursus feri lactis & eburyrati usus est egregius , si satis diu & cum legitima victus ratione continuetur . Ita & *aque medicatæ blandiores* , præsertim selterenses , cum vel sine lacte tenui , per aliquot hebdomades haustæ , hic præstantissimæ sunt . *Pisana* & *decoctum avenæ* , cum nitro paratum (cura vulgo *avenacea* dicta) magnæ quoque hic utilitatis .

XV.

Quod si a *sanguinis fluxibus naturalibus* aut saltem salutaribus *suppressis* oriuntur , potus tenuis , attenuans , & medicinalia temperantia diaphnoica conveniunt , quæ vero si non sufficiant , *vena sectiones* justo tempore & loco sunt adhibendæ , & fluxus illi propriis suis remediis sunt restituendi : ubi quoque aquæ medicatæ & præsertim martiales , multum boni præstant . Ita & *vena sectio* in ejusmodi casibus præservando valde prodest , si per intervalla idonea instituitur .

XVI.

Variole male curatæ , vel & ex , quæ per se fuerunt graviores , etiam sæpe febres ejusmodi post se relinquunt : quo in casu , lenia , sed sæpius *repetita laxantia* , ex mercurio dulci præsertim præparata , una cum usu *feri lactis* , necessaria sunt ad reliquias earum valde acres & rodentes sensim evacuandas & corrigendas : quibus vero interponenda temperantia , diaphoretica varia , & imprimis quoque infusa pectoralia cum essentiis similibus , aut *aque selterenses* , vel etiam his omnibus frustra adhibitis , in his aliisve variis febribus hēcticis *corticem peruvianum* mature aliquoties in die exhibui , eoque paucorum quandoque dierum intervallo febres has fugavi , ciborum desiderio & viribus brevi restitutis .

XVII.

Postquam in omnibus hisce casibus ad eum redierunt statum , ut ambulare aut foras prodire rursus queant , præcedentibus adhibenda roborantia , ut vina dulcia in pastu modice sumta , nisi calor vehementior id prohibeat , victus blande nutriendi .

triens & facilis digestionis, sed parvus aut modicus, Ess. cort. aurant. citri, corticis cascarillæ, Mixtura tonica, immo & usus frequens lactis ebutyrati, si æger illud non averfatur; cum blando, sed *frequenti motu* aut exercitatione corporis; cumptimis *equitatione* aut iterata sæpius *vectione* in rheda si ve curru.

XVIII.

*Sympt.
maum
medela.*

Si *tussis* in his febribus vehementius ægros affligit, præter infusa pectoralia & Elixir. pectorale Wedelii cum parte octava Laud. liquid. Sydenh. remixtum, linctusque ex oleo amygdalarum dulcium & syrupo papaver. conducit; sed noctu cum pulveribus temperantibus, mp. de cynoglossa, vel quam præstantiorem adhuc deprehendi, mp. de Stryace gr. j. ad ij. iij. danda.

Æstus nimius sub exacerbatione temperatur succo citri; phlegmate vitrioli, vel clyffo antimonii potui instillatis, itemque feri lactis vel lactis ebutyrati potu; ut & absorbentibus citratis cum nitro ante accessionem datis.

Sudores nimii, quos *colliquativos* hic vocare solent, non vi suppressendi; sed frigore moderato, terra sigillata; coralliis rubris, spec. de hyacinth. cum paucis nitro, cascarilla & opii granulo, interposito usu feri lactis, vel lactis ebutyrati, moderandi: quibus ipsis etiam, itemque *emulsionibus*, & gummi arabico, *Diarrhœa* ipsorum, quæ sæpe periculosa, ut & lacte chalybeato, pultibus, & conservis rosarum, prudenter est refrænanda: cui scopo etiam diascordii ʒi. ex aqua menthæ vel cinamomi sine vino, vel cinamomi cydoniata, egregio haud raro satisfacit.

Appetitus prostratus excitatur hic amaris, ut Essentia cortic. aurantium, cardui benedicti, vel absinthii, cum parte. Ess. cort. cascarillæ vel corticis peruviani remixtæ; vel *Extractis amaris* in aqua stomachica vel vino malvat. solutis, & aliquoties in die exhibitis: quibus & spiritus salis, vel nitri vel vitrioli dulcis pars fere quarta commode addi potest ad cibi desiderium tanto melius excitandum.

CAPUT VII.

De inflammationibus.

I.

*Transitus
ad inflam-
mationes.*

Quibus febres continuæ, acutæ, cognitæ sunt, si facile etiam in inflammationum cognitionem atque curationem pervenire possunt; quoniam in ambabus motus acceleratus cordis, pulsus, & sanguinis una cum calore p. n. percipitur;

pitur; præsertim in inflammationibus gravioribus, sive majoribus; ubi semper pulsus celer, calor præter naturam, aliaque varia febris acutæ symptomata adesse solent; vulgare enim est dictum: *quod febris est in toto, at inflammatio in certa quadam parte*; febresque acutæ sunt fere inflammationes universales.

II.

Idea vero inflammationis consistit in congestione, atque majori minorive stagnatione sanguinis, in certa quadam parte; qua fit, ut sanguis, dum per multa vasa sanguifera obstructa transire nequit, & in motu suo impeditur, reliquus per vasa libera vi & pressione cordis irritati, tanto celerius fluere cogatur: quo ipso, (exemplo machinarum hydraulicarum) motus sanguinis necessario acceleratur, atque æstus ceteraque symptomata inducuntur. A sanguine vero in parte afflicta congesto & stagnante fit, ut in omni notabili & visui exposita inflammatione in loco læso *tumor, rubor, dolor, calor*, & plerumque etiam *splendor*, tamquam *signa inflammationum pathognomica* observentur; quæ vero phenomena ex prædictis facile intelligi possunt, maxime si ad illud attendatur, quod in inflammationibus plus affluat per arterias, quam per venas refluxere possit, sicuti etiam in chirurgiæ nostræ Institut. docuimus.

III.

Varie admodum dantur inflammationum differentia: & generatim *dividuntur in externas & internas*, quarum quælibet pro diversitate partis affectæ & gradus alia atque alia producant symptomata. Inter externas *Erysipelas* dicitur, quando inflammatio insignis adest in cute, late se extendens; quæ pro partis varietate erysipelas faciei, colli, dorfi, manus, brachii, scapulæ, tibiz, aut pedis appellari solet. *Phlegmone*, si inflammatio major partes cuti subiectas, præsertim pinguedinem simul occupat, estque gradus major inflammationis, quam erysipelas. *Furunculi* dicuntur inflammationes minores in cute & pinguedine substrata, quorum minimi sunt *vari faciei*, quibus *gutta rosacea* in facie valde affinis est.

Ex his jam facile, quid sint inflammationes sive tumores inflammatorii *tonsillarum, uvulæ, parotidum, mammarum, glandularum axillarum & inguinalium*, (qui *bubones* dici solent,) *testium*, aliarumque partium externarum intelligi potest. Ita *ophthalmia* dicitur, si oculus; *odontalgia*, si dentis radices; *otalgia*, si meatus auditorius inflammatione laborant.

IV.

Internum.

INFLAMMATIONUM INTERNARUM ea, quæ cerebrum ejusve meninges occupat, *Pbrenitis* appellatur; a qua vehemens dolor capitis, febris vehemens, rubor plerumque ingens faciei & oculorum, ac tandem delirium inducuntur. In *Angina* fauces & potissimum larynx inflammatus est, unde respiratio difficilis, suffocatoria, cum deglutitionis impedimento producitur. *Pleuritis* in pleuræ & plerumque simul partis vicinæ pulmonis inflammatione consistit, conjunctumque habet *dolorem vehementem lateris puncturium*, pulsum durum, respirationem difficilem ac dolorificam, & tussim molestissimam, sæpe sanguinolentam. Si pulmo totus vel magnus ejus lobus inflammatione laborat, malum *Peripneumonia* nuncupatur: in qua respiratio valde anxiosa, pulsus mollis & celer. Si renes, *Nephritis*; si hepar, *Hepatitis*; si diaphragma, *Parapbrenitis*; si aliæ partes internæ, ut *ventriculus*, *lien*, *intestina*, *vesica urinaria*, *uterus*, aut *cor inflammata sunt*, inflammatio nomen a parte affecta adipiscitur; ut *inflammatio ventriculi*, *lienis*, *intestinarum* &c. hæque omnes ex ardore & dolore, majore minorive, in regione partis affectæ, febrique acuta præsentem cognosci & distinguere solent ac debent.

V.

Causa. Causa proxima inflammationum est stagnatio sanguinis in certa quadam corporis parte; hujus vero *causæ antecedens* est vel abundantia sanguinis, sive *plethora*, vel *sanguis nimis viscidus*, vel utrumque simul. *Causæ vero procatharticae* sive *occasionales* sunt, vel externæ vel internæ; ut contusiones, luxationes, fracturæ, vulnera, ligaturæ fortiores, potus frigidus vel aliud frigus, præsertim calente corpore admissum, excessus in vino, spiritu vini, aliisque potibus spirituosis, exercitatio corporis sive motus nimis aut nimis vehemens, aliique dietæ errores.

V I.

Prognosis. Quælibet inflammatio quadruplici modo finiri potest: nam stagnatio 1. vel *resolvitur*, & pars affecta pristinae integritati hac ipsa restituitur; & hinc resolutio est omnium optimus finis & optima ejus curatio, vel 2. si non resolvitur aut resolvi nequit, in *suppurationem* sive *abscessum* abit; quo in statu stagnans materia corrumpitur ac putrescit, una cum vasculis, in quibus hæret, hisque vicinis, quæ ambo in materiam putridam plus minusve acrem aut fetidam abeunt, quam *pus* appellant: vel 3. in *Gangrenam*, quando dolor & ardor sit vehementissimus, color, si pars affecta visui exposita est, rubicundissimus, intermixtis striis livescentibus aut nigricantibus, & vesiculis in parte affecta, cuticula a

cute recedente oriundis, sero sive ichore repletis; quæ signa summum inflammationis, facile in corruptionem sive putredinem aut sphacelum abituræ gradum indicant; ita, ut *gangræna sit summus inflammationis gradus*. Quando vero, prægressis his gangrænæ symptomatibus, dolor & ardor in parte affecta subito remittunt, sive prorsus cessant, eaque pallida, livida, vel nigra, frigida, insensibilis, fœtida, cadaverosa, flaccida & mollis, evadit, cuticula a cute recedente, vel etiam nigra, sicca sive arida quandoque, tunc *sphacelus* appellatur, quo perfectam partis corruptionem, putredinem, sive mortem Medici intelligunt, quæ sine ablatione corrupti non curatur. Vel 4. pars inflammata, præsertim glandulosa, ut mammæ, glandulæ, salivales, parotides, tonsillæ, axillares, inguinales &c. in *Scirrbum* sive tumorem durum & indolentem abit: qui tamen sæpe, præsertim in manibus, successu temporis malignam putredinem concipit, & morborum fere pessimum, *cancrum* sive rectius *carcinoma* producit.

VII.

Ceterum quo vehementiores initio sunt inflammationes, *Continua-
tio pro-
gnosis.* eo difficilius resolvuntur, & hinc eo periculosiores; quia facile vel in suppurationem vel in gangrænâ & sphacelum abeunt; *suppurationes* vero & quidem externæ, in partibus pinguibus & carnosis contingentes, corpore ceteroquin sano, ac pure bono, curato ut plurimum sunt facillimæ, in glandulosis vero partibus, aut corporibus mali habitus, aut senibus, longe difficilius sanantur, ac longe maiorem diligentiam & curam requirunt. *Inflammationes internarum partium omnes quidem sunt periculose*; differunt tamen secundum vehementiam inflammationis, & partis affectæ diversitatem sive nobilitatem: *renum enim fere securissima, & pulmonis quoque adhuc sæpe curantur*; reliquæ sunt periculosiores, hepatis vero periculosissima haberi solet.

Generatim tamen sciendum, *omnes inflammationes internas, nisi resolutione curentur, periculi plenissimas esse atque ut plurimum, mortem post se trahere*: nam si in suppurationem abeunt, pus commode evacuari, ulcusque recte purgari aut curari nequit, quia manibus accessus denegatur; hinc in tabem aut hecticam sive phthisin aut consumptionem corporis desinunt. Si in *gangrænâ & sphacelâ* abeunt, pars corrupta auferri nequit: hinc putrescendo mortem brevi inducit. Si in *scirrbum* transmutantur, *hectica* aut cachexiæ & *hydropes*, ut plurimum insanabiles sequuntur, vel omnino in *carcinoma* sive *cancrum* abeunt.

VIII.

VIII.

*Curatio
generalis.*

In *curatione* omnium inflammationum, quia ab obstru-
tione vasorum & impedito motu sanguinis oriuntur, eo præci-
pue annitendum est; ut *resolutio sanguinis hærentis obtinea-*
tur, ejus motus restituatur, atque in ordinem rursus rediga-
tur: quod obtinetur optime, 1. *eodem regimine iisdemque re-*
mediis diluentibus, temperantibus, resolventibus, ac diaphoreticis, quæ in febrium acutarum curatione, capite tertio, N. X. ad XII. commendavimus, non neglecta in malo gravi-
ori camphora vel in pulvere, vel in potinculis. 2. *Sanguinis missione*, primis præsertim diebus, in loco conveniente præcipue in parte opposita instituta; quæ ubi plethora vel æstus urget, *subinde semel iterumque reiteranda*, satisque lar-
ga semper sanguinis copia, pro virium & plethoræ ratione, educenda, ut sic sanguinis impetus & affluxus copiosior in partem affectam avocetur: amplior congestio prohibeatur, & jam facta imminuatur: quæ *sanguinis missio*, præsertim in vehementioribus, & internis inflammationibus, consen-
tientibus optimis Medicis, tuto aut *salva conscientia amitti* non potest. In *Erysipelate* tamen minore aliisque *levioribus inflammationibus*, iisque præsertim externis, ea *sæpe opus non est*.

IX.

*Exter-
narum re-
solutio.*

In *inflammationibus externis* præter hæc, medicamenta quoque resolventia adhibenda sunt externa: ubi in frequen-
tissimo mihi est usu aqua calcis vivæ cum spiritus vini cam-
phorati parte quarta roborata, addito subinde pauco sale am-
moniaco, vel lapide medicamentoso Crollij, calide cum
spleniis crassis sæpe imposita; vel & spiritus vini solus, aut
sale ammoniaco & pauca camphora imprægnatus; vel radic.
bryon. trid. flor. sigill. Salomon. herba absinth. scord. abro-
tan. sabin. serpil. origan. majoran. salviæ, flor. chamomill.
melilot. sambuci, sem. 4. carminat. &c. vel in pulvere sic-
co, sacculo incluso, vel in quibusdam inflammationibus,
vino vel aqua salsa decocta, rursusque expressa, vel & cum
spleniis parti affectæ calide sæpe imponenda, quæ potentissi-
me omnis quoque generis inflammationes resolvunt. Plura
externa in Institut. chirurgic. meis, cui lubet, videri pos-
sunt. In nonnullis externis inflammationibus, præsertim in
furunculis, bubonibus, inflammatione tonsillarum & mamma-
rum, &c. Emplastr. de sperm. ceti, diachylum simplex de
meliloto, itemque diaphoreticum Myns. addita præsertim
camphora, egregie quoque resolvunt. Speciatim vero in
erysipelate farina quædam calida, vel per se, vel cum ceru-
sa, creta, pulvere liquiritiæ paucaque camphora remixta,
exter-

externeque calide applicata, valde profunt, vel pulvis contra erysipelas Mynsichti, eodem modo usurpatus, aut & ipsa aqua calcis vivæ cum spiritus vini camphorati parte quarta remixta, ante jam laudata; licet multi omnia humida hic promiscue, sed male, rejiciant, benefacit. Aliâ hic convenientia medicamenta in Chirurgicis nostris Institut. Lib. de Tumoribus cap. 2. n. 14. videri possunt.

X.

Si vero resolutio tumoris inflammatorii obtineri nequit, quod *Suppuratio* cognoscitur, quando inflammatio ultra quartum diem augeatur, & dolor quotidie increfcit, ut plurimum suppuratio sequitur. Igitur a resolventibus abstinendum, & suppuratio contra est promovenda: id quod præstant, 1. omnis generis *medicamenta emollientia*, mucilaginosâ & pinguiâ. 2. Medicamenta, quæ præter particulas emollientes etiam *stimulantes* possident: quibus fit, ut acri eorum stimulo impetus sanguinis ad locum affectum invitetur, vasa obstructa hoc ipso tanto citius rumpantur, & in pus convertantur: talia sunt, præter cataplasmata in chirurgia nostra his in malis commendata, (a) vel vulgatissima, atamen quam efficacissima, domestica, vulgo dicta, remedia, nimirum *cepe sub cineribus assata*, vel *mel cum farina*, in cataplasma redactum, aut *mica panis triticeæ* similem in formam cum lacte cocta, admixto pauco butyro & croco, si lubet, calide sæpius applicata. Interdum loco horum, præsertim in minoribus inflammationibus, emplastra commodius applicare possumus; quo scopo *emplastrum diachylum cum gummis* sane præstantissimum est. Quibus medicamentis continuandum, donec maturatio facta; quæ ex mollitie partis, ruboris remissione & materiæ fluctuantis sub cute sensu, si digitis comprimatur, optime cognoscitur; vel etiam quandoque ex ipso pure sub cute vel cuticula jam apparente & visui sese manifestante.

XI.

Maturatione igitur facta *abscessus* (nisi hoc sponte jam factum sit, ut sæpe contingit) vel scalpello chirurgico, vel *abscessus aperien-* caustico *mature aperiendus* est, ne dolor justo diutius ægros vexet, aut pus partes subjectas erodat, aut corrumpat, & vel fistulam, vel cariem producat.

Abscessus vero apertus melle vel unguento digerente mundandus, & postea vel hoc ipso, vel apto balsamo quodam vulnerario, ut vulnus, sensim consolidandus.

XII.

[a] Lib. de Tumoribus cap. III. n. 6.

*Quid in
gangræna
facien-
dum.*

Quod si inflammatio neque resolvi, neque ad suppurationem deduci queat, sed in *gangrænam*, immo *sphacelum* abeat, nulla ratione hæc mala melius cohiberi possunt, quam si internæ *cortex peruvianus* frequenter & larga satis copia, sicut in febribus intermittentibus pertinacibus, continuatis, simul laudatis externis, ægto exhibeatur: hunc enim sicuti in his febribus, ita & in gangræna & sphacelo sistendis, *summum & specificum*, non solum Angli, qui hoc primum observarunt, sed & ego, præter alios præstantissimos Medicos & Chirurgos, aliquoties sum expertus: interea tamen non semper expectationi satisfacit. *Qua externe in hoc statu* immo & in sphacelo, scalpello & medicamentis sunt faciendæ, in Institut. chirurg. nostris, si libet, videri possunt. Si *inflammatio in scirrbum abeat*, quomodo malum sit curandum, infra, ubi de scirrhis, proponetur.

XIII.

*Quomodo
internæ
curanda
inflammationes.*

In inflammationibus vero internis summa ope niti decet, ne in suppurationem, multo minus in gangrænam abeant, quia utraque, sicuti supra jam dictum, ut plurimum lethifera est, sed *resolutioni* sive discussioni (qua sola hi ægri rite curari possunt) unico studendum. Quæ vero (ut jam in externarum curatione docuimus) optime obtinetur, 1. sanguinis missione sufficiente, mature instituta; & ubi symptomata exigunt, non raro repetita. 2. *potu largo aquosorum*, diluentium, resolventium & refrigerantium, in curatione febrium continuarum supra Cap. III. §. X. & seq. indicatorum, itemque 3. *medicamentis temperantibus* & diaphoreticis ex absorbentibus citratis, lapid. cancor. præsertim & conchis citratis, itemque antimonio diaphoretico & nitro, in forma pulveris, potiunculæ, essentiz, infusi vel decocti. 4. *temperato regimine*, ut in iisdem febribus indicatum est acutis. 5. *clysteribus*, emollientibus, nitrosis, præsertim ubi alvus est obstructa.

XIV.

De Phrenitide.

*Speciatim
phreniti-
cis.*

Speciatim vero in *phrenitide* his addenda sunt 1. *epithemata* fronti applicanda, & quidem *primo ex repellentibus*, ut, ex aceto rosaceo, vel lavendulæ in principio; deinde vero 2. *ex resolventibus*, ut ex spiritu vini camphorato crocato, calido in progressu; 3. *pulveres camphorati nitrosi*, Cap. III. §. 17. Postea etiam 4. ubi malum est vehemens, hirudines ad tempora & retro aures sunt adhibendæ; vel 5. venæ se-

ctio,

ſcio, præſertim in vena jugulari eſt iteranda; 6. *veſicatoria* ſuris & brachiis applicanda, fermentum panis cum aceto forti, pulvere ſeminis ſinapi, ſale nitro aliſque acribus mixtum, plantis pedum calide impoſitum. Denique etiam irritatio interna narium ad hæmorrhagiam excitandam, vel ipſa *ſcarificatio narium* magnæ quoque interdum hic poteſt eſſe utilitatis. Vid. Stahlus de ſcarificatione narium *Ægyptiaca*.

IX V.

De Ophthalmia.

OPHTHALMIA ſive oculorum inflammatio dividi primo poteſt in *leviorem*, *vehementiorem* & *vehementiſſimam* (quam *Chemofin* vocant) æque rurfus in *ſiccā* & *humidā*. *Sicca*, *levior*, *recens*, ſæpe aqua ſimplici frigida vel aqua roſarum ſola, vel collyrio modice refrigerante, ex aquis ophthalmicis v.gr. aqua roſarum, plantaginis, florum cyani, vel calcatrippæ, cum pauſillo ſacchari Saturni, vel totius vel lapidis calaminaris, ſi eis ſæpe laveretur, curatur.

Ophthalmia diſſerens, & levioris curatio.

Sed *humida* curatu difficiliſſima, immo ſæpe difficiliſſima eſt, præſertim inveterata, ut & in cachecticis, ſcorbuticis, contagio venereo, & glandulis induratis aut ſcrophulis infectis, aut annoſioribus, ubi ſæpe cæcitatem & ſpeciatim maculas oculorum ſive leucoma, pterygium, vel unguem, caliginem, cataractam, aut glaucoma, hypopyum, ſtaphyloma aut exulcerationem vel deſtructionem totius oculi producit. *Ophthalmia etiam eſt vel externa tantum*, vel quoque ſimul *interna*: hæc cognoscitur, quando ægri difficillime vel prorsus non lucem aſpicere poſſunt, & *longe periculoſior eſt ſola externa*.

In *curatione vero humidæ* revulſionis gratia idonea *purgantia* primum ſunt exhibenda, & ſubinde repetenda; deinde in ægris calidioribus *pulveres temperantes*, reſolventes, ſalini, nitroſi, *diluentia*, temperantia, & blande diaphoretica interna conducunt; in *ſeroſis* vero ſive *phlegmaticis* aut frigidis præcipue Eff. ſuccin. lignor. ligni ſaſſafr. Tinctura antimonii tartariſata & ſimilia reſolventia anticatarrhalia, cum *infuſis calidis aqueis vegetabilium* reſolventium, præſertim *herbæ euphraſiæ*, & *veronicæ*, cum ligno ſaſſafras aut ſaniculo, danda ſunt.

Curatio humidæ internæ.

XVII.

Externæ conducit collyrium ex aquis ophthalmicis diſtis, ut ex aqua euphraſiæ, ſceniculi, florum cyan. plantaginis, roſarum &c. quibus parum tutiæ PPtæ vel lapidis calaminaris PPti aut ſacchari ſaturni; aut lapidis medicamentofi Crollii, aut vitrioli albi admixtum ſit, quo oculi ſæpe la-

F

vandi

vandi & abstergendi, atque guttula una vel altera ei subinde iustillanda, inmo, & splenia eis imbuta, noctu præfertim, ipsi imponenda. Vel spiritus vini camphoratus simplex aut crocatus linteis complicatis & ad ignem leniter rursus exsiccatis, oculis inflammatis calide ac prudenter impositus, egregie sæpe conducit, qui & prædictis spleniis super imponi utiliter potest. *Lac croco largius imbutum*, si tepide sæpe oculis instillatur, præfertim infantibus, vel cum spleniis calide sæpe imponitur, quoque est egregium. Ita & *trochisc. alb. Ribaf.* ʒʒ. in aquar. ophthalmicar. ʒiv. soluti, valde profunt, si, ut de ceteris collyriis supra dictum est, usurpentur. In sanguineis, vel evacuationibus sanguinis naturalibus aut artificialibus consuetis, suppressis, etiam vena sectio, præsertim in malo graviore, primo in brachio vel pede, deinde in jugulari vena instituta, vel & scarificationes, eæque si opus, repetitæ, valde profunt.

XVIII.

Curatio
vehementis-
sima.

In vehementissima ophthalmia, quam Chemosin vocant, ubi adnata inflammata corneam suo tumore superat, aut supra corneam se elevat, sanguinis missio eaque larga, immo repetita est instituenda, & denique sectio venæ jugularis, præsertim si aliæ sanguinis detractiones jam præcesserunt, summe necessaria & utilis est: immo & ipsa scarificatio Hippocratica, a Woolhusio in usum rursus vocata, in palpebris & ipsa adnata subinde hic prodest. (a) At in serosis aut phlegmaticis præter purgantiâ, vésicatoria cervici, post aures, temporibus, pedibus, inter capulas, aut quandoque ipsi vertici adhibita, præsertim si satis magna sunt, multum sæpe præstant; vel horum loco fatina sinapi, vel seminis erucæ, sacculo inclusa, in vino cocta, & cervici calide applicata revellendo quandoque conducit. Corticis peruviani usus in his malis haud raro multum quoque præstat, præsertim si febris simul adest.

XIX.

Si ophthalmia a causa venerea.

Quandoque virus venereum causa est ophthalmie pertinacioris, id quod inde intelligimus, si vel morbus venereus præcessit, vel symptomata quædam venerea adhuc adsunt. Ita & si glandule colli indurate simul adsunt, (quæ ophthalmia scrophulosa dici solet) interne remedia antivenerea, ut decocta lignorum & mercurialia rite sunt adhibenda, immo & externe collyrio ex aquis ophthalmicis & tutia vel lapide calaminari mercurii dulcis gr. j. vel alterum addendum, quo oculi sæpius fovendi. In iisdem casibus sequens nodulus mercurialis quoque multum valet.

R. mer-

(a) De qua vid. Chirurgia nostra, Part. II. cap. 52.

R. mercur. præcip. rubr. ℥j: vel 3℥. ungu. rosat. ʒj. M:
& includatur linteo tenui, ac fiat nodulus, qui in aqua
rosarum aliave simili in vitro, loco temperato asserva-
tus repōnatur; eoquē oculi ejusmodi sæpius detergatur:

XX.

*Ad præcavendum hoc malum sæpius recurrens; extra, paro-
xysmum egregie conducunt venæ sectio circa æquinoctia & præserva-
scarificationes atque purgationes subinde institutæ, sæpius aut tio sæpè
rarius, prout malum vehementius aut frequentius esse solet. recurrēdi-
bis.*
Nonnullis valde profunt fonsiculi aut setacea: Quibus etiam
ad humores corrigendos & congestiones præcavendas; anti-
catarrhalia; ut liq: C. succinatus, Essentia succinii; li-
gnor: cum Tinctura antimonii tartarisata; ex infuso vel de-
cocto euphrasi: & lign: sassafras itēquē pulveres diaphore-
tici resolventes; immo & mercurialia quandoque interponen-
da: Aegri bonam servant diætā, vitent aspectum solis;
ignis, nivis; aliorumque corporum splendentium; vitent le-
sionem multam; præsertim minorum characterum; maxime
nocturno tempore; vitent quoquē fumum; pulverem; alias-
que res oculos irritantes; secundū scholæ Salernitanæ præ-
ceptum:

XXI.

De Angina:

In Angina, (quæ N. IV: est congestio sanguinis & in- Angina:
flammaria sæpè vehementissima in faucibus; præsertim in
pharynge & larynge, ut deglutitio & respiratio inde vehe-
menter lædantur) ante omnia revulsione gratiā purgans; ex
potiuncula potissimum purgante; e ramarindis, setina & man-
na parata; exhibeat; atquē altero die clyisma antiphlogi-
sticum injiciatur; deinde prægressa purgatione; largiter e
vena brachii vel pedis educatur sanguis; & si post aliquot ho-
ras malum non remittat; vel adhuc augeatur; venæ sectio
semel iterumque repetenda; & præsertim in vena quoque ja-
gulari altera vel tertia vice instituatur, quæ hic magnæ est
utilitatis; atquē in malo graviori; quod prioribus non cē-
dit, tandem etiam ranina sub lingua incidantur: immo &
tucurbitulæ scarificata parti femorum interne; dorso, colli-
que lateribus impositæ; magnarum sunt virium. (a). Intē-
tea quantum fieri potest frequenter medicamenta diaphoreti-

F 2

ca

(a) Has maxime etiam laudat Dekkerus in Exercit. pract. p. 244.

ea temperantia, & nittosa; ut pulvis temperans vel diaphoreticus nosse exhibeantur, *potusque tenuis acidulatus, & nitratus*, largus ægris commendetur, quamdiu deglutire possunt. Quando vero non amplius aut vix deglutire possunt, *externa remedia* quam solertissime sunt adhibenda: & quidem primo quotidie semel aut bis alvus lotionibus temperantibus, nitratis est ducenda.

Gargarismata præterea, fomenta & *emplastra* collo imponenda, valde hic sunt necessaria: inter hæc *emplastrum de melioto camphoratum* est præcipuum; vel hujus loco, præsertim ubi magnus in faucibus ardor est, spiritus vini camphoratus, & præcipue crocatus, calide cum linteis sub mento laryngi applicatus, egregie prodest. *Gargarisma* vero ex decocto radic. bistortæ, tormentillæ, irid. Flor. caryophyllat. helen. & herb. hyssopi, prunell. fl. malv. rosar. papaver. aut fungis sambuci &c. fieri potest, cum syrup. dianuc. vel diamori: cui parum aluminis & nitri vel salis ammoniaci addatur, quod etiam, si lubet, ope syringæ in fauces injici potest. *Pediluvia* tepida, *sinapismi* & *frictiones pedum* hic quoque valde conducunt, & in summo malo, ubi suffocationis metus, aspera arteria est aperienda, sive *Tracheotomia* est instituenda, de qua videri possunt Institutiones nostræ chirurgicæ: non quod credamus, hujus ope anginam curari, sed ut tempus lucremur, quo diutius ægro respirationem conservemus, atque sic medicamenta resolventia continuare valeamus, donec æger liberius respiret, & a morbo liberari queat.

XXII.

De tonsillarum & uvula inflammatione.

Tonsillarum & uvula tumores.

In tonsillarum & uvulæ inflammationibus eadem est curandi methodus, nisi quod venæ sectio in leviori malo non adeo sit necessaria; quæ tamen nihilominus ad suppurationem aliaque graviora mala avertenda sæpe utilis, ubi æger vel plethoricus, vel inflammatio admodum vehemens. *Alvum vero ducere*, præsertim porione purgante ex tamarindis, foliis sennæ & manna, in leviori malo præstat; quæ tamen etiam in graviori malo utiliter adhibetur. At si quarto vel quinto die prædictis remediis æqualis imminutio mali nondum facta, & tumor persistat, tunc resolutio rariis obtinetur; hinc emollientibus gargarismatibus vel emplastis, præsertim diachylo cum gummis, collo applicatis, aut cataplasmatibus quoque emollientibus suppuratio potius promovenda, iisque continuandum, donec abscessus vel sponte rumpatur, vel scalpello aperiatur; quo facto gargarisma fiat ex

infuso vel decocto herbæ cujusdam vulnerariæ, vel etiam infuso simplici Theæ, cum melle rosarum, cui parum vini addatur; quo æger calide sæpius fauces colluat, donec restitutus est: Interea tamen sciendum, me sæpius vidisse, ejusmodi tumores post plures dies sub ipso suppurantium usu adhuc resolutos fuisse, ideoque de eorum resolutione non semper mox desperandum est; licet ea quandoque lente & tarde fiat.

XXII.

Quia verò molestissimum hoc malum in nonnullis sæpe re- *Præservatio horum malorum*
dit, *præservatio optima est*, præter moderatam dietam, venæ sectio circa æquinoctia, vel in brachio, vel etiam in pede instituta. Alios veto etiam *scarificationes* subinde repetitæ, alios utrumque; alios verò *fonticuli* in brachio aut pede ab his malis immunes reddunt: iis vero neglectis, facile redeunt.

XXIV.

De Pleuritide.

IN PLEURITIDE, PERIPNEUMONIA ET PARAPNEPHRENITIDE, præter generalia N. VIII. commendata; *Pleuritis & peripneumonia*
lateri sive loco dolenti spiritus vini camphoratus linteis complicatis calide imponatur, aut *vesica lacte calido*, in quo flores chamomillæ vel sambuci cocti sunt, repleta; vel etiam sacculi sicci ex vegetabilibus resolventibus cum camphorâ, vel ex sale aut farina calida, si priora forte ferre non possent, utiliter applicantur; quæ *camphorâ etiam interne* hic efficacissima est, præsertim in malo graviore: In *pleuritide spuria* sive *notha*, externas partes magis occupantē, in qua vehemens ad tactum dolor adest, *Lancisus* juber, prægressa venæ sectione larga in brachio, & incisa prius cute supra partem dolentem, *duas cucurbitulas, loco dolenti applicare*; affirmatque hoc ipso, incantamenti instar, sæpe totum hunc morbum tolli, immo & in vera sive interna, modo pulmones non simul sint affecti; egregium esse auxilium asseverat: (a)

XXV.

Quando *pleuritis aut peripneumonia* non resolvitur, sed in *abscessum* abit, & pus per asperam arteriam evacuatür, ex- *Quando in abscessum ab-
sum ab-*
pectoratio est promovenda, & postea ulcus glutinandum. Prius fit 1. speciebus pectoralibus lubricantibus ex rad.

F 3

malv.

malv. liquirit. ficubus, dactylis, passulis & herbis pectoralibus compositis; quibus subinde olei amygdalarum dulcium, vel lini cochl. j. vel ij. interponatur; vel linctus pectoralis ex modo laudatis oleis cum spermate ceti & syrupo violarum paratus. His per aliquot dies continuatis, donec purulenta materia maximam partem est rejecta, 2. *Consolidatio est procuranda* infuso ex herbis traumaticis & pectoralibus parato, aliquoties in die hausto, cum quo Mixture tonica, ex spiritu CC. & Tinctura tartari composita, gutt. xxx. ad xxx. in primo haustulo sunt sumende; vel etiam Elixirii pectoralis Wedelii eadem quantitas, vel etiam balsami pectoralis Meibomii vel vulnerarii Locatelli apta dosis, donec ulcus rursus clausum sit. Si febris lenta aut hectica accedat, curatio hujus vid. Cap. VI.

XXVI.

Relique
jusi am-
paciones
muc rna.

IN VENTRICULI, INTESTINORUM, HEPATIS, LIENIS, RENUM, VESICÆ & UTERI INFLAMMATIONIBUS, externe loco dolenti vel vesica lacte calido repleta, modo §. 24. laudata, imprimis si chamomilla in eo prius cocta est, imponatur; vel spiritus vini camphoratus crocatus, cum linteis complicatis, calide sæpius applicetur; cui adhuc sacculi ex herbis resolventibus majoris efficaciz causa superimponi possunt. Præterea & clysmata emollientia & pargorica ex chamomilla præsertim, vel veronica in lacte aut jusculo cocta, & semel, bis aut sæpius in die applicata, egregiam his in abdominis malis opem ferunt. In nephritide, vesica aut uteri inflammatione graviore, præter hætenus laudata, etiam *birudines* ano applicata, egregie sæpius profunt, præsertim si *hemorrhoides suppressæ* in culpa, vel molimina hemorrhoidalia percipiuntur, ad sanguinem inde derivandum. Interne eadem sunt adhibenda, quæ §. VIII. generatim commendata sunt, speciatim vero in ventriculi inflammatione camphora pulveribus digerentibus admixta valentissima est.

Monita practica.

1. *Vene sectio*, uti in plerisque inflammationibus, valde utilis est, si in principio instituitur; ita e contrario noxia plerumque deprehenditur, si nimis tarde, aut ægro jam valde debili, administretur. Si vero æger plethoricus, vires satis adhuc constantes, magnusque æstus adsit, & malum laudatis remediis, ut sæpius vidi, non cedat, etiam paulo tardius administrata, his adhuc sæpe prodest.

2. In levisioribus inflammationibus & subjectis non plethoricis sanguinis missio non semper est necessaria; in malignis vero,

vero plerumque noxiaprehenditur, adeoque ab ea abstinendum.

3. In quacumque inflammatione frigida extus aut intus applicata ut plurimum nocent: quia sanguinem spissum ac stagnantem magis coagulant & vasa obstructa fortius constringunt, atque sic inflammationem pejorem reddunt. In ophthalmia tamen, & præsertim ejus principio, aqua simplex vel & collyria frigida recte ac sine noxa adhibentur, nam experientia docuit, oculis frigida plerumque magis esse amica, quam calida; in statu vero totus resolvers calidi vel potius tepidi, ex decocto hyssopi, veronicæ, euphrasie, fœniculi & similium ophthalmicorum aut digerentium remediorum, melius usurpantur.

4. Medicamenta spiritusosa calefacientia, & volatilia, in inflammationibus interne nocent; quia motum sanguinis & æstum augent; externe vero spiritusosa, & cum primis spiritus vini camphoratus, egregiam vim resolvendi & refrigerandi obtinent.

5. Tumores inflammatorios externos non nimis mature aperiendo esse censeo; quia immaturi majores dolores aliaque varia sæpe symptomata concitant. Attamen etiam, ut §. XI. dictum est, non nimis tarde incidendi. Verum simulac ex aliquali tumoris mollitie aliquid puris inesse percipimus, tuto & optime aperiri possunt, immo debent, licet totus tumor nondum mollis aut suppuratus sit: ne fistulæ excitentur, aut ossa a pure vitientur, & ut æger citius a febre, anorexia & vehementibus doloribus, quos hi tumores sæpe excitant, liberentur.

C A P U T VIII.

De Hemorrhagiis, sive fluxibus sanguinis.

I.

Hemorrhagiæ dividuntur in spontaneas, violentas, & artificiales; at de prioribus nobis hic potissimum sermo erit: quæ Stahlianæ actiones videntur animæ, magna prudentia susceptæ, quibus sanguinem quantitate, & non raro quoque qualitate peccantem, ad mala illa, quæ a plethora potissimum, vel prava qualitate oriri solent, avertenda, expelleret: nobis vero non ab anima, sed a causis physicis, a sanguine scilicet vel quantitate vel qualitate peccante, vasaque ex rationibus mechanicis fortuito rumpente, sine animæ scientia, concursu aut directione graves ob rationes provenire videntur.

II.

Harum SPECIES præcipuæ sunt hemorrhagia natium, hæ-

noptysis, hæmorrhoides, vomitus cruentus, & speciatim ut mulieribus, mensum atque lochiorum fluxus, itemque hæmorrhagia uteri in gravidis & aliis. Quibus etiam accenseri potest fluxus varicum in cruribus, qui quandoque in quibusdam, sed longe rarius, observatur.

III.

Ætas. Ratione ætatis notandum, quod in *junioribus* maxime narium hæmorrhagiæ; in *media ætate*, hæmoptysis & vomitus cruentus; at in *provecioribus*, hæmorrhoides & mictus cruentus sæpius observentur: quæ si statâ tempora servant, *periodicæ*, sin minus, *vagæ vel irregulares* nuncupantur.

IV.

Subiecta. SUBJECTA hæmorrhagiis obnoxia sunt maxime *plethorici*, præsertim juniores, sanæ plerumque ceterum & floridæ constitutionis, atque ingenii ut plurimum excitati; ut sunt cholericæ sanguinei, & sanguineo melancholici; deinde & ii, qui *dieta lauta*, præsertim calefaciente, aromatica & cumprimis *vinosa* utuntur; maxime vero omnium illi, qui ad iracundiam simul sunt præcives.

V.

Causa. CAUSSA hæmorrhagiarum proxima ut plurimum est *plethora*; quæ vero raro per se, (nisi in mensibus forte & lochiis) sed tunc demum hæmorrhagias excitat, quando vehementius a spirituosiss, aromaticis, volatilibus, calefacientibus, æstum ac motum fortiozem sanguini inducentibus, excitatur; et ab ære calidiore, motu corporis, aut ira vehementiore; abusu vini aliorumque inebriantium, vel & Venere nimia: quo fit, ut vasa sanguifera, uqi natura sunt debiliora, aut nimium dilatat, ut sanguinem transmittant, aut disrumpat; quod tanto facilius contingit, si sanguis simul acris, biliosus, aut scorbuticus alcalina intemperie sive dyscrasia laborat.

VI.

Stahliani sententia. Stahliani quidem animam rationalem hæmorrhagiarum harum, ut jam diximus, causam esse volunt, quæ, cum nimium sanguinis copiam, aut pravam qualitatem, corpori noxiam, cognosceret, prudenti consilio, deliberatione, atque instituto *supervacuam aut noxiam sanguinis partem*, dilatato vel rupto quodam vase sanguifero, aut pluribus simul, ex corpore expelleret, illudque sic a nimia copia vel vitioso etiam sanguine noxisque inde metuendis liberaret.

VII.

In dubium vocatur & refellitur. Sed præterquam quod anima ægri cognitionis hujus, consilii, & actionis prorsus ignara sit, si a prudentia animæ hoc dependeret negotium, evacuationes illæ sanguinis *sensu per*,

per, vel saltem plurimum, in loco tuto & securo, ut in naribus vel intestino recto, atque in mulieribus in utero contingerent. Verum cum sæpe in pulmonibus, ventriculo, vesica, vel renibus fiant, atque inde ægri haud raro breviter tempore, immo paucis horis aliquando pereant, vel saltem inde in vitæ periculum, aliumve morbum periculosissimum, ut ulcera pulmonis aut tænum, ac phthisi, coniciantur, ego prius exillimo, sanguinem copia vel acrimonia peccantem, & vi cordis, (quæ nobis hic natura est) pressum, vasa valde distendere, expandere, atque tandem ob rationes mechanicas casu fortuito petrumperè vel erodere, ubi in hoc vel illo corpore sorte debiliora sunt, minusque resistunt; hinc in his per nares, in illis per pulmones, in aliis per ventriculum, renes, vesicam, vel hæmorrhoidalia vasa sanguinem effundi. Si enim hæc res, ab anima arbitrio, prudentia, atque directione dependeret, anima hominum sapientium semper per loca secura, & ubi sanguinis fluxus minimum vel nullum incommodum produceret, sanguinem abundantem vel noxium expelleret. Verum e contrario videmus, in hominibus etiam sapientissimis, immo in ipsis Medicis prudentibus, qui, quid noxium, satis didicerunt & intelligunt, sæpe hæmorrhagias contra animæ ipsorum voluntatem, & quidem in locis haud raro periculosissimis contingere, ubi anima ipsorum vellent, optaret, ac desideraret, ut per nares vel intestinum rectum sanguis exerneretur, qui tamen reluctante & invita anima per pulmones, ventriculum, renes aut vesicam sæpius expellitur. Verum anima omnibus suis viribus & conatibus, quantopere etiam velit, hæmorrhagias periculosas, in loca minus periculosa dirigere aut relegare nequit; hinc verisimilius est, eas in machina nostra corporea etiam ex causis mere physicis & mechanicis contingere, vimque cordis fortuito petrumperè vasa, sicuti torrens oras vel aggeres suos debiliores, quæ in hoc vel illo homine natura sive forte fortuna debiliora sunt. CELSUS enim jam dudum dixit, & experientia quotidie id confirmavit, nullum esse hominem, qui non partem aliquam præ cæteris habeat debiliorem. Stultissima enim esset anima, quæ, dum posset, sanguinem non per loca tuto expelleret, & consulto loca periculosa, immo periculosissima eligeret.

VIII.

Quæ per pulmones, ventriculum, renes aut vesicam contingunt hæmorrhagiæ, periculose sunt, sicut & hæmorrhagiæ uteri gravidarum; reliquæ vero moderate contingentes, sive per nares, hæmorrhoides vel uterum fiant, nullam noxam, sed egregium ut plurimum corpori emolumentum

tum afferunt: morbos enim multos a plethora alias oriundos, revera præcavent, multosque jam factos minuunt ac tollunt, adeoque sub quiete & moderato victus regimine sibi relinquendæ, & non, nisi insignis debilitas id exigat, remediis sunt cohibendæ. Immo quamvis etiam subinde largæ admodum sint, atque imperitis magnum injiciant terrorem; tamen non mox, hoc est, ante notabilem debilitatem cohibendæ: quia haud facile vitæ periculum inde metuendum, dum paucissimi inde moriuntur, & copia satis imminuta, sponte plerumque tandem constrictis denuo valis, rursus cessant. Contra, quando præmature sistuntur, gravissima sæpe mala, & comprimis hæmorrhagias in aliis locis, vel inflammationes, hecticam, phthisin, cachexiam, hydropes &c. inducunt. Quo magis hæmorrhagiæ benignæ & certis periodis redeunt, eo minus periculi inde metuendum.

I X,

*Curatio
extra pa-
roxysmum
pro copia
minuen-
da.*

In curatione duplex tempus est respiciendum, vel extra paroxysmum, quo recrudescentes sanguinis noxios aut enormes fluxus præcavere sive avertere studemus; vel ipsius paroxysmi, in quo præsentis sanguinis nimiae vel noxiæ profusiones moderandæ & cohibendæ sunt. Proponemus primo curam, quam præservandi fine extra paroxysmum adhibere convenit; ubi, quia sanguinem quantitate peccantem ut plurimum corpus gravare cognoscimus, convenienti modo imminuendus erit. Hinc huic indicationi satisfaciendum 1. per hæmorrhagias sive sanguinis detractiones artificiales, & præcipue per sanguinis missiones: extra paroxysmum, maxime circa æquinoctia, aut ubi res in majori plethora aut sæpius recurrente hæmorrhagia, ita postulat, sæpius ac larga satis quantitate institutas, & ut in plethora dictum est, loco conveniente administrandas; vel in quibusdam etiam, qui venæ sectionem adeo frequentem forte averfantur, per interpositas scarificationes vel hirudines. 2. per frugalem: sive parcā ac refrigerantem victus rationem: in qua non solum nimia alimentorum quantitas, sed & acria & potissimum aromatica, nimius carniū usus, vini abusus, spirituosā atque calefacientia sunt vitanda. 3. per motum corporis moderatum, sed frequentem extra paroxysmum institutum: ubi ambulatio, vectio in curru, & equitatio moderata commendanda; & 4. per lenē purgans quandoque usurpatum; ubi præcipue potiuncula ex tamarindis, foliis sennæ, rhabarbaro, cremore tartari & manna conducit; vel sal amarum purgans, in aqua vel simplici vel minerali, apta copia sumptum.

X.

Ratione qualitatis sanguinis biliosi, acris, alcalici & volatilis corrigendi, *absorbentia*; ut lapides cancrorum couch. ppt. mater perlarum, &c. *præsertim succo citri imprægnata*, itemque his juncta salia media ac nitrosa, aut pulvis meus temperans, vel similis alius, parca dosi, sed sæpius, quando orgasmus sanguinis id exigit, ex aquis temperantibus vel simplici exhibeantur. *Conducit & lenium acidorum*, ut Succo citri, ribesiorum, berberum, mororum, cerasorum acidorum, granatorum, &c. eorumque syrupi, itemque aceti, capparium, citreorum, limonum, acetosæ, & similium, tam in cibis, quam in medicamentis *modicus usus*; quæ & aquis illis vel decoctis hordei commode immisceri possunt.

His subiunctis, ut jam antea diximus, *blanda laxantia* §. IX. laudata *interponenda*, vitando acra, alcalica, spiritiosa, sulphurea, resinosa, aloetica, myrrhata, crocata & similia; *potus vero diluens, aquosus, sufficiens*, cum vel sine blando acido admixto, assumendus. Huic denique intentioni etiam egregie inserviunt *aquæ medicatæ*, præsertim leniores, ut Selterenses, Emsenses, Wildungenses, Spadanæ, & similes, legitime usurpatæ, cum primis *sanguinis detractioe præmissa*, vel etiam loco harum *seri lactis usus* bis in die ad libr. i. vel duas aliquandiu continuatus.

XI.

In ipsius hemorrhagiæ paroxysmo, eæ, quæ per innoxia loca moderate contingunt, nulla prorsus indigent curatione; sed tantum quietem & abstinentiam a calefacientibus & acris requirunt. *Eas vero, quæ largiores, non conducit adstringentibus mox suppressere*; quia partim vasa & glandulæ in primis viis, mesenterio, pulmone aliisque partibus ab his constringuntur, obstruuntur, atque hæctica, phthisis, cachexia, hydrops aliaque mala facile inducuntur, partim a sanguine hoc retento, cohibito aut represso omnis generis morbi facile proveniunt; verum præstat potius *iniisio orgasmum sanguinis, fere semper hic præsentem*, potu aquæ simplicis, vel succo citri imprægnatæ, vel seri lactis & antea laudatis §. X. temperantibus, nitrosis, absorbentibus citratis, & cinnabarinis pulveribus, sæpe pro necessitate adhibitis, compescere, & singulis vel alternis horis, aut etiam sæpius, si res exigit, §j. vel §ss. ex aqua simplici vel aquis refrigerantibus idoneis exhibere, & haustrum frigide superingerere.

Interponi his etiam cum fructu possunt *emulsionēs* ex amygdalis, sem. 4. frigid. & papav. albi paratæ, & nisi hæmorrhagia valde urgeat, solis hisce temperantibus frequenter adhibitis cotinuandum, & ad fortiora adstringentia ob prædictas rationes non accedendum, nisi magna id exigat necessitas.

XII.

2. Pro quæ
litate cor
rigenda.

Curatio in
paroxysmo
levioris.

Vehementioris.

Quod si vero hæmorrhagia sit vehementior, & his non cessat, ægerque inde valde debilis evadat, tunc demum blandâ adstringentia & opiata, modica copia, prædictis temperantibus jungenda: quæ cumprimis optimum effectum edere solent, si versus noctem potissimum exhibeantur, quamvis & interdiu dari queant.

Inter moderata vero & securiora adstringentia, præcipua hic sunt vel Mixture tonica, ex Tinctura tartari & spir. C.C. vel pulveres ex corallis rubris, vel lapid. hæmatite, aut speciebus de hyacintho, quæ dimidia circiter portione modo §. XI. laudatis pulveribus temperantibus miscentur, & cuiusvis dosi extr. papav. rh. vel mp. de cynoglossa gr. j., vel quod perinde est, laudani opiatum pars grani quarta, aut in robustioribus gr. ss. additur, quibus etiam Tinctura flor. papav. vel rosar. rubrar. posui, aquoso instillata, vel Tinctura coralliorum, vel Tinctura terræ japonicæ, vel martis Ludovici, aut lapidis hæmatit. in graviore malo cum vehiculo aquoso data, quandoque interponenda.

Huc etiam referri meretur celebris pulvis stypticus Hearnii, (a) ex adstringentibus & anodynis constans: quem multum jam magno cum successu in omnis generis hæmorrhagiis, præsertim hæmoptysi, utriusque nimis fluxibus, adhibuerunt, qui ita se habet.

24. Sem. hyoscyami albi, sem. papav. albi a ʒj. lap. hæmatit. ppt. corall. rubr. a ʒss. camphoræ ʒss. M, detur subinde ad ʒj. vel ʒss. ex aqua simplici vel destillata, aut julepo acidulo.

XIII.

Vehementissima.

Si tamen ingens ægri debilitas, animi defectio, & hæmorrhagiæ continuatio fortiora adhuc requirat, tunc præter remedia externa, potiuscula adstringens, ad celebris Sylvii modum parata, valentissima est, ut:

*24. Aq. burf. pastoris ʒ iiij.
 equiset.
 plantagin. a ʒ iiij.
 cinam. cydon. ʒ j.
 aceti destill. ʒss. ad ʒ
 corall. rubr. ppt.
 lap. hæmatit. a ʒ j.*

syrup.

syrup. granator. ℥. j. (vel myrt.
vel corall.)
laud. opiat. gr. j. aut in fortior.
gr. ij. M.

De qua potiuncula quavis dimidia hora , donec hæmorrhagia remittat, cochlearia duo vel tria exhibeantur, continuato simul potu aquoso, acidulo. *Simulac vero fluxus sanguinis remittit*, ab ea aliis adstringentibus rursus abstinendum, ne nimia adstrictio noxam inducat, & supra laudatis temperantibus & potu aquoso frigido negotium absolvendum est.

HELVETIUS cum MYNSICTO *usum aluminis* vel simplicis vel cum modica sanguinis draconis portione mixti, sæpius repetitum ad ℥j. vel ℥℥. tanquam præstantissimum his in morbis desperatissimis specificum, una cum potu largo aquoso & cumprimis *decocti seminis lini*, in peculiari de hæmorrhagiis libello gallico, valde commendat, atque stupendos fere ejus effectus recenset. (a) Interea tamen cum hoc perquam forti adstringente interne cautissime procedendum esse judico, ne graves noxæ inde sublequantur.

XIV.

Postquam hæmorrhagia fortior cohibita est, ægreque inde valde debilitatus, primo ab adstringentibus desistendum, atque iste roborantibus (vulgo cordialibus) sive analepticis temperatis refocillandus est. ut aquis in julepis cordialibus temperatis, emulsionibus gratis, ex amygdalis, pineis, pistaceis; vel lacte cum aqua rosarum mixto, vel jusculis carniū, præsertim pullorum aut gallinarum, succo citri vel limonum, vel aurantiorum acidorum, imprægnatis, itemque jusculis ex avena, hordeo & oryza paratis, ut & gelatinis ex pedibus vitulinis, C. C. aut ebore confectis; cerevisia item tenui tepida, cum vitello ovi in ea soluto, & similibus, quæ etiam aliquo modo noxas ab adstringentibus forte inductas, & acre atque austerum ipsorum rursus corrigunt. His subinde haustus vini, præsertim rubri, tenuioris, adstringentis, vel meri, vel aqua probe diluti, interponi potest, si æger illud desideraverit.

Quid cohibita hæmorrhagia facienda.

XV.

INTER EXTERNA REMEDIA (quæ adstringentibus internis præsertim fortioribus, fere præmittenda, & si sufficiunt, quia in visceribus nihil mali concitant, præferenda sunt) conducunt 1. *ligaturæ* paullo fortiores, carpis & malæolis applicatæ. 2. *lapis hematites* magnus aut *jaspis* manibus vel sub axillis detentus. 3. frustum *radic. iridis palustris*

Medicamenta externa.

lustris vulgaris sub lingua detentum : 4. *bufo exsiccat* sub axillis aliquandiu comprehensus. 5. *pulvis sympatheticus Digbeii*, cujus ℥j. vel ij. in ℥j. vel ij. aquæ calidæ solvuntur ; sanguinis ægri aliquot guttulæ immittuntur ; & super leni igne bacillo ligneo aliquandiu agitantur :

XVI.

De Narium Hemorrhagia :

*In narium
hemor-
rhagia :*

Speciatim vero in *Narium hæmorrhagia* nimia ; præter modo laudata egregium adhuc est remedium *spiritus vini rectificatissimus*, vel *spiritus vini camphoratus* naribus fortiter attractus ; item *solutio aluminis & vitrioli* ; vel seorsim vel commixti ; in aqua, aut *pulveris sympathetici* in aqua plantaginis aut phlegmate vitrioli ; simili modo usurpata ; & cum turundis ex lineamentis naribus immissa ; vel & per siphonem injecta. Ita quoque *cucurbitulæ* fortiter trahentes, crucibus & femoribus sæpius admoræ brevi sæpe revellendo, præsertim in sexu foeminino, sistunt has hæmorrhagias ; atque in provectioribus *birudines* ; ano appositæ, præsertim si ægri jam antea hæmorrhoidibus laborarunt ; vel re ipsa tunc congestiones circa intestinum rectum sentiunt ; utilissimæ sunt :

Numus major argenteus, uncialis aut similis, frigidæ fronti alligatus, itemque *lintea* ; *aqua frigida* vel *aceto* imbuta cervici, vel etiam in viris *scroto* aliquoties applicata ; cito quoque sæpius eas compescunt. Alii ejusmodi frigida cervici & quidem ægro inficiæ atque ex improvviso, affundunt :

Quidam vero *stercus suillum* recens naribus aliquandiu admotum vehementer laudant ; id quod vulgo concedi potest :

XVII.

*Præservatio hæ-
morrhagiarum :*

Præservationis gratiâ, ut jam supra N. IX. generatim dictum est, *Venæ sectio circa æquinoctia*, aut sæpius in anno ; præsertim in pede aut brachio ; summe est necessaria : Deinde *dieta* utantur parca ; & refrigerante ; vitando calefactionia ; vinosa, spirituoza, & quandoque bis tervæ in hebdomade ad fervorem sanguinis ; si adest ; temperandum ; pulvis absorbens, citratus, nitrosus, sive temperans noster, detur ; pediluvium temperatum ; tepidum subinde adhibeatur, & *motus corporis* frequens ; sed *moderatus* ; non omittatur. Nonnullis singulis mensibus idoneum *purgans* ex temperantibus §. IX. conducit. Verno vel æstivo tempore, *usus feri lactis* vel *aquarum medicatarum temperatarum*, si per aliquot hebdomades cum idoneo regimine continetur, quæ

que est egregius, præsertim si ventriculus id commode ferre potest.

XVIII.

In hæmoptysi moderata sufficiunt sæpe orgasmum temperantia: ut nigrum cum absorbente quodam citrato & cinabari, vel pulvis temperans noster, aut similis, quavis hora vel bihorio, donec cesset, exhibita, servata simul quiete & victu refrigerante. In *vehementiori* vero non solum sæpius hæc exhibenda, sed eis etiam *lene opiatum*, ut laudanum opiatum, vel mp. de cynoglossa, vel extractum papaveri erant. admisceatur; ubi & sem. hyoscyami albi, his cum fructu addi, vel pulvis stypticus *Heurnii* cum largo vehiculo aquoso exhiberi potest, vel & mr. tonica ad gutt. 30. vel 40. In *vehementissima* vero *potio Sylviæ astringens*, §. XIII. itemque species de hyacintho cum laudatis modo opiatibus mixtæ sæpius adhibendæ, donec remittat; ubi & *pulvis sympatheticus Digbæi*, modo §. XV. descripto, externe adhibitus, præsentaneam subinde opem fert. Ita & *Venæ sectio* in malo graviore revellendi sine utilissima est, præsertim in pede; vel hujus loco *cucurbitula* furis, & femoribus adhibita, præsertim in sexu sæminino, aut hæmorrhoidibus obstructis laborantibus. *Alvus interea*, nisi sponte sit aperta *victu emolliente* ex prunis, cerasis & pomis una cum passulis coctis, vel *clysteribus emollientibus* & refrigerantibus, vel & lenibus laxantibus *semper aperta servetur*. Simulac vero hæmoptysis remittat, ab adstringentibus & opiatibus quoque desistendum, atque temperantibus & emulsionibus, immo & *potu lactis puri*, aut aqua remixti, vel *aquæ frigide sirupo acido*, v. gr. granatorum imprægnatæ, vel *decocti seminis lini* §. XIII. continuandum, donec omnino cesset. Sed postquam omnino remisit, *partes læsæ* in pulmonibus *rursus sunt consolidandæ*, ne facile ulcus pulmonum sive phthisis subsequatur. Quem in finem bis in die *Essentia traumatica Wedelii*, vel mr. ex spiritu C. C. & tincturæ tættari, una cum infusis herbarum & radicum pectoralium ac traumaticarum, quales sunt *species nostræ pectorales*, aut similes, interpositis temperantibus conducunt.

XIX.

Præservatio eadem hic est, quæ in præcedenti §. IX. & VII. proposita fuit, imprimis *sanguinis frequens detractio* est instituenda, & deinde quoque, præsertim ubi hæmorrhoides jam adfuerunt, aut molimina eorum adsunt, *hirudines* ano subinde applicatæ sunt utilissimæ. Ita & *usus feri lactis*, vel *actis ebutyrati*, vel *aquæ selterensium* cum lacte hic est egregius, *Balsamica* vero vulgo hic adhiberi solita, ut *terebinthina*, balsam. sulphuris, Peruvianus, Copaivæ, & ex his

Hæmoptysis.

Præservatio hæmoptysis.

his parata, aliisve similes, & præsertim aloetica ac myrrata, atque hinc etiam ipsæ pilulæ balsamicæ Beccheri, Stahlii, aliarque similes, hic vitanda esse censeo; quia sanguinem commovent, cujus motus potius temperandus. *Corticem peruvianum* cum pulvere absorbente Wedelii, partibus æqualibus remixtum, in hoc morbo, tam curandi, quam præservandi gratia, valentissimum ac certissimum suæque experientia sæpius confirmatum esse remedium, hoc ipso, quo hæc scribo, die, per litteras me certiore fecit doctiss. D. WAGNERUS, Lubecensis.

X X.

De Vomitu & Miſtu cruento.

*Vomitus
& miſtus
cruentus.*

Vomitus cruentus eandem fere curandi rationem requirit: inprimis vero MICHELOTUS (a), omnibus frustra exhibitis, potum largum aquæ frigidæ, succo granatorum imprægnatæ, utilissimum deprehendit. Post paroxysmum vero mox lene laxans ex rhabarbaro & præsertim ejus decocto vel essentia exhibeatur, ad effusum in ventriculo sanguinem evacuandum: quod post unum alterumve diem repetendum. Deinde *herba millefolii* aut *arnica* usus hic egregius est, sive in essentia sive in infuso temperato, loco theæ, sive utroque modo adhibeatur: qui tamen non sit nimis frequens aut nimis diu continuatus.

X X I.

De Miſtu cruento.

Mistus cruentus eadem fere ratione & curatur & præservatur, sicut generatim §. IX. & seqq. docuimus; venæ sectio vero hic semper in brachio, revulsione gratia, est instituenda.

X X I I.

De Hæmorrhoidibus, Lochiis & Mensibus nimis.

*Hæmorrhoides
& menses
nimii.*

Hæmorrhoides nimia, menses & lochia nimia eodem modo tractanda, ut §. XI. XII. XIII. & XVIII. dictum: ubi & cumprimis usus moderatus infusi millefolii præstantissimus est,

[a] In Act. Acad. Nat. Curiosor.

est. Speciatim vero in *menfibus nimis*, cucurbitula magna sub mammis applicata ab HIPPOCRATE revulsio-
nis causa haud sine ratione commendatur; sed verecundio-
res hoc non facile admittunt. Si vero hæc profluvia mode-
rate fluunt, ita ut vel non, vel solum parum debilitent,
non indigent medicamentis, sed solum diæta temperata &
quiete: ita a multis morbis præservant & liberant. Sed
quando a Medico hic aliquid agendum requiritur, præser-
tim si paullo fortius fluant, præter orgasmum temperantia
interdiu usurpata, versus noctem quandoque *lene opiatum*
simul exhibeatur. Stahliani dosin pilularum polychrestarum
Beccheri aut Stahlii, aliarumve similium, per aliquot dies
quotidie assumendam, donec remittat, valde commendant.
Quæ vero; quia expellentibus, hic valde suspectis, ut su-
pra §. X. dictum est, constant; exhibere hætenus nolui,
quia sistentia non pellentia satis idonea & tuta prostant,
quam plurima, quæ propterea, tanquam magis secunda, illis
præferenda esse censeo.

Monita Practica.

1. Ubi cumque hi ægri jam nimis debiles, ab *opiatorum*
largiori usu est abstinendum, & potius roborantibus tempe-
ratis, emulsionibus, gelatinis, lacte ebutyrato, ac similibus
utendum: alias debiliores fiunt, in deliria & mortem prola-
buntur.

2. *Linæa*, quæ a nonnullis ad hæmorrhagias, præsertim
narium, sistendas, *aqua frigida vel aceto imbuta hepatis im-*
ponuntur, summe noxia sunt deprehensa: nam quamvis ob
frigus fluxus hos sæpe compescant; tamen ob eandem caus-
sam facile hepatis inflammationem, obstructionem vel scir-
rhum producant, vel ipsam etiam hydropem.

3. *Hæmoptysi* vel vomitu cruento laborantibus, nisi aliud
quid urgeat, *emetica* non sunt exhibenda.

4. *Adstringentibus*, præsertim in *hæmorrhoidum, mensium*
& lochiorum nimio fluxu, numquam vel certe non facile abu-
tendum: nam observatum est, etiam millefolii aliorumque
mitiorum adstringentium largiorem usum facile illos fluxus,
magno cum periculo ægri sæpe penitus suppressere, quos ino-
derari tantum convenit.

5. In *declinatione hæmorrhagie cujuscumque nimie medica-*
menta roborantia & lenissime adstringentia, ut Mixtura ro-
borans ex spiritu C. C. & Tinctura tartari, vel Tinctura
antimonii tartarisata, bis terve in die ad gr. XXX. ad
XL. ordinanda; vel Tinctura martis cydoniata, aut Tin-
ctura vitrioli martis Zwoelferi, ad tonum partium debi-

Hum rursus roborandum egregia sunt : ubi & infusa herbarum traumaticarum, ut veronicæ, bellidis, agrimonix, alchimille, millefolii, virgæ aureæ, faniculæ, pyrolæ, pilosellæ, plantaginis, &c. ad modum Theæ modice usurpata, subinde interponenda. Deinde *postquam ægri rursus paulo robustiores facti, tene laxans*, ut potio laxans temperata; vel pulvis rhabbarbari, cum paucis nitro, vel cremore tartari; vel decoct. rhabbarbari; vel Sal catharticum Anglic. aut Seidllicense, apta quantitate ex aqua simplici aut sero lactis, vel ex aqua medicata idonea exhibendum.

6. *Qui nimis hæmorrhagiis valde debilitati sunt, a lectio- ne multa diu abstineant, & a luce splendida sibi caveant; quia alias visus inde vehementer læditur, & facile quoque vertigo concitatur.*

7. *Sanguinis missiones extra paroxysmum ad præcavenda sanguinis profluvia spontanea, certis temporibus institutæ, plus præstant, quam in paroxysmo, ad eas curandas, celebratæ: adeoque statò tempore, bis, ter quaterve in anno, pro ægri diversitate, præservandi sine valentissimæ sunt.*

8. *Qui hæmorrhagiis obnoxii, vitent calefacientia, vinum, spiritum vini, aromata; aloen, myrrha, & ex his paratæ; iram, venerem nimiam, saltationes & motus quoscunque vehementiores; sed temperantiæ & moderationi studeant in omnibus suis actionibus, ita immunes ab his malis se reddere possunt.*

C A P U T IX.

De Hæmorrhagiis sive fluxibus sanguinis suppressis.

I.

Causa: **L**icet hæmorrhagiæ multa sæpe incommoda & pericula inferant; plura tamen eaque longe-graviora, immo & frequentiora inferre solent eadem suppressæ, sive suppressio hæc fiat sponte, a causa quadam interna, ut a nimia spissitudine sanguinis; sive ab adstringentium, in curatione hæmorrhagarum adhibitorum, perverso usu, sive a refrigeratione, potu frigido, victu crasso, vel obstipante, animi affectibus aliave ex causa.

II.

Symptoma. Inter hæmorrhagias vero, quas hic *suppressas* vocamus, considerari merentur *hæmorrhagiæ narium, mensium, lochiorum & hæmorrhoidum suppressio*: unde omnis generis *gravissima*

ma symptomata ac morbi oriri solent. Et quidem speciatim ab *hemorrhagia narium suppressa*, gravia mala vel in capite oriuntur, ut *dolores capitis*, *morbi oculorum*, *aurium*, *dentium*, *inflammationes faucium*, *tonsillarum*, *uvulae*, *erysipelas faciei*, *capitis externi*, *Phrenitis*, &c. vel in thorace, ut *palpitatio cordis*, *anxietates precordiorum*, *respiratio difficilis*, *hemoptysis*, *pleuritis*, *peripneumonia*, *phthisis*, & *febris acuta variae*. A suppressione mensium, *spasmi* & *dolores in ventre*, atque speciatim in *ventriculo*, *intestinis*, *hepate*, *liene*, item *dolores capitis*, *spasmi*, *pressio* & *angustia precordiorum*, *respiratio difficilis*, *nausea*, *vomitibus simplex* & *cruentus*, *hemoptysis*, *hemorrhagia narium*, *gravitas artuum*, *lassitudo*, *cachexia*, *chlorosis*, *oedemata*, *hydrops*, *affectus spasmodici* & *convulsivi*, *passio ita dicta hysterica*, sive *uterina*, *epilepsia uterina*, *animi deliquia hysterica*, *ulcera pedum*, *articulorum dolores* & *morbi arthritici*, *hemorrhoides*, *miectus cruentus*, *morbi que alii*. A lochiorum suppressione *angustia precordiorum*, *capitis dolores*, *fastidium ciborum*, *vigiliae*, *febres acutae praesertim purpuratae aut miliaris*, *deliria*, *convulsiones*, *inflammatio pleurae*, *uteri*, *aliarumque partium*. Hemorrhoidum suppressionem sequuntur omnia ea symptomata, quae a mensium suppressione oriri modo diximus, & speciatim quoque saepe *icterus praesertim niger*, *apoptexia*, *malum hypochondriacum*, *melancholia*, *mania*, *vomitibus cruentus*, *arthritidis*, *podagra*, *ischiatricum malum*, *nephritis*, *miectus cruentus*, *renum exulceratio*, *calculus*, & omnium frequentissime *asthma*, *oedema* atque *hydrops*. Reliquae hemorrhagiae suppressae eadem tere symptomata producant.

III.

Quo diutius haec suppressiones durarunt, eo pejora plerumque inducunt symptomata, atque eo difficilior solet esse curatio: praesertim si aliae sanguinis idoneae evacuationes, sive naturales, sive artificiales, non substituantur. Facilius tamen fluxus mensium suppressus, quam reliqui, restituitur. Ab omnibus vero his fluxibus suppressis praeter jam §. 2. indicata mala, haud raro *mors subitanea* producit.

IV.

In CURATIONE, pro diversitate fluxus suppressi, varia ratione procedendum est: interea tamen in quavis suppressa hemorrhagia respiciendum ad qualitatem, crasin sive dispositionem sanguinis: qui, si nimis serosus, pituitosus vel frigidus, conducit per octiduum circiter aut diutius quotidie album blande movere, vel pilulis aloeticis, Francosurtensis, Immanuelis, Beccherianis, Stahlianis, aliisve similibus balsamicis; vel vino medicato, & simul his in die circa meridiem & circa vespere Essentia quadam atten-

Cursio
hemorrhagiae
sup-
presse ge-
neralis.

nuante ac roborante, ut gentianæ, trifolii fibrini, corticis aurantiorum, rad. pimpinellæ, lignorum, vel alexipharmaca Stahliani, aut diaphoretica nostra, aliave simili ad guttas XXXX. ad LX. uti.

V.

Si a spisso sanguine.

Si suppressio a sanguine nimis spisso oriatur, prædictis modo medicamentis infusa aquea ex herbis aperientibus atque attenuantibus optimo cum fructu ad modum Theæ interponuntur: ut *infusum rosmarini*, salviæ, capilli veneris, mellissæ, veronicæ, betonicæ, theæ, cum cortic. citri vel aurantiorum, &c. quibus jungendus motus frequens sufficiens, ipsa *salsatio*, vinum ad hilaritatem usque, sed non ad ebrietatem, potum, & diætâ conveniens modica atque attenuans.

VI.

Si calor p. n. junctus.

Sin vero cum suppressione adsit simul sanguinis motus nimius ac calor p. n. sive *orgasmus*, post evacuationes alvi lenes, hic nitrosis & absorbentibus citratis sæpe laudatis est temperandus, & postea eo mitigato mixtura ex spiritu C. C. & Tinctura tartari subjungenda; atque simul diætâ moderata, temperans, cum motu frequenti, observanda.

VII.

De hæmorrhagia narium suppressa.

Externe nares herba mari Syriaci, vel millefolii ad hæmorrhagiam stimulandæ; vel in ipsis naribus, ad morem Ægyptiorum, scarificatione sanguis proliciendus. Atque vel eadem etiam methodus adhibenda in eis, qui quidem numquam vel raro hæmorrhagia narium laborarunt, symptomata tamen antea recensita, quæ a narium hæmorrhagia suppressa alias præveniunt, patiuntur: oriuntur enim hæc a congestionibus sanguinis circa caput, sive ab ita dictis moliminibus hæmorrhagiæ narium, sive ab impedita hac hæmorrhagia & plethora, quando abundans & circa caput congestus sanguis ob vasa nasi interna indurata, vel robustiora, vel quamcumque etiam aliam causam exitum invenire & vasa narium aperire aut perrumpere nequit.

VIII.

Sanguinis detraçtio necessaria.

At si prædicta ratione suppressa narium hæmorrhagia revocari non potuit, & antea nominata mala non remittunt, vel saltem valde minuuntur, vel etiam illis remediis tam diu immorari nolumus, quia sæpe periculum in mora est, promptiorem plerumque opem fert sanguinis detraçtio per venas;

nas; quæ vero deinde ad mala inde metuenda verno minium & autumnali tempore repetenda est: immo in nonnullis valde plethoricis, quos symptomata supradicta §. 2. valde affligunt, etiam ter quaterve in anno iteranda, vel etiam *scarificationes* subinde interponendæ; alias vel varii graves capitis morbi supra nominati, vel & pectoris, & quidem speciatim facile *hemoptysis* & *phtisis* vel *pleuritis* aliaque inde oriunda mala, sequuntur.

IX.

De Mensibus suppressis.

In mensium suppressione I. humores visceri sunt attenuandi, *infusus* aqua calida paratis, ex aptis vegetabilibus, ut rad. cichorii, pimpinellæ albæ, aristolochiæ rotundæ, ari. vincetox. graminis. §. radicum aperientium, caryophyllatæ, herb. rosmarin. capill. veneris, marrubii albi, fumar. chamæd. meliss. veronic. heder. terrestr. hyssopi aut similibus cum quibus bis in die *Essentia quedam attenuans*, sanguinemque ad uterum determinans, ut Essent. rosmarini, aristolochiæ rotundæ, succini, tinctura tartari, vel antimonii tartarifata, iusta dosi exhibearur: quibus attenuandi sine pulveres ex salibus mediis, digestivis vulgo dictis, vesperi jungantur, ut ex tartaro vitriolato, arcano duplicato, nitro antimoniato, sale absinthii, &c. vel *pilula balsamica* Beccherianæ aut Stahlianæ, aut aliæ similes, ex gummatibus & balsamicis uterinis (qualia sunt ammoniacum, sagapenum, galbanum, gummi hederæ, myrrha, aloë, opobalsamum, balsamum, Copaivæ, terebinthina) & succis inspissatis sive extractis plantarum amararum ac balsamicarum, ut gentianæ, cardui benedicti, absinthii, centaury minoris, fumaris, cochlear. &c. paratæ: hisque aliquandiu continuandum, donec menstruorum alias consuetum tempus fere appropinquet.

Mensium suppressio. curatio.

X.

Tunc II.) sex vel octidies ante consuetum menstruorum tempus talia adhibenda sunt, quæ paullo fortius attenuant, atque excretionem menstruorum promovent: qualia sunt: 1. balnea sive infusæ, pediluvia ac frictions pedum quotidie aut alternis tunc diebus usurpanda. 2. Vina medicata, per epicrasin purgantia, ex supra §. IX. indicatis radicibus & herbis, additis foliis fennæ, radic. rhabarb. & fibris hellebori nigri, cum sale tartari, vel tartaro vitriolato, mane usurpata: quibus humores pituitosi attenuantur, sanguisque ad uterum determinatur. 3. Emmenagoga sive specifica ita di-

Etia menses pellentia: qualia sunt infusa ex fortioribus mentibus, ut ex pulegio, roremarino, sabina, adhatoda; florum rosmarini, cheiri, calendulae &c. aqua; aut in frigidioribus vel pituitosis, vino parata, semelque aut bis in die usurpata. Præterea omnia ex myrrha, aloe, borace, succino, sabina & croco confecta: ut myrrha vel succinum in pulvere, sine, vel quod valentius, cum borace, apta dosi quotidie vino, præsertim calido, vel aqua pulegii, cheiri, liliorum convall. melissæ, aut cinamomi assumpta; troch. de myrrha, item Essent. myrrhæ, vel per se, vel cum Essentia succini, vel sabinae, vel spiritu salis ammoniaci mixta; ita & Elizirium proprietatis vel per se, vel cum spiritu salis ammoniaci, Essent. croci, *piluleve balsamica* antea laudatæ, & ultimis diebus paullo largiori dosi exhibitæ. Nonnulli *olea distillata* pellentia, quæ vehementia immo fortissima sunt, commendant: ut oleum destillatum succini, sabinae, rosmarini, cinamomi, &c. quia vero hæc nimis vehementer exagitant & commovent sanguinem, præsertim majori dosi exhibitæ, hæc aliæque vehementiora pellentia vel non, vel saltem cautissime, parca dosi, & non antequam venæ sectio fuerit præmissa, atque aqueis sanguis probe dilutus, exhibeantur; alias ob nimiam vehementiam, calorem, inflammationes, hæmoptysin, vomitum aut mictum cruentum aliavē mala inducunt.

XI.

*Si tempus
menstruo-
rum in-
certum.*

Si vero tempus menstruum incertum est, tunc medicamentis prioris classis, attenuantibus scilicet & leniter pellentibus §. IX. tam diu continuandum, donec ægræ dolores in abdomine, lumbis, & circa pubis vel uteri regionem percipiant, quo tempore medicamenta posterioris classis sive fortius pellentia, §. X. adhibenda. Sed si ejusmodi tormina, uti haud raro contingit, non sentiantur, in junioribus emmenagoga versus novilunium, in annosioribus versus plenilunium danda, juxta versiculum.

Luna vetus vetulas purgat; nova luna puellas. Quando vero gravia symptomata, vel in capite, vel thorace, vel abdomine, & inde metuenda pericula urgent, atque prædictis nihil effectum est, tunc etiam ad majora mala, hæmoptysin verbi gratia, vomitum cruentum, & similia præcavenda, *Vena in pede secunda*; id quod ultimo triduo ante tempus menstruum consuetum, aut si hoc ignoratur, in annosioribus, luna decrescente sive post plenilunium, in junioribus vero, post novilunium, sive luna crescente commodissime fieri solet. Cavendum tamen, ne in puellis de graviditate suspectis, aliisque, ubi symptomata non valde urgent, præsertim etiam in puellis, junioribus, nimis cito aut facile administretur; quia

quia sæpe deinde idem auxilium cum molestia earum repetere coguntur.

XII.

In valde plethoricis tamen, aut ubi gravia quædam symptomata urgent, initium curationis fieri apte potest Venæ sectione, subjunctis postea prioris & posterioris ordinis medicamentis emmenagogis: qua quidem methodo plerumque citius curantur, verum facile postea nova obstructio repetitionem venæ sectionis exigit. Interea tamen etiam sciendum, quod facta sanguinis missione, *solis sæpe pilulis Becherianis vel Stahlianis* aut similibus aloeticis ac myrrhatis scopus obtineri possit, si ultima hebdomade ante tempus menstruum vesperi quotidie adhibeantur: quæ tanto certiores effectum edunt, si una cum *pediluvii* vel infusibus, infuso quodam emmenagogo, similique Essentia idonea ex §. IX. supra laudatis usurpantur: & si forte prima vice effectum quesitum non præstant, subsequenter mensibus, postquam semper per XIV. circiter dies a medicamentis abstinerunt, eodem tempore, eodemque modo repetantur, non neglecto motu corporis frequenti, pedum frictionibus, ac dicta conveniente.

XIII.

Atque hac ipsa etiam methodo *mensēs nimis parce fluentes*, ut largius fluant, tractandi sunt, itemque *ea puellæ, in quibus iuxta ætatem menses nondum fluxerunt*, attamen omnis generis molestias aut prava inde symptomata patiuntur; quibus etiam in casibus *aquæ medicatæ* & cumprimis *martiales*, ut pyramontanæ, Egranz. Sualbacenses, Spadanæ & similes egregium plerumque effectum præstant.

XIV.

Quibus mulieribus *mensēs per ætatem cessant*, & incommoda inde oriuntur, quæ alias a mensibus obstructis oriri solent, tunc minime pellentia eis sunt adhibenda; sed potius *detractione sanguinis artificiali* opus est: & si tales mulieres antea valde fuerint plethoricæ, & otiosæ sint, venæ sectio verno & autumnali tempore postea est instituenda; aut pro malorum vehementia sæpius, eaque deinde, ad seram usque senectutem, præsertim in pede reiteranda, *phlogosque vagæ* sive ebullitiones sanguinis, quæ has mulieres ut plurimum vehementer afficere solent, usu frequenti pulverum temperantium, vel absorbentium, citratorum, nitri ac cinnabaris temperandæ sunt: in quem finem pulvis temperans noster egregius est; itemque *aquæ medicatæ*, præmissa sanguinis missione, legitime usurpant.

*Vitius
regimen*

In dicta vitentur omnia, quæ difficulter digeruntur, eruda, crassa, farinacea, flatulenta, leguminosa, arida; adstringentia, obstipantia, & acida; *potus sit tenuis & sufficiens*, alvusque semper victu lubricante ac potu sufficiente, vel si hi non sufficiant, leni laxante, ut sale quodam amaro cathartico, aperta servetur. *Matur vero corporis frequens* in curatione omnium horum morborum, a suppressione mensium ortorum, summe utilis est atque necessarius, moror vero, tristitia ac terror vitandi.

XVI.

De Lochiis suppressis.

*Suppressio
lochia-
rum.*

In SUPPRESSIONE LOCHIORUM potissimum observandum est, utrum omnino suppressa, an solum imminuta sint. Si *tantum imminuta*, & febris nondum adfit, pellentia levia, ut Essent. myrrhæ, succini, croci, scordii, vel scordii, vel inter se mixta, & parca dosi cum infuso Theæ, vel aliis similibus aqueis calidis aliquoties in die exhibita profunt: vel loco horum Elixir. proprietatis Paracelsi; aut quæ adhuc præstantiores a plerisque habentur, pilulæ balsamicæ Beccherianæ vel Stahlianæ, vesperi, ad grana xx. quotidie usurpatæ. *Sed si febris jam adest*, medicamenta temperantia, huic contraria, danda sunt. *Si vero lochia penitus suppressa* sunt; & quidem jam per aliquot dies, fere semper febris adest, adeoque non tuto pellentia, præsertim fortiora, adhibentur: quia febrem periculosam vel producunt, vel jam præsentem augent atque omnia deteriora reddunt, verum præstat tunc ad febrem potissimum respicere, & orgasmum sanguinis, præmissa venæ sectione in pede, præsertim in plethoricis ac junioribus, pulveribus temperantibus, absorbentibus, citratis, nitrosis, & potiunculis diaphoreticis, potuque aqueo, ut in febribus acutis, temperare, iisque, observato regimine diaphoretico, continuare, donec ægræ melius se habeant: ubi fluxus subinde redit, subinde verò non redit, & ægræ tamen sæpius convalescunt; sed si venæ sectio in principio non est instituta, plerumque non amplius prædest. *Vitius insuper puerperis hic conveniens*, sit tenuis & parvus; vitentur animi affectus, præsertim moror, tristitia, terror, ira, temperatumque aeris regimen probe observetur: ubi vero notandum, quod moderatus vini generosi haustus subinde datus, præsertim in assuetis, si illud appetant; & calor non nimis vehemens sit, hic non noceat, sed sæpe multum ad fluxum hujus restitutionem

nem

nem faciat, qui ubi rediit, quiete, tenui victu, moderamine animi, leni pellente, & apto regimine conservandus.

XVII.

De Hemorrhoidibus suppressis.

HÆMORRHOIDUM SUPPRESSIO requirit primo sanguinis immutationem per *Venæ sectionem* in pede, soluta prius alvo, si obstructa est, vel per clysterem ex decocto veronicæ aut chamomillæ in lacte, vel leni quodam laxante. Deinde, facta Venæ sectione sanguinis qualitas vitiosa est corrigenda: & quidem si orgasmus sive æstus percipitur in ægro, absorbentia citrata, nitrosa cum cinnabarinis mixta, inprimis pulvis temperans noster, & lenia acidula ipsi opponantur. Sin vero ob sanguinem viscidum suppressæ, eadem, quæ in mensibus suppressis N. IX. hujus capitis ad sanguinem digerendum atque attenuandum commendata sunt, hic quoque usurpanda. Denique vero, postquam humores correcti sunt, opera danda, ut lenibus stimulantibus sive pellentibus fluxus revocetur; ubi primo interne omnia eadem profunt, quæ ad menses pellendos supra §. 8. & 9. laudavimus: & speciatim omnia medicamenta ex aloe, myrrha, croco, & helleboro nigro parata, ut Essentia eorum, Elixir. proprietatis, Essentia succini, pilulæ Francosurtenses, Immanuelis, Beccherianæ & Stahlianæ & similes; item succinum cum borace, & vina medicata laxantia; quibus vero, si æstus percipiatur, temperantia subinde, præsertim vesperi, sunt interponenda.

Hæmorrhoidum suppressio.

XVIII.

Externe conducunt *suppositoria* ex aloe & myrrha, ut & enemata acriora, fricationes ani frequentes pannis asperis, vel foliis ficus, pediluvia & infusus sæpe adhibiti, ac denique, his omnibus irritis, aut ubi periculum in mora, *bi-rudines* ano applicatæ, utpote hic quam efficacissimæ.

Externe quid faciendum.

Motus corporis, præsertim equitatio, aut vectio in curru, vinum etiam generosum paulo largius subinde assumptum, ad hunc fluxum restituendum magnæ quoque sunt virtutis. E contrario ab *abusu pellentium fortiorum internorum*, præsertim ubi obstructio ab adstringentibus orta est, sedulo cavendum, ne sanguinem nimis commovendo graviora mala excitent: quemadmodum in mensium obstructione quoque jam indicavimus.

Fluxu autem restituto, sibi que aliquandiu relicto, exhibenda sunt lenia roborantia, ut tincturæ martiales variæ,

riæ, cydoniata, scilicet pomata, Ludovici, Zwolferi, &c. vel Mixtura roborans ex spiritu C. C. & tinctura tartari, vel Essent. millefolii, ejusque infusum modice postea aliquandiu usurpata egregie conducunt.

XIX.

Si hæmorrhoides nunquam fluxerint.

In illis, ubi hæmorrhoides nunquam fluxerint & tamen symptomata adsunt hæmorrhoidum metuendarum, sive molimina, ut vocant hæmorrhoidum, ut hæmorrhoides cecæ, dolores ani & circa os sacrum, eæ, meo quidem judicio, non facile promovendæ aut excitandæ, ut multi volunt, nisi graves forte causæ id exigant: quia postea, præter morbi spurcitiem & molestiam, ab earum fortuita obstructione, innumera facile mala oriuntur. Quapropter in leviori adhuc casu præstat ægro prius, præmissa Venæ sectione in brachio, laboriosum frequentemque corporis motum cum diæta parca, tenui, ac refrigerante, sedulo commendare: ita sæpe illa symptomata transeunt. Vel si his uti nolit; aut ob vitæ genus non possit, aut etiam hæc non sufficere videantur, vel malum jam sit gravius, primo frequens usus pulverum temperantium, ac deinde sanguinis missio adhibenda; quæ deinceps subinde, præsertim circa æquinoctia, aut si opus est, sæpius, præsertim in brachio est iteranda; vel etiam in quibusdam scarificationes illarum loco substituendæ aut interponendæ sunt; ita enim, plethora atque ebullitione sanguinis imminutis, & hæmorrhoides præcaveri, & symptomata inde orienda minori molestia ac periculo curari possunt, cum primis si moderatam & convenientem victus rationem æger simul probe observet.

Monita practica.

1. In omnibus hæmorrhagiis obstructis, præsertim mensibus ac hæmorrhoidibus, prudenti Medico, ad fortissima pellentia non facile progrediendum, & imprimis a majori ipsorum dosi abstinendum: quia ob vehementiam, quæ in ingni acrimonia & calore consistere videtur, facile nimium sanguinis motum, æstum, inflammationes, hæmoptyses, vomitum aut mictum cruentum inducunt, immo subinde ipsam apoplexiam.

2. Hinc si fluxus moderatis pellentibus restitui non possunt, præstat sæpius, præsertim in tenerioribus, a curatione abstinere, & naturam sibi aliquandiu, præsertim si nihil urgeat, relinquere, quam intempestivo pellentium fortiorum abusu ægris noxam inferre. Observandum enim est salutare illud axioma medicum.

Si prodesse non possis, cave, ne noceas.

3. Si in lociis suppressis fortiora pellentia adhibentur, febres periculosissimas acutas, & imprimis miliarém sive purpuratam, puerperis sæpe ac facile concitare solent: unde pleræque pereunt.

4. Sanguinis tamen detractiones in hæmorrhagiis quibuscumque suppressis, præsertim pertinacioribus, aut ubi periculum inde metuendum, præstantissima & sæpe maxime necessaria sunt remedia, fortioribusque pellentibus longe præferenda: atque si malum non omnino tollunt, levius tamen ac tolerabilius illud ut plurimum reddunt, ut postea aliis idoneis remediis tanto facilius curari queat.

C A P U T X.

De Congestionibus, & Doloribus.

I.

MOrbi, qui congestiones dicuntur, sunt morbi, in quibus sanguis, vel serum in certis partibus vel ob earum imbecillitatem, vel ob humorum in corpore abundantiam, vel ob ejus crassitudinem, vel propter varias has causas simul, copiosius, quam par est, sensim congeritur sive accumulatur, dum minus refluit, quam influit: ut inde molestiæ, tensiones, spasmi, tumores vel dolores in his partibus continentur, eique sæpe vehementissimi, qui pro varietate partium varios morbos produciunt. Quando verò partium tonus sive earum vis morrix nondum nimis destructus est, a congestis humoribus irritantur, ob fabricam suam elasticam artificiosissimam, renituntur, spasmodice constringuntur, atque hoc mirabili artificio eos propellere vel ejicere conantur, idque vel per sanguineam vel serosam quandam excretionem. Quod ubi a natura obtinetur, malum plerumque cessat, vel saltem minuitur; sed si ob quæcumque impedimenta hæc ejiciendi molimina non succedunt, fibræ partium nerveæ nimis tensæ, dolores, spasmos, ita dictos catarrhos, sæpe etiam tumores, & omnis generis affectus dolorificos, arthriticosque produciunt; qui vero sæpius tandem in partium debilitates & quandoque nervorum resolutiones sive paralyticos affectus desinunt, nisi in tempore rite curentur (a).

II.

Differunt vero congestiones vel 1. ratione loci: modo enim sunt in capite, unde dolores & gravitates capitis, differunt. 2. a.

[a] Sibaliani hæc omnia prudenti animæ directioni adscribunt; quam vero probare nequeunt; melius autem ex mechanice rationibus explicari potest.

dolores & inflammationes oculorum, aurium, dentium, faucium, vertigo, morbi soporosi & apoplectici, &c. proveniunt; modo in *thorace*, unde angustia præcordiorum, difficilis respiratio, palpitatio cordis, hæmoptysis; modo in *collo*; modo in *abdomine*, ut in hepate, liene, (unde congestiones, inflammationes & abscessus in his partibus, itemque malum hypochondriacum & hystericum) renibus, vasis venæ portæ, & præcipue vasis hæmorrhoidalibus, unde hæmorrhoides *cæcæ & dolentes*, dolores lumborum, malum ischiaticum, & in mulieribus malum hystericum; modo in *artibus*; unde *arthritici dolores, rheumatismi, podagra, chiragra & gonagra*, atque *œdemata* pedum, &c. proveniunt.

Vel 2. differunt *ratione ætatis*: in junioribus enim, experientia teste, congestiones ut plurimum contingant in *capite*, ubi sanguis noxius ob agilitatem partiumque vigorem superiora petit, per nares exitum querere & hæmorrhagiam natium intendere videtur: unde facile in his oriuntur *cephalgia, coryza, ophthalmia, odontalgia, otalgia*, aliaque aurium vitia, ut & faucium tumores, nisi fluxus sanguinis per nares eos ab his malis præservet. In *ætate media pectus præcipue afficiunt*, & evacuationem sanguinis in pulmonibus querunt, qui si ob causam quamcumque exitum non invenit, *suffim, dyspnœam, asthmata, pleuritidem, vomicam, aut phthisin* producit; in *senioribus* vero congestiones in *abdomine & articulis* maxime contingunt, ubi sanguis nimis exitum per intestinum rectum vel vias urinæ affectat, & hæmorrhoidum fluxum vel mictum cruentum molitur, unde affectus catarrhales, vulgo *catarrhi frigidi disti in lumbis & coxis; podagra, arthritis, rheumatismus, lumbago, ischiaticum, hypochondriacum, hæmorrhoidale, & in feminino sexu hystericum malum*, &c. ortum sæpe ducunt.

III.

Causa.

Causa earum ut plurimum est *abundantia sanguinis aut feri, sive plethora*, huiusque causæ omnes, ut *dieta lauta, vita otiosa*, evacuationes naturales sanguinis suppressæ, aut artificiales neglectæ, refrigeratio & transpiratio suppressa, itemque animi affectus vehementiores, & cumprimis quoque partus læsæ debilitas.

IV.

Prognosis.

Congestionibus sæpe succedunt obstructions, perfectæ stagnationes, dolores, inflammationes, suppurationes, abscessus, œdemata, corruptionesque plurimæ, unde pro partis varietate varia & quamplurima in quavis parte mala pro-

ve-

veniunt, & quando inveteratæ sunt, ob tonum partium a digestionē diuturna læsum, difficulter sæpe curantur, aut tamen levi de causa revertuntur. Si regimine & medicamentis calidioribus, aut opiatīs sive narcoticis, præsertim præmature, tractantur, periculosissimos sæpe morbos inducunt. *Congestiones pectoris & capitis* reliquis ut plurimum sunt periculosiores: quia illæ facile hæmoptysin, peripneumoniam, vomitum, phthisin, inflammationem, asthma, catarrhum suffocativum, aut suffocationem; hæ autem haud raro apoplexiam & paralytin sensuumque morbos inferunt. Sic & eæ, quæ ætate incongrua contingunt, perquam mali quoque solent esse moris.

V.

Quod ad curationem attinet, distinguendum erit *tempus paroxysmi*, sive quando ægri ipsis his morbis correpti sunt, & tempus, quo ab his morbis liberi sunt, atque de præservatione eorum cogitant, quia ob partes debilitatas facile eisdem morbis rursus corripuntur, atque sic sæpe inde ægrotant. Igitur in *paroxysmo* horum morborum generatim conducunt ea, quæ congestum serum & sanguinem partim a loco affecto abducunt & revellunt, partim resolvunt atque in naturalem motum redigunt: qualia sunt; 1. in plethoricis & calidioribus sanguinis missio: quæ vero in frigidioribus aut serosis in paroxysmo sæpe plus nocet, quam prodest. 2. quæ alvum leniter ducunt, quemadmodum *blanda laxantia*: sicuti sunt pilulæ tartaræ, pilulæ francosurtenses, balsamicæ, Beccheri, Stahlī, aliæque similes, vel de succino Cratonis: quæ in robustioribus aliquot gravis resistit jalapæ, diagrydii, aut extr. hellebori nigri, acui possunt; aut potionculæ vel pulveres laxantes, &c. vel horum loco quandoque clysteres emollientes substitui possunt. 3. *pulveres diaphoretici*, ex absorbentibus citratis, salibus mediis cinnabarinis, nitrosis & antimoniatis, sæpius per diem exhibiti; quibus ubi dolores sunt vehementiores, aut pertinaciores, & prædicta non sufficiunt, nocturno tempore, anodyna, moderata dosi, ut laudanum opiarum, vel mp. de styrace vel de cynoglossō, itemque emulsionē anodynæ jungenda sunt.

Curatio generalis.

4. *Essentie diaphoreticæ*, ut scordii, succini, pimpinellæ albæ, lignorum, helen. aristoloch. ror. Mixt. simpl. tinctura bezoard. matutino præsertim tempore in lecto, cum infusis aqueis calidis, expectato deinde blando sudore, ac postea servato temperato victus regimine, interponendæ; nimis volatilia vero & calidiora fugienda.

VI.

Præservatio generalis.

Extra paroxysmum præservationis gratia *Vena sectiones* circa æquinoctia, vel sæpius adhuc in valde sanguineis institutæ & postea constanter repetitæ, itemque in nonnullis *scarificationes* certis temporibus interjectæ, maximi sunt usus, quibus vero *laxantia* lenia vel præmittantur, vel subfungantur: ut sunt vina medicata, aut infusa laxantia, aut pilulæ leniores quæcumque modo §. V. & alias jam sæpius indicatæ, vel & salia amara cathartica, aut aquæ medicatæ leniter purgantes. In paroxysmo vero, ut supra jam dictum est, sanguinis missiones, nisi in valde sanguineis & calidis, aut ubi alia peculiaris ratio eas urgeat, haud facile adhibendæ.

Vicius denique ratio in his morbis *magnæ est utilitatis*, potissimum vero opus est, ut ægri hi *parce edant*, a nimia satietate sibi caveant, impigri sint ad motum, affectus animi moderentur, & sufficienti potu tenui utantur; a crasso vero ac spirituloso & præsertim nimia ejus copia sibi caveant. Vitent quoque *medicamenta calidiora* & volatilia, regimenque nimis calidum aut valde coactum; corpus tamen contra frigus probe semper muniant; & in statu temperato conservent, ne transpiratio facile lædatur; nam frigus eis ut plurimum est noxium.

Fricationes corporis, præsertim pedum, itemque *pediluvia* temperata subinde adhibita, in his affectibus magnæ quoque sunt utilitatis. *Ira* vero, *tristitia*, *mæror*, *intemperantia* in victu ac venere, desidia, nimis curæ ac sollicitudines, itemque studia nimia, præsertim severiora, aut diutius protracta fugiantur.

VII.

De Capitis dolore.

Cephalalgia.

Speciatim vero jam considerabimus, quid in præcipuis congestionum ac dolorum speciebus, præter methodum generalem, agendum sit, incipiendo a capite, ubi CEPHALALGIA primum occurrit, utpote quæ sæpissime a congestionem sanguinis in cerebro oritur, & sæpe cum tinnitu aurium vel gravitatis sensu; quandoque cum vertigine aliisve malis conjuncta est.

VIII.

Ejus curatio.

In *curatione* ejus præ omnibus alvus, si adstricta est, conveniente evacuante, quale ex N. V. vel VI. peti potest, solvatur: postea laudati pulveres, essentia & infusa diaphoretica ac resolventia N. V., proposita ibidem methodo adhi-

adhibeantur, Externe spiritus vini camphoratus, crocatus fronti calide applicatus, vel temporibus & vertici largiter illitus, hosce dolores brevi subinde, maxime si interna præmissa sunt, digerit & discutit.

IX.

In aliis, præsertim qui *calidioris sunt temperamenti*, egregie sæpe prodest unguentum alabastrinum temporibus illitum. *Pediluvia* quoque temperata & frictiones pedum revellendi & resolvendi fine hic egregia sunt. Si *menfes, vel hæmorrhoides, suppressi*, convenientibus remediis capite præcedenti indicatis, revocandi erunt, ubi *Vena Sectio* in pede ut plurimum valde egregia. *Parca dieta & frequens corporis motus* magis hic profunt tam præservandi quam curandi scopo, quam ingens sæpe medicamentorum farrago. *Salia volatilia*, spirituosa suaveolentia sive fragrantia, & balsama cephalica sive apoplectica vulgo dicta, *qua naribus hic ad-moveri & a multis valde commendari solent*, multis adversa sunt, caputque turbando sæpe plus nocent, quam profunt, præsertim frequentius aut immoderatus adhibita. *Idem de oleis destillatis*, præsertim succini & similibus intelligendum. In *plethoricis* aut in iis, in quibus *hæmorrhagia consuevit suppressa*, si prædicta medicamenta parum sunt, sanguis mittatur, isque in larga satis copia, ac præsertim in pede; in junioribus vero sanguinis missio rarius est necessaria, neque etiam in his nimis cito instituenda; nisi magna eam æquirat necessitas. Si *cephalalgia ab hæmorrhoidibus suppressis* oriatur, præter modo dicta, *hirudines* ano applicatæ utilissimæ sunt.

X.

De Otagia.

Otagia, tinnitus aurium, & auditus difficilis eandem agnoscunt causam: (nisi forte ab externa læsione orta sint) hinc in *Otagia*, quæ sæpe inflammationem habet comitem, interne eadem conveniunt evacuantia, diaphoretica resolutiva, diluentia, quæ in cephalalgia N. VIII. laudata sunt. Externe Spiritus vini camphoratus, præsertim crocatus, calide ad aliquot guttas cum gossypio auri imponatur, & post aures etiam illinatur, qui in *otalgia* potentissime resolvit, atque sic metuendam suppurationem & ulcus auris sæpiissime impedit. Vel *Oleum amygdalarum amararum* cum pauca camphora gossypio vel linteo carpto eodem modo adhibitur, super imposito in usu utriusque *sacculo calido* ex herbis resolutivis, ut rad. irid. Florent. herb. salviæ, pulgii,

*Otagia
atque au-
rium affe-
ctus.*

legii, serpilli, origani, flor. chamomillæ sem. carvi, sceniculi, cum camphora. In sanguineis etiam missio sanguinis ut plurimum necessaria est. Quando vero *his congestio aut inflammatio resolvi nequit*, & ad suppurationem spectat, *cataplasma leniens & emolliens, ex mica panis cum lacte & croco coctum, vel cepa sub cineribus assata*, aliave similia calide sæpius admovenda, donec sponte rumpatur; vel si *abscessus oculis patet*, scalpello aperiri queat. *Pediluvia quoque & frictiones pedum hic etiam valde profunt. Præservandi sine eadem*, quæ in cephalalgia aliave quacumque congestione præservanda N. VI. hujus capituli laudavimus, hic quoque conducunt.

XI.

De Tinnitu & susurro aurium.

Tinnitus aurium. In Tinnitu & susurro aurium revellendi scoppo primo alvus ducenda, deinde pulveres temperantes diaphoretici, & Essentiæ resolventes, vulgo *anticatarrhales* dictæ, ut succini, lignor. rosmarini, diaphoretica, alexipharmaca, &c. aliquoties in die exhibeantur, eisque infusum Theæ, veronicæ vel betonicæ cum flor. rosmarini, salviæ aut lavendulæ & lign. sassafr. interponatur: & quidem ita, ut matutino tempore & circa meridiem Essentiæ, circa vespæram vero & noctu pulveres laudati interne usurpentur.

EXTERNE Essent. succin. vel sola vel cum castor. cum paucis guttis olei succini vel chamomillæ remixta, ad guttas j. vel ij. tepide cum gossypio mane & vespæri auri immittantur. Vel *ambra & moschus vel castoreum* ad gr. j. vel ij. in gossypio, vel etiam solum balsamum Peruvianum; vel olea carminativa, ut anisi, sceniculi, carvi aut chamomillæ, eodem modo usæpata, multis egregie profunt: non neglectis *pediluviis & fricationibus pedum ac capitis* frequentibus. Vapor decocti *florum lavendulæ vel rosmarini* cum vino facti, auri per infundibulum admissus, multis etiam optime hic profuit. Quo pertinacior vero aut magis inveteratus est hic affectus, eo magis ac potissimum in plethoricis V. S. præsertim in *pede*, interpolatæ *scarificationes & repetita purgantia* ad revellendum & utilia & necessaria sunt.

XII.

De Auditu difficili.

In *auditu difficili* eadem fere curandi ratio optima est: *Auditus difficilis.*
 Speciatim vero, præter modo recensita valde hic conducit 24.
 Sal. vol. CC. ʒi. medull. castor. optim. gr. vi. ol. succin. gutt.
 ij. M. F. massa, de qua lentis aut pisi magnitudo cum gossypio mane & vesperi auri applicetur. Vel

24. Ess. succin. ʒi.

castor. ʒi.

ol. dis. chamomill. ʒss.

succin. gutt. j. M. & cum gossypio tepide bis

vel ter quotidie adhibeatur.

Si a *mensium fluxu suppresso*, sicuti apud mulieres aut puellas sæpe contingit, hæc mala oriantur, debitis remediis ac dicta hic restituendus & in ordine conservandus. Si ab hæmorrhoidibus suppressis, hæc revocandæ, vel hirudines ano applicandæ; vel Venæ sectiones ac scarificationes in horum locum substitutandæ. Quando ab *obstructione meatus auditorii*, ea quæ obstruant, idoneis instrumentis sunt auferenda (a). In *senibus*, quibus sæpe ob virium debilitatem auditus læditur, itemque in malo valde inveterato, vel connato aut hæreditario, aut ubi externa læsio, ut tympanum ruptum morbum inducit, medicamentis ut plurimum nihil efficitur; interea tamen senibus ac debilibus roborantia, cephalica & ambrata pro capite & viribus roborandis hic sæpe conveniunt. Interdum tamen post multos annos auditum amissum sponte sine medicamentis & ex improvviso nonnullis rediisse aliquoties expertus sum: adeoque non mox desperandum. *Sanguinis missiones, scarificationes & purgantia* subinde usurpata; atque ordinata ac moderata dicta, vitando abusum vini aliorumque inebriantium, cum motu frequenti, itemque *aqua medicata* æstivo tempore legitime haustæ, tam ad *preveniendam*, quam ad *sanandam hæc aurium vitia* quam plurimum, immo sæpe plus conferunt, quam omnia quævis alia medicamenta, ut in me ipso sæpe edoctus sum, qui ultra viginti annos per intervalla his malis conflictatus fui.

[a] Quia de re conf. Instit. chirurg. nostræ.

XIII.

Odontalgia.

Odontalgia.

ODONTALGIA vel post dentis erosionem, per quam acria ex alimentis vel aer in cavum dentis irruunt, ejusque membranam internam & nervum afficiunt; vel a congestione sanguinis circa dentium etiam sanorum radices & alveolos oritur. Illa vix constanter tollitur, nisi dens erosus sive vitiosus manu chirurgica, si tuto id fieri possit, evellatur, vel acidis mineralibus erodatur. Sopitur tamen quoque sæpe vel applicata provide guttula una vel altera aquæ fortis aut spiritus vitrioli in cavum dentis erosi, vel olei piperis, caryophyllorum, aut lini quaiaci, vel per se ope penicilli immissi; vel cum opio & camphora in forma pilulæ denti cavo inserti, & subinde, si dolor non cedit, repetiti. Quandoque egregie prodest Essentia succini vel ligni quaiaci, vel nitri portiuncula denti immissa, præsertim si interna mox laudanda simul adhibeantur; vel si hæc parom proficiant, tollitur sæpe apte ferro candente, denti cavo admoto: & ne malum facile redeat, cavum dentis cera, mastiche, plumbo vel auro, si fieri possit, apte repleatur, quo ingressus peregrinorum advertatur.

XIV.

Ubi vero dens non erosus, ibi ad sanguinis congestionem, tanquam causam primariam, resolvendam & orgasmum temperandum, pulveres temperantes, diaphoretici, antispasmodici, ex tartaro vitriolato, nitro & cinnabari, ex aquis diaphoreticis, singula hora vel bihorio, exhibeantur, corpus ab aere & frigore præservetur, atque infusum Theæ cum ligno sassafras vel quaiaco sæpius sorbilletur, sic intra aliquot horas hos dolores sæpe superavi. Interca tamen simul decoctum florum chamomillæ, cum lacte paratum calide sibiade in ore detineatur, & sacculi ex herbis resolventibus, præsertim chamomilla, cum vel sine camphora, genis imponantur. In valde plethoricis, aut ubi consuevit sanguinis evacuationes neglectæ vel suppressæ, sanguinis missio egregie prodest. Præter antea laudata, sal anglicanum vel catharticum amarum in ore detentum & sensim liquefactum congestiones has sæpe solvere & dolores hos quoque hæud raro sedare solet. Nonnullos ab hoc dolore liberat, si dentes ligni frustulo, fulmine tartari, vel e cæmeterio deprompti aliquandiu fricent, & cumprimis donec gingivæ aliquid sanguinis fundunt, &c. Si his non cedat, id quod tamen plerumque fieri solet, versus nasalem lenia opiata prædictis pulveribus antispasmodicis admisceantur.

ſceantur: mane vero, revulſionis gratia; *idoneum purgans* exhibeatur, & poſtea Eſſentia ſuccini cum Eſſentia pimpinellæ remixta; pulveribus illis interponatur. *Genæ dolenti* exterius & ſpiritus vini camphoratus cum fructu tepide applicatur; præſertim ſi deinde prædictis ſacculus ex floribus chamomillæ; vel ex farina & camphorâ calide ſuperimponatur: *Uſtio antitragi auris*; ſæpius, ut varii auctores teſtantur; pertinaciotem odontalgiam ſubito ſuſtulit, id quod tamen non ſemper præſtat; itemque *Veficatorium* vel ex cantharidibus vel raſura radicis amoraciæ flexuræ cubiti in latere affecto applicatum: *Alvus in hoc morbo ſemper aperta*; quantum fieri poteſt, fervetur; & non facile dens integer, ob varia inde metuenda mala; evellatur: *In declinatione* parum titillatur odontalgicæ Myſſichti; Wedelij, Lactæ vel Eſſent. ligni quaiaci, ore ſubinde detentum egregie prodeſt diſſipando, gingivamque laxam roborando; ne tam facile redeat.

XV.

De Vertigine.

VERTIGO ſæpe a congeſtione ſanguinis in capite apud *Vertigo:* *plethoricos* oritur, vel apud eos, qui evacuationes ſanguinis artificiales conſuevas omiſerunt, vel in quibus conſuetæ ſanguinis evacuationes ſpontaneæ ſubſtiterunt; vel & in eis, qui multis ſtudiis caput valde debilitant; hæud tarò tamen etiam a *cruditatibus*; aut pravis humoribus; præſertim bilioſis, ab ira prægreſſa; aliavé de cauſa in ventriculo hærentibus: Si a priori cauſa, evacuantiâ, laxantiâ; Venæ ſectio in pede, pediluvia, pulveſque reſolventes; temperantes; cinabarini, nitroſi, una cum infuſo herbæ Theæ vel Betoniæ; curationem ut plurimum abſolvunt: Sed ſi *ſuppreſſiones fluxus conſueti ſanguinis* in cauſa; hi, ſi fieri poteſt; modo in capite IX. §. 4. & ſeq: propoſito; reſtituendi ſunt: Sin vero hoc fieri non poſſit, miſſiones ſanguinis in locum eorum ſubſtituendæ: *Externæ* Spiritus vini camphoratus vel ſolus; vel cum ſpiritu cornu cervi mixtus, vertici & temporibus ſæpe illinatur; naribus vero aqua Reginæ Hungariæ vel Anhaltina, vel ſpiritus lavendulæ, aliuvé ſimilis; cum vel ſine ſale volatili oleoſo, aut ſpiritu C. C. ſubinde admoveatur: Idem faciendum externe; ſi a nimis ſtudiis malum ortum traxit: ubi vero ſimul moderatio in ſtudiis probe obſervanda; cum modica diætâ & motu frequenti; *hauſtulus quoque vini in paſtu præſertim*, aliaque roborantia modice uſurpata, optime conducunt. A nimis vero volatilibus & fra-

grantibus spiritibus, aut balsamis ita dictis cephalicis & apoplecticis externe adhibitis multi eruditorum magis læduntur; hinc caute hæc tentanda.

Si vertigo a cruditatibus ventriculi ortum ducat, hæc per digestiva sive salia media primum præparentur ac solvantur, & deinde vel per os vomitu, vel si quid vomitum vetat, per alvum evacuentur. Postea stomachica roborantia, cephalica, usus modicus vini generosi in pastu, pro ventriculo & cerebro roborandis, motus sive exercitatio corporis, & dicta parca atque aromatica subjungantur. *Usus aquarum Pyrmontanarum* aliarumque ejusmodi martialium hic quoque egregie benefacit.

XVI.

De Pthifis.

Pthifis. PHTHISIS, sive ulcus pulmonis cum tæbe, tussi, rejectione materiæ purulentæ & non raro sanguinolentæ, febris hectica, spirandi difficultate, vel a prægressa hemoptysi, vel a congestionibus & suppuratione sanguinis in pulmonibus oritur; quæ, si perfecta & inveterata, vix unquam; incipiens quidem interdum, attamen raro & difficulter curatur. Indicationes primariæ hic sunt; ulcus mundare & consolidare, congestiones resolvere & avellere, tussim & febrem moderari, & vires conservare.

Igitur *præmissis* & subinde repetitis *lenibus laxantibus*, præsertim ex tamarindis, foliis fennæ & manna paratis, vel magnesia alba aut rhabarbaro pro affluxu nimio a pectore revellendo, maxime conducunt, 1. *Infusa & decocta ex radicibus & herbis pectoralibus*, temperatis expectorantibus, resolventibus atque traumaticis: ut radic. liquirit. malvæ, chinæ, cichorii, pimpinellæ, irid. Florent. helenii, herbis veronicæ, scabiosæ, capilli veneris, hyssopi, pulmonariæ, tussilaginis, virgæ aureæ, solidaginis saracenicæ, &c. cum passulis, dactylis, jujubis & ficibus; vel spec. pectoral. dispensatorii Brandenburgici vel Augustanorum, cum herbis pectoralibus prædictis, vel species nostræ pectorales, his aut ter in die, ut infusum Theæ, usurpata. 2. *Salina resolventia*, abstergentia, & temperantia, ut tartarus vitriolatus, & lapides cancrorum vel conchæ succo limonum vel citri saturati, &c. cum pauco nitro ex aquis pectoralibus bis in die, & potissimum vespere assumpta. 3. *Blandissima balsamica* hic subjungantur; ut Elixir. pectorale Wedelii ad guttas xxx. vel xl., vel balsamum peruvianum, aut balsamum de Mecha,

tha; aut opobalsamum in forma elæosacchari, sed parcis-
sima copia, ne febrem augeant; id quod etiam observandum
in usu balsam. Locatelli vel Meimobii. Tutius vero 4. In-
terponuntur *Gelatine* ex C. C. & eborè paratæ, itemque e-
mulsiones temperantes & roborantes ex amygdalis cum pistä-
ceis, pineis & semine papaveris albi. Contra *russis vehementi-*
siam, si emulsio non sufficit, *lene opiatum* circa vesperam
cum lapidibus cancrorum citratis, aut pulverè temperante
quandoque exhibeatur, ut massa pilul. de styrace, vel de cy-
noglossa a gr. ij. iij. ad v. vel laudant opiati gr. j. Quidam
cum STAHLIO hic valde laudant *extractum tabaci* longiori
coctione paratum ad gr. iij. vel iv. mane in lecto assum-
tum. 6. *Pediluvia tepida* sæpe revellendi causa cum fructu
adhiberi possunt. 7. Circa æquinoctia, immo in non-
nullis sæpius, *larga Vene sectio*, si vires permittunt, in pe-
de instituat. 8. *Usus charosolii* in cibis sit frequens; *sali-*
ta, vero, *spirituosa*, nimis *calescencia* & *acida*, præsertim
ex mineralibus parata, nocent. 9. Ubi *phthisis in sexu mu-*
liebri a mensium suppressione oritur, hi restituendi sunt, aut
si in puellis junioribus nondum apparuerunt, eorum proveni-
tus, modo supra Cap. IX. §. VIII. propõsito, promoven-
dus, quorum beneficio fit, ut plures feminæ a phthisi &
hectica curentur quam viri. 10. *Quando ægri tales post usum*
ejusmodi remedium melius se habent, & ambulare rur-
sus possunt, medicamentis continuo non sunt obtuendi;
sed sufficit tunc aliquandiu, *bona ac parca dieta*, & *mò-*
tus frequens, sed moderatus, ambulando, equitando, cur-
su vehendo; quandoque tamen infusum quoddam pectorale
loco Theæ cum aliquot guttulis Elixirii vel Essentiæ cujus-
dam pectoralis, verb. grati ex extracto veronica; in aqua
pectoralis soluto, mane apte adhiberi potest; vesperi vero
pulveris temperantis ℞j. vel 3℞., cum vel sine china, præ-
sertim quando forte calorem paullo auctiorem sentiant; do-
nec forte nova mala, nova rursus remedia desiderent: sic præ-
dicto regimine plus sæpe efficitur, quam continua aut in-
genti medicamentorum farragine. Conducit etiam egregie
alvum vel victu idoneo vel lenibus remediis semper servare
laxam, nisi per se respondeat.

11. *Aque Emfenses & Sclerenfes*, præmissis laxantibus,
præsertim cum tertia vel quarta parte lactis quotidie mane
per aliquot hebdomades calidæ haustæ, multis in malo re-
centi vel saltem non adeo vehementi, egregie profuere,
præsertim si ambulare adhuc possunt; aquæ martiales,
ut *Pyrmontane*, *Egrane*, *Swalbacenses*, *Spadane*, &c. phthi-
sics huc usque quidem a plerisque funestæ habitæ fuerunt;
attamen observationes recentiores me aliosque docuerunt,

quod in malo recenti aut leviori iis tuto & cum fructu etiam uti queant, si modo tepide & modice bibantur; frigide vero, ob frigus pectori inimicum nocent. Cura denique ita di-
ta lactea, præsertim lactis asinini, vel caprilli, vel ferilactis, itemque lactis ebutyrati quandoque valde etiam nonnullis conducit, si diu satis cum bonâ diætâ & corpore rite præparato, continuatur. Eadem fere methodus medendi, omissis balsamicis, optima quoque est in *hæctica*, quæ sine ulcere pulmonis est, vel etiam cum ulcere renunt conjuncta.

XVII.

De Vomica, & Empyemate.

*Vomica &
Empyema.*

In VOMICA pulmonum eodem fere modo curatio quæque est instituenda; inprimis vero per infusa vel decocta expectorantia atque traumatica cetera remedia antea laudata, ulcus abstergendum, mundandum & consolidandum interpositis subinde lenibus alvum ducentibus, præsertim ex *manna paratis*, vel ex *magnesia alba*, ad affluxum ad pectus avertendum, Venæque in plethoricis in pede idoneo tempore secanda. Reliquum per laudata decocta pectoralia, blanda *balsamica*, & bonam victus rationem perficitur, vel & per aquas medicatas §. XVI. cum lacte.

EMPYEMA sine matura incisione sive paracentesi thoracis curari non potest; (de qua vid. Instrut. nost. chirurgic.) interne iisdem adhibitis, quæ in phthisi & vomica modo commendavimus,

XVIII.

Malum Hypochondriacum.

*Malum
hypochondriacum.*

Malum Hypochondriacum plerumque consistit in congestione sanguinis abundantis & spissioris in hypochondriis, sive in visceribus cum Vena portæ communicantibus: unde in eis stagnationes, distensiones, molestiæ, dolores, spasmi, flatus, obstructions alvi, animi morositas, tristitia & ipsa sæpe melancholia, cum variis aliis miris atque inexplicabilibus subinde symptomatibus, oriuntur, ubi sanguinis abundans in vasis venæ portæ & cumprimis hæmorrhoidalibus congestus, prædicta symptomata inducit, maxime si per vasa hæmorrhoidalìa exitum invenire non potest.

XIX.

XIX.

Quod ad curationem hujus morbi attinet, in paroxysmo, *Cura in*
nisi alvus jam sit aperta, enemate aperiatur emolliente, vel *paroxys-*
leni purgante, præsertim salino, ex sale amaro cathartico,
anglico vel bohémico, eodemque, quoties diutius, quam par
est, obstructa est, aperta servetur. Deinde ad humores visce-
dos resolvendos, & symptomata minuenda salia media dige-
reptia sive digestiva dicta, ut tartarus vitriolatus, tartarus
tartarizatus, arcanum duplicatum, nitrum antimoniatum,
vel sal absinthii cum cinnabari & lapidibus cancerorum acido
tartari vel citri saturatis, vel pulvis temperans noster,
quotidie ter, quaterve ex aquis idoneis exhibeantur; vel
etiam liquor terræ foliatæ tartari a guttis xl. ad lx. mane
cum infuso Theæ aliove simili, propinetur, atque aliquandiu
cum parca dieta, potu tenui, sufficiente, & exercitatione cor-
poris continetur. Quæ vero si non sufficiant, ad paroxys-
mum minuendam, *Essentia millefolii vel adianthi albi*, ho-
rumque decoctum sive infusum ad modum Theæ prudenter
exhibeantur, ita brevi plerumque magnum ægri levamen
percipiunt.

XX.

Extra vero paroxysmum, vel in malo graviori, etiam in *Extra pa-*
paroxysmo aut eo saltem aliquomodo remittente, 1. Quantita-
tas sanguinis crassi est imminuenda per Venz sectionem, præ-
sertim in pede, quæ deinde circa æquinoctia, vel in valde
sanguineis, sæpius repetenda. Vel utilissime etiam hic san-
guinis quantitas, natura sæpe cum successu monstrante viam,
imminuitur per hirudines ano applicatas, in primis quando
æger jam antea forte hæmorrhoidibus laboravit, vel dolo-
res circa lumbos & os sacrum percipit. 2. Sanguis viscidus
& spissus est attenuandus: quod optime fit primo idonea
dieta, ut cibo parciore, tenui & facilis digestionis, potu
diluente sufficiente, & motu frequenti, sed moderato, quæ
optima sunt hypochondriacorum remedia. Quibus tamen addi
possunt pulveres & infusa ex vegetabilibus, præsertim radi-
cibus & herbis incidentibus atque attenuantibus, ut, radi-
bus iridis Florentinæ, cichorei, caryophyllatæ, taraxaci,
pimpinell. alb. vincetoxic. apii, ari, &c. herb. fumarum,
scopolendriæ, linguz cervinæ, hepaticæ, capilli veneris,
adianthi albi, card. bened. melissæ, flor. millefolii, cum
lenibus aromaticis, ut cinamomo, cassia caryophyllata, cort.
culilaban, santalo citrin. scœnanth. aniso stellato, lign. saf-
saf. &c. Præterea cum his infusis assumi possunt tinct. tarta-
ri, tinct. antimonii tartarizata, liquor terræ foliatæ tartari.
Essentia corticis aurantiorum, pimpinellæ, scordii, gentian.
helen. absinth. & similibus, interpositis, præsertim vesperi,

antea laudatis salibus digestivis; quibus vero subinde *lene laxans* vel ex infuso rhabarb. & foliis fennæ, vel ex pilulis gummosis *Sylvii*, tartareis *Bontii* vel *Quercetani*, vel *Beccheri*, polychrestis nostris, aut Sal Anglicanum, vel amarum catharticum, apta dosi, quando res sic postulat, interponendum.

XXI.

Symptomatibus gravioribus sic debellatis, tandem, ad sanum partium denuo roborandum, lenia martialia, ut tinctura vitrioli martis, tinctura martis cydoniata, vel mixtura ex spiritu C. C. & tinctura tartari, vel etiam crocus martis, vel ipsa limatura martis subtilissima a gran. v. ad vii. aut cum elæosacchar. Ess. aut cum extractis amaris mane & circa vesperam exhibita, præ omnibus autem fere *aque martiales medicatae*, ut *Pymontanz* aliæque similes, legitime usurpatæ, hic conducunt. Immo etiam hæc martialia in malo graviore sæpe jam cum successu usurpantur, & apud Germanos valde celebres sunt, nomine *curationum martialium*. (*Stablecurenn.*)

XXII.

*Præservatio
mali hypo-
chondriaci.*

Præservatio optima hujus mali consistit in parca diæta, potu tenui sufficienti, aquoso, inprimis etiam feri laetis, (a) motu frequenti, temperantia in studiis, præsertim incubrationibus, & Venæ sectione circa æquinoctia; quæ, qui rite observat, non facile malo hypochondriaco rursus afficietur. In multis etiam *usar legitimus aquarum medicatarum*, æstivo præsertim tempore, multo cum fructu quandoque interponi, immo sæpe præsentibus etiam symptomatibus usurpari potest.

XXIII.

De Malo hysterico.

*Passio hy-
sterica.*

Malum hystericum sive *passio hysterica* idem fere est in mulieribus, quod in viris malum hypochondriacum, sed illas, tanquam corpora teneriora, vehementius affligit, & sæpius eis sæpe constrictionis pectoris & suffocationis sensum, (unde & suffocatio uterina sive hysterica dicitur) multos *spasmos*, motus convulsivos, (unde *epilepsia uterina*) *anxietates majores*, *nauseam*, *conatum vomendi*, *vomitum ipsum*, aliæque graviora symptomata inducit.

XXIV.

(a) Hoc etiam sua experientia confirmat cel. Frid. Hoffmann. Dissert. de feri lactis virtute, aliisque multis in scriptis.

XXIV.

Oritur quoque præcipue, ut mihi saltem videtur, a congestione sanguinis in abdomine, & speciatim in visceribus hujus cum vena portæ nexis, exitum per uterum vel vasa hæmorrhoidalia non invenientis: hinc eadem symptomata inducit, eademque fere ac mali hypochondriaci & prognosis & curatio est. *Interdum tamen quoque observatur mensibus vite se habentibus*, & tunc forte ab humoribus acerbis primarum viarum, spasmos illos excitantibus, ortum trahere videtur.

XXV.

In paroxysmo, præsertim ubi sensus strangulationis vel suffocationis, vel motus convulsivi epileptici, vel animi deliquia adsunt, medicamenta foetida & volatilia, ut spiritus C. C. liquor. C. C. succinat. Essent. castorei, vel ipsum Castoreum, spennæ perdicum, vel frustum corii aut cornu accensum, ad eas excitandas naribus admoveantur, & guttæ aliquot prædictorum spirituum foetentium vel per se, vel cum liquido quodam aquæb. ori infundantur: ubi & vellicationes pilorum, nasi, aurium, atque frictions pedum ac manuum cum pannis asperis, vel excutitis & setis porcinis confectis, utiliter adhibentur, donec ad se redeant.

XXVI.

Extra paroxysmum eodem fere modo ut in malo hypochondriaco, §. XIX. & XX. procedendum; ita tamen ut Essentis vel pulveribus salinis & cinnabarinis semper aliquid castorei addatur, nisi ægra id forte, ut subinde fit, aversetur. Deinde opera danda, ut mensium fluxus, si adhuc suut in congrua ætate, restituantur. Sed si non amplius sint in ea ætate, qua menses restitui queant, aut si trialum vehementius, Venæ sectio in pede instituat, & postea Venæ sectiones æquinoctiales, & subinde adhibitæ purgationes lenes, præsertim pilulis lenibus uterinis balsamicis, vel sale amaro cathartico præservandi sine non prætermittant, observata simul legitima victus ratione.

XXVII.

Emetica his exhibere, aut purgantia fortiora, summe periculosum esse sæpius observatum est. *Calidiora quoque medicamenta*, Elixiria uterina, olea distillata ejusmodi, itemque salia volatilia oleosa valde etiam hic plerumque sunt noxia. *Absorbentia* sive terrea ac cretacea medicamenta, nullam quoque his in malis utilitatem afferunt: quia acidum hic vel non peccat, vel saltem causa præcipua non existit; sic & *martialia* a quibusdam adeo decantata, forte ob vim stypticam & difficilem digestionem etiam hic sæpe vel nihil efficiunt vel omnino nocent, præsertim

tim si non quam cautissime usurpentur; interea tamen quibusdam egregie profunt, adeoque caute tentanda. Verum *aque minerales, mariales*, præsertim si prius Venæ sectio in pede præmittuntur, atque modice & non nimis frigide bibuntur, ac motus sufficiens subjungitur, optimos sæpe effectus præstant; *debilioribus* vero, præsertim si *frigide* ac nimia copia, aut neglecto motu, hauriantur, sæpe nocent; sed hæc debiliores quoque optimo cum successu aquis medicatis temperatioribus, quæ salia media blanda, sine martialibus & vitriolicis particulis, continent, ut sunt *Emenses* aut *Selterenses*, præsertim calide haustæ, uti possunt, quia egregie sanguinem diluunt, attenuant, resolvunt & fluidam reddunt. Ratione dietæ idem ipsi quoque observandum; quod in malo hypochondriaco proposuimus. Denique sciendum hoc malum in quibusdam tam pertinax esse, ut omnium remedium vim fere eludat, & vix nisi tempore & patientia vinci queat.

XXVIII.

Obstructiones Hepatis & Lienis.

Obstru-
ctiones he-
patis &
lienis.

Obstructiones sive infarctus hepatis & lienis eandem causam ac præcedentes duo morbi agnoscunt, ideoque hæc mala eodem etiam fere modo curanda, interponendo simul sæpe medicam *mercurii dulcis* portionem; vel & *sapōnis veneti* usum copiosum. In mulieribus præcipue ad menses; in viris vero ad hæmorrhoides obstructas respiciendum, ut earum fluxus, si fieri possit, restituitur, vel si nondum adfuerit, excitetur. Sed si hoc fieri non possit, & symptomata urgeant, Sanguis Venæ sectione, hirudinibus ano applicatis, aliisque evacuationibus artificialibus evacuetur. Externe *emplastrum diaspōnis*, vel de gummi ammoniaco, de cicuta, diaphoret. Mynl. vel diachylon cum mercurio roboratum, calide lateri ægro sive dolenti applicandum, quandoque oleo capparum, vel unguento dialtheæ calide fricandum. *Venæ sectio in pede*, potus sufficiens temperatus, motus corporis frequens, & cumprimis equitatio, ac dieta immoderata ac tenuis, itemque *aque medicata* ac balnea temperata, præcipua horum morborum, si curationem adhuc admittunt, sunt remedia.

XXIX.

Scirrhus Hepatis & Lienis.

Scirrhus hepatis & lienis inveteratus nullam admittit melam, hinc præstat eum intactum relinquere. Recens vero, præmisso laxante idoneo & Venæ sectione in pede, eodem regimine ac victus ratione, iisdemque remediis §. XXVIII. indicatis subinde adhuc curatur, resolventibus nimirum radicibus, herbis, sub forma infusi, salibus, digestivis, gummatibus, &c. interne & externe adhibitis, quibus & mercurius dulcis moderata dosi resolvendi sine utiliter vel admiscetur, vel interponitur, vel & sapo venetus. Sæpius etiam *aqua medicata*, si rite usurpantur, hic magnam quoque adhuc utilitatem afferunt, quia potenter sanguinem ipsi resolvunt & obstructions aperiunt.

Scirrhus hepatis & lienis.

XXX.

De Atrophia.

Atrophia vi vocis quidem *quancumque corporis tabem* significat: attamen hodie speciatim & proprie sumi solet pro ea tabis specie, que ab obstructione glandularum in mesenterio oritur, atque ut plurimum a congestione sive ab infarctu glandularum ejusdem præcipue in infantibus sive pueris, provenit, ab humoribus viscidis ibi congestis ac quiescentibus; hic eorum venter plerumque multum tumere & inilatus esse solet.

Atrophia.

In curatione igitur requiruntur 1. Pro cruditatibus primarum viarum evacuandis, laxantia moderata, eaque in progressu curæ subinde repetita: quibus semper parum mercurii dulcis admisceatur. Infantibus junioribus pulvis jalapæ cum tartaro vitriolato vel mercurius dulcis, vel syropus de cichor. cum rhubarbo hunc in finem apte exhibetur; cui, si hic nimis debilis, pulveris jalapæ aliquot grana addantur. Adultioribus etiam Sal Anglicanum vel amarum catharticum Germanicum vel Bohemicum, vel pilulæ, eaque præsertim mercuriales, cum fructu dari possunt.

2. Attenuantia, digerentia sive resolventia eadem, quæ in malo hypochondriaco §. XIX. & XX. vel modo §. XXIX. laudata sunt, infusa nimirum, pulveres & essentia; ubi etiam cum primis *specificum* sive *pulvis antatrophus* Secretæ, (a) aliufve similis egregius est. Ut

24. rad.

[a] Descriptio hujus pulveris vid. in *Lensili Miscell. Med. pract.* part. III. p. 59. Kanig, Select. Remed. pag. 67.

24. rad. irid. flor. ʒʒ.

ari

tart. vitriolat.

fulig. splend.

lap. 69. ppt. a. ʒij.

sacchar. alb. ʒʒ. M.

de quo aliquoties in die dos idonea exhibeatur. Si infantes adhuc sugunt, nutricibus quoque talia remedia simul sæpe exhibenda, bonaque dicta ab ipsis servanda.

Externe, quia abdomen eorum plerumque valde tumet & durum est; conducit emplastrum diaspionis, vel de ammoniac totum abdomini imponere, illudque subinde oleo laurino calido probe fricare sive inungere. *Balnea* quoque aquæ dulcis tepida, ex aqua pluviali aut fluviali, vel simplicia, vel cum herbis aromaticis parata, multa cum corporis & artuum frictione, dum in balneo sedent, sæpe usurpata, itemque frequens motus in curru puerili aliave idonea machina, his ægris egregie conducunt.

XXXI.

Si atrophia hæc, ut sæpe fit, simul a *vermibus* oriatur, hi anthelminticis amaris, & speciatim semine fantonii sive cinæ cum melle exhibitio, aut vino Hispanico infuso, vel myrrha, vel radic. silicis, summitatibus absinthii, floribus tanacetii cerevisiæ injectis, vel mercurialibus, speciatim *æthiope minerali*, vel, qui hoc præstat, *mercurio dulci*, & laxantibus sensim destruendi atque expellendi.

XXXII.

De Rhachitide.

Rhachitis.

Rhachitis (quæ atrophia est cum spinæ & articulorum deformitate) cum ex eadem causa, cui sæpe aliquid veneri admixtum est, oriri videatur (a); iisdem etiam remediis attenuantibus, resolventibus & aperientibus, speciatim vero infusis vegetabilium laudatorum, tinct. antimonii tartarizati, tinct. vitrioli martis Ludovici, pulvere antatropho Scretæ, vel pulvere ex salibus digestivis, rad. ari & iridis Florentis sicut §. XXX. commendavi, vel & ex illis & semine anisi, fœniculi, cinnamomo & croco martis sulphurato parato, interpositis subinde lenibus laxantibus mercurialibus, curanda qui-

(a) Hunc morbum tam novum non esse, ut vulgo creditur, alias in schedia(mate docui, quo ostendi, infantes olim pro a diabolo superpositis habitos; revera nihil aliud, quam infantes rhachiticos fuisse; Anno 1723.

quibus *externe* spiritus aut linimenta nervina, pro spina dorsi inungenda; ex spiritu rosmarini, serpilli, matricali, aqua Anhaltina & similibus adjungantur, non omisiss, ubi opus est, *idoneis machinis* pro spina dorsi & cruribus curvis emendandis. In *dieta*, crassa, cruda, farinosa, legumina, & prae omnibus nimia repletio vitentur, curruque puerili, vel alia commoda ratione saepius moveantur, non neglectis *balneis* frequentibus tepidis & fricationibus congruis, in atrophia antea laudatis: quam methodum etiam recens scriptor medicus (a) peculiari scripto de *Atrophia infantum* valde laudat: praesertim si frictiones in balneo semper fiant manu humida, farina triticea prius imbuta, pro sordibus & obstructionibus foraminulorum cutis abstergendis atque aper-
rendis.

XXXIII.

De Calculo.

CALCULUS & renum & vesicae ut plurimum quoque *Calculus.* tum suum trahere videtur ex congestione & stagnatione sanguinis crassioris in renibus; unde tandem calculus, primo renum, deinde & vesicae emergit, atque gravissima symptomata, ut dolores, nauseam, vomitum, obstructionem urinae, convulsiones, inflammationes, &c. producit. Vesicae tamen calculus etiam saepe, praesertim in pueris, oritur in vesica, salvis renibus, quando particulae terrestres & viscidae sive glutinosae ibidem haerent atque concretescunt.

XXXIV.

In *Curatione* primum semper respiciendum utrum paroxysmus adsit, an a paroxysmo aeger liber sit, atque pro-
*Curatio in paro-
xyfmo.* pterea curatio varianda. In *paroxysmo calculi*, sive renalis sive vesicae, ante omnia alvus per clysteres ex decocto florum chamomillae vel veronicae cum lacte & melle vel saccharo paratos solvatur, iique per aliquot dies, si malum non remisit, licet alvus non sit obstructa, spasmos leniendi causa, quotidie repetantur; ita dolores plerumque egregie demulcentur. Nonnulli, praesertim in calculo renum, magnum levamen sentiunt, si mox in principio paroxysmi fol. sennae ʒʒ. vel cum aqua vel cum cerevisia tenui ʒʒ. leniter & per momentum decoquant, addito paucō saccharo vel mannae, mane per unum alterumve diem
ebi-

(a) *Cbudenius* scilicet celebris Medicus, olim in Marchia veteri, nunc in Ducatu Luneburgico.

ebibunt. Alias mox post clysterem vel etiam post operam
tionem purgationis finitam, exhibeantur *pulveres temperan-*
tes aut *antispuumodici*, ex tartaro vitriolato, nitro depura-
to; lapidibus cantorum, acido citri saturatis; & cinnabari
nativa; vel antimonii vel etiam ipsa vulgari; parati; de
quibus singulo bihorio ℞j. vel in rubustioribus ℞℞. donec
calculus expulsus, vel dolores remittant; ex aqua vel deco-
cto convenienti, agro porrigatur. His *diluētia & lubrican-*
tia calida, ut *infusum* Theæ, virgæ aureæ, hederæ terre-
stris, Coffeæ, Rad. cichorii, liquiritiæ, malvæ, althææ;
pareiræ bravæ aut seminis lini interponantur, (a) ut & e-
mulsiones dilutæ ex amygdalis dulcibus & semine papaveris
albi; quandoque lubricantia atque emollientia, ut olei a-
mygdalarum dulcium vel olei papaveris albi vel olei lini
subinde cochlear. j. ij. vel tria in robustioribus exhibeantur;
item *decoctum nephriticum* Foresti; aut aliud ex vegetabilibus
peccoralibus & lubricantibus paratum; quale nostrum est de-
coctum pectorale; egregie profunt: de quibus quandoque
haustum vel cyathum unum alterumve assumant. In dolo-
ribus vehementissimis *anodyna* parva dosi, ut præter sem. pa-
paveris albi in emulsionibus laud. opiat. aut mp. de cyno-
glossa laudatis pulveribus adjungantur. Vel *liquor terræ so-*
linte tartari cum quinta parte laud. liquid. Sindehami mix-
tus, & ad gutt. L. vel LX. subinde datus: Vel si *extract.*
flor. papav. rb. vel sem. papaver. albi ℞j. in liquore terræ
foliatæ tartari ℞℞. vel ℞j. solvatur, & eadem ratione per
intervalla exhibeatur, egregie his dolores leniuntur, & ta-
men calculi simul blande promoventur. Hoc papaveris ex-
tractum in frequentissimo usu loco opii est supra jam sæpius
laudato D. Wagnero, Medico Lubecensi famigeratissimo,
qui illud *opium Europæum* vocare; & egregios effectus in
quamplurimis morbis eo præstare solet: *Externe, balnea aque*
dulcis, aliæve emollientia, ut *oleum lumbricorum terrestrium*;
vel *scorpionum*; aut sacculi ex emollientibus herbis ac semi-
nibus confecti, vel cepæ assatæ, regioni dolenti calidæ sæpius
applicentur.

XXXV.

*Calculo-
rum ex-
tremum
curatio:*

*Si calculi exigui, tunc, his aliquandiu præmissis; leni-
pollentia* subjungenda vel conjungenda: ut præter modo lau-
datum liquorem terræ foliatæ tartari, tinct. tartari, vel
tart. vitriol. vel sal ammon. ad ℞j. vel ℞℞. subinde data,
vel

(a) *Infusum seminis lini* cum paucis saccharo ac lacte mirabiles
præstare effectus in doloribus leniendis, asseverat quoque Sydenham
Cap. de Calc. & Middleton. lib. de Lithotom. pag. 5.

vel fructus alkekengi, cynosbati, baccae juniperi, nuclei persicorum vel amygdalæ amaræ, VI. vel VIII. quotidie semel, bis aut ter comesti; vel in emulsione dati; (a) aut semen lithospermæ sive milii solis & violarum; vel in pulvere vel in emulsione; una cum balneis tepidis emollientibus & regimine temperato, exhibeantur. In calculis vero magnis a pellentibus abstinendum, & solum lenientia adhibenda. Denique remittente paroxysmo, quia ventriculus in eo ut plurimum debilitatur, stomachica temperata tursus sunt usurpanda.

XXXV I.

Extra paroxysmum sanguinis quantitas imminuatur per Venæ sectiones tempore æquinoctii; aut in sanguineis sæpius institutas; quæ valde hic egregiæ; & si forte hæmorrhoides suppressæ, hæ restituantur; aut hirudines ano applicentur; sin vero in mulieribus menses obstructi, hi propriis suis remediis sunt curandi. Quovis porro trimestri spatio aut pro rerum varietate sæpius; infusum laxans ex foliis sennæ, rhabarb. manna ac tartaro solubili potrigatur. Quotidie pro sanguine viscido diluendo & attenuando bis utatur potu Theæ, Coffeæ, Veronicæ, hedera terrestris, vitæ aureæ, vel consolidæ saracenicæ, cum quo subinde mane lig. terræ foliat. tartari gutt. L. assumantur. Potus reliquus sit cerevisia tenuis bene defæcata, vel aqua pauco vino mixta; aut decoctum hordei cum liquirit. passulis & aniso vel fœniculo; cui moderatus vini tenuis usus; si habetur; & æger ei assuetus est; interponatur. Vitet denique nimiam repletionem; & alimenta flatulenta, tenacia, cruda, viscida, farinosa, nimis calefacientia; iram, veneternque nimiam. Singulis hebdomadibus semel bis pro sanguine incidendo & temperando; circa vespèram utatur pulvere temperante; in curatione jam indicato, qui egregiè præservat. Ita & usus aquarum medicatarum legitimus vere vel æstate in calculis minoribus expellendis perquam est egregius. Medicamenta vero calculum præsertim majorem frangentia nondum certe cognita sunt; quamvis in Anglia nuper multum turperis remedium mulieris cujusdam, cui Stevens nomen, pro calculo curando & frangendo concitaverit; (b) hinc ubi calculus major in vesica

Extra paroxysmum.

(a) Ut R. nucl. persic. N. XVIII, amygdal. dulc. N. VI; aquæ fragar. ℥ij. F. Emulsio, add. sacch. posat. q. s. ad grat. sapor. D. sæpius haustus; quæ etiam egregiè in urina suppressa prodest.

(b) Conferri tamen meretur exemplum calculi majoris in vesica fracti, quod in Act. Anglican. descripti, & quo vim frangendi calculum in vesica non impossibilem esse cognovi; licet ille magis sponte aut vi naturæ, quam medicamenti fuerit comminutus.

sica hæret, medicamentis vix & non nisi sectione; in renibus vero nulla forte ratione tolli potest, nisi natura in dorso in renum regione sponte suppurationem aut abscessum moveat, per quem educi queat, qua de re vid. Instit. nostræ chirurgicæ.

XXXVII.

De Hæmorrhoidibus cæcis.

Hæmorrhoides cæcæ.

Hæmorrhoides cæcæ sunt congestiones & stagnationes sanguinis abundantis, in vasis laxis intestini recti, hæmorrhoidilibus dictis, ubi sanguis abundans congestus varia eaque gravia sæpe symptomata, cum primis vero dolores modo minores modo majores inducit. Duplici modo se exhibent: nam vel sub figura *tuberculi* aut *vesiculae*, sanguine atro repletæ, varicum instar, circa anam se manifestant, & sæpe non adeo vehementer dolent, immo quandoque fere indolentes sunt, interdum tamen satis insigniter dolent, & quoniam ad varicum naturam accedunt, *hæmorrhoides varicosæ* dici possunt; vel *durum inflammatorium tumorem*; ceu furunculum valde dolentem, profundius plerumque in ano sive in ipso intestino recto hærentem, constituunt, qui ægros misere sæpius & quandoque ad animi utque deliquium excruciat, atque facile in suppurationem & fistulam ani abit; hinc *hæmorrhoides inflammatorie cæcæ & dolentes* vocantur, a prioribus multum diversæ; cum illæ in suppurationem aut fistulam vix unquam abeant.

XXXVIII.

Curatio varicosa-vum.

In prioribus sive *varicosis* vesicula sive tuberculum vel digeritur vel sponte se aperit aut rumpitur, ac plus minusve sanguinis effundit, fiuntque sic ex hæmorrhoidibus cæcis fluentes; & vulnusculum vel sponte rursus glutinatur, vel curatio nil nisi spiritum vini balsamica eis superimposita requirit. Vel si non sponte rumpatur tuberculum, neque digeratur, sed ægro incommoda, præsertim in fœcibus deponendis creet, scalpello vel hirudinibus sanguis in eis stagnans educendus; aut si in cristatam vel verrucosam, ut quandoque contingit, naturam mutantur, vel per ligaturam vel per idonea rodentia remedia, vel etiam per scalpellum aut forficem auferendæ, & per balsamica deinceps curandæ sunt. Vid. Instit. chirurg. P. II. Cap. 67.

Curatio hæmorrhoidum inflamm.

XXXIX.

In hæmorrhoidibus inflammatis, primis quatuor diebus resolutio omni modo est tentanda: id quod fit 1. Venæ sectione

ne in pede, vel etiam in brachio, eaque larga, præsertim, ubi manifesta adest plethora aut calor ac dolor magnus. 2. Potiuncula laxante ex tamarindis, foliis sennæ, cremore tartari & manna, vel clystere emolliente; purgantia vero resinosa & aloëtica aliave calidiora sunt vitanda. 3. *Pulveribus temperantibus*, resolventibus, nitrosis, cinnabarinis sæpius datis, ut in aliis inflammationibus. 4. *Potu diluente*, aquoso, copioso, & emulsionibus, in aliis inflammationibus usitatis & laudatis: ubi etiam *infusum tenue millefolii* præ ceteris hoc in casu anodynum & resolvens specificum habetur præstantissimum.

Externe spiritus vini, cum vel sine camphora, calide cum linteis complicatis adhibitus, aut aqua calcis vivæ cum spiritu vini camphorato eodem modo usurpata egregie resolvunt ac leniunt. Ita quoque hic conducit celebre unguentum de linaria, vel oleum amygdalarum dulcium, vel lini, vel verbasci, vel ovorum sæpius illitum, vel unguentum nutritum ex Oleo solani vel rosarum cum aceto lithargyrifato paratum. *Globulus* quoque vel glans *ex butyro non salito*, tanquam suppositorium ano immissus, egregie etiam hic duras partes emollit & dolores lenit. VALENTINUS his in doloribus fœnum, sive suffitum *murium ita dictorum marinorum* ano exceptum valde commendat, (a) qui etiam sæpe non est contemnendus.

XL.

Si vero resolutio obtineri nequeat, vel tardius advocati sumus, *suppuratio cataplasmatibus emollientibus* lacte paratis est promovenda; quæ simulac aliquo modo facta, scalpello est aperienda, deinde locus læsus, ut alius abscessus, mundificandus & consolidandus, cavendumque, quantum fieri potest, ne nimis tarde aperiatur, ne pus profundius partes vicinas erodendo in fistulam ani mali moris degeneret, quæ tristissima sæpe symptomata, & mortem quandoque ipsam inducit: qua de re vero uberius legi potest Chirurgia nostra, ubi de fistula, & abscessibus ani agitur. Part. II. Cap. 168. 169.

*Si in suppuratio-
nem ab-
eunt.*

XLI.

Præservatio sanguinis missionibus, præsertim circa æquinoctia, scarificationibus, aut hirudinum ad anum applicatione, usu prudenti pulverum, aliorumque remediorum temperantium, ambulatione frequenti & convenienti, victusque ratione optime obtinetur, vitando abusum vini, aliarumque rerum calidiorum, itemque veneris & equitationis fortioris.

Præservatio.

I

XLII.

(a) In Polychrest. Exoticis.

XLII.

De Arthritis, Podagra & affinis.

Arthritis, Podagra, Chiragra, & Ischiaticum malum, morbi valde affines, a sanguinis quoque abundantia, ejusque in certis locis congestionibus potissimum provenire solent, quando copiosius, quam par est, in locis dolentibus accumulatur. Nam videmus homines victu copioso & lauto utentes, & non satis sese exercentes, insimul baccho & quandoque etiam venerē abutentes, eosque quibus hæmorrhoides vel suppressæ, vel ubi rite succedere nolunt, præcipue hisce malis affligi. Natura enim abundantes & noxios humores per extrema & cutis spiracula expellere, seque ab onere hoc liberare velle videtur.

XLIII.

Præservatio horum morborum. Adeoque *præservandi fine*, cui potissimum in his morbis studendum, simplicissima & pauca remedia, primo victus moderatus, parvus, temperans ac diluens, frequensque exercitatio, ambulatio, vectio atque equitatio, sunt necessaria. Deinceps subinde & præsertim circa æquinoctia sanguis est per Venas subtrahendus: id quod etiam in valde sanguineis interjecto tempore vel eadem ratione, vel si lubet, per scarificationes & cucurbitulas variis in corporis partibus adhibitis, utiliter fieri potest, præmisso præsertim medicamento idoneo alvum blande ducente. Abstineant præterea ab abusu vini, Veneris, & ira, potuque utantur tenui, vel aquoso vel ex cerevisia tenui, & in æstate utantur per duas vel tres hebdomades *aquis medicatis*.

XLIV.

Curatio. Ad curandos vero *arthriticos morbos* & speciatim *ARTHRITIDEN*, facit quam maxime victus tenuis, potus aquæ, imprimis calidæ, ut Theæ, vel decocti radic. polypodii, chinæ, sarsaparillæ, liquiritiæ, aliarum radicum aut herbarum aperientium; Essent. aristolochiæ, pulveres deinde temperantes, antispasmodici, quies in lecto, corpore bene tecto, transpirationis vel blandi sudoris expectatio, & speciatim partibus dolentibus probe contra frigus munitis: vitando externe omnia frigida, pingua, unguenta, emplastra, præsertim glutinosa. E contrario partes dolentes tantum pulvinaribus involvantur, aut sacculis herbis resolventibus, vel farina fabarum, tritici, lupini, orobi, aliave simili repletis, calide circumdantur; cætera enim pleraque, quantopere etiam pro specificis a theorisonibus & empyricis laudentur, plus plerumque nocent quam profunt, noxiamque materiam repellunt.

At

XLV.

Atque hæc eadem prorsus etiam in PODAGRA curanda sunt observanda & facienda; ea adhuc adhibita cautela, ut quando ingruentem novum impetum sive paroxysmum sentiant ægri, quod, ut sæpius observavi, cibi fastidium & insolita artuum lassitudo potissimum indicare solent, mox sor-des sive cruditates e primis viis idoneo *emetico*, vel si quid vomitum vetat, *purgante* ejiciantur, subjuncto altero die mane & post meridiem sudorifero blando: ut essentia quadam diaphoretica & inprimis Essentia aristolochiæ, cum lar-go aquæ vel decocti calidi potu, ac speciatim decocti radicis chinæ, atque abstinencia a cibis, minimum solidis, aut difficulter digerendis; vesperi vel pulveris temperantis vel antispasmodici ʒʒ. ex aqua diaphoretica semel vel bis utan-tur, ita enim haud raro morbus instans, sive paroxysmus in prima, ut ajunt, herba suffocatur, prævertitur, atque omni-no extirpatur, vel saltem valde minuitur.

XLVI.

In *paroxysmo* vero rursus omnium optime conveniunt 1. *abstinencia* aliquot dierum, vel saltem victus admodum te-nuis & parcus; 2. *potus aqueus*, largus, ac præsertim cali-dus, cum primis decoctum radicis chinæ sæpe jam laudatum, ac simul 3. præsertim matutino tempore, Essentia *aristolo-chiæ* vel longæ vel rotundæ, vel clematidis, pro malo per diaphoresin aut blandum sudorem expellendo; interpositis 4. subinde, præsertim si febricula urget, *pulveribus* illis *diapho-reticis* ac *temperantibus*, pro febre non prorsus supprimenda, sed moderanda, observato semper & cum primis matutino tempore, in lecto, regimine blando sudorifero; vitatis 5. om-nibus, quæ *materiam noxiam repellere possunt*, ut frigore, & remediis quibuscumque externis, solis pulvinaribus & saccu-lis laudatis exceptis, quæ diaphoresin non impediunt, sed promovent & conservant.

XLVII.

Podagra tamen, quod probe observandum, non semper a *sanguinis abundantia*, ut multi male docent, oritur, sed haud raro quoque in emaciatis debilibus & haud plethoricis, verum quorum sanguis acribus ac biliosis salibus scatet, ob-servatur, qui forte sæpius vel vino aliisve potibus spirituo-sis se obruerunt, vel cibis salis aut acribus nimis delectati, vel iræ nimis dediti fuerunt, vel nimia venere vires exha-u-serunt, vel etiam hæreditate a parentibus acrem ejusmodi ac vitiosum sanguinem acquisiverunt; ubi *alia longe ratione & præservatio & curatio est instituenda*: & quidem non per *sanguinis missiones*, aliave evacuantia fortiora aut frequen-tiora, quæ humores minuunt, & quæ ad procedentem po-dagræ

In accu-sione po-dagræ quid fa-ciendum.

In paroxysmo.

Podagra ab acris vel purioris natura.

dagræ ſpeciem avertendam facere ſolent, verum *per blande demulcentia*, acrimoniam humorum temperantia, corpus macilentum ac debile blande nutritia & vires reſtituentia: inter quæ præter alimenta blanda, principem ſibi locum vindicat *conveniens lactis uſus*, ſive cura, ut vocatur, *lactea*, eique uſui præ ceteris & Hippocrates lib. de articulat. & CELSUS lib. IV. Cap. 24. & GALENUS L. Alim. 7. meth. 6. & PLINIUS lib. 28. & Fr. HOFFMANNUS; diſſ. de *lactis aſinini uſu* & diſſ. de *Podagra præſervanda*, aliique *lac aſinum* commendant, quod ter in die a libra una ad libras duas aſſumunt, quamvis & a *vaccino* egregios effectus in hoc malo notaverim.

XLVIII.

De Iſchiatico malo.

Curatio
mali iſ-
chiatici.

Iſchiaticum malum, quia a congeſſione ſanguinis abundantis & viſcidi in vaſis circa anum ortum trahit, eodem prorsus modo, ut §. XLVI. docuimus, optime curatur, & cum hoc in malo natura ſanguinis circa inteſtinum rectum congeſſi exitum per vaſa hæmorrhoidalia moliatur, præſervandi gratia, aut ejus fluxus idoneis medicamentis, præſertim ſi alias & ſæpius forte jam fluxerint hæmorrhoides, eſt inſtaurandus; vel hirudines ano applicandæ; vel ſi id fieri non poſſit, vel ob certas rationes Medico vel ægro hunc fluxum excitare haud opportunum videatur, ſanguis abundans, vel venæ ſeſſione vel cucurbitulis ſæpe detrahi debet, ceteraque omnia ea ſunt facienda, quæ ad quoscumque morbos, a plethora, ſive abundantia ſanguinis oriundos, præcavendos ſæpe jam propoſuimus. Conſ. potiſſimum Cap. I. §. VIII. ad XII.

CAPUT XI.

De Cachexia & cachecticis affectibus.

I.

Quid af-
fectus ca-
chectici &
qui.

CACHEXIA ſive cachectici affectus ſanguinis *pravam* quantitatem, eamque *maxime pituiſoſam* ſive ſeroſam ac viſcidam, una ſæpe cum nimia copia indicant; eorumque præcipui ſunt cachexia ipſa, *κατ' ὄξος* ſive proprie ita diſta, *œdema*, *chloroſis virginum*, *hydrops*, *leucoplegmia*, *anaſarca*, *aſcites*, & *hydrops particulares*, *capitis*, *pectoris*, *pericardii*, *ſcroti*, *ovariorum*, &c. gradu & loco diverſi, & ſe

& se invicem vel comitantes, vel subsequeutes: quibus vero cachecticis morbis jure adhuc addi possunt *icterus, scabies, scorbutus, morbi veneri, & fluor albus in mulieribus*; quia pravæ sanguinis qualitati ortum debent.

II.

Obnoxii sunt his morbis cachecticis prioris ordinis pro-
prie ita dictis; maxime phlegmatici & sanguinei, præsertim viri quibus hæmorrhoides, & mulieres quibus menses vel suppressi, vel nimis fluxerunt; senes item præ juvenibus; itemque in quibus febres intermittentes vel neglectæ vel male curatæ, aut incongrue cohibita, aut nimis tardæ curatæ sunt; aut etiam qui malam victus rationem in intermittentibus servarunt, ut & quibus *scabies incongruis remediis*, præsertim sulphureis, aut mercurialibus externis, corpore nondum satis purgato, curata, & sic quasi repulsa fuit.

III.

Causa proxima cachexiæ sunt humores phlegmatici, pituitosi, viscosi, abundantes; partiumque solidarum relaxatio ac debilitas, quam multæ aliæ, tanquam *causa antecedentes & remote*, prægredi possunt: ut refrigeratio nimia, quies nimia, prava & crassa diætæ, aut nimis refrigerans; *potus nimis* quicumque vel aquosorum vel spirituosorum, inprimis spiritus vini, adeoque & *crapula frequens*; hæmorrhagiæ itidem quæcumque nimia, obstructions in hepate, pulmonibus, liene, utero, aut alio viscere, hæmorrhoides & menses suppressi, phthisis, asthma, & alia.

IV.

Quo peior causa, eo periculosior atque difficilior est curatio, & hinc sæpe affectus sunt valde contumaces aut prognostici. Qui tamen a causis externis, refrigeratione aut refrigerantium abusu, itemque a febribus intermittentibus, & potu in eis nimio ortum duxerunt, visceribus adhuc integris, itemque quando ægri adhuc sunt juvenes, facilius quam ceteri, curationem admittunt. *Quo majori in gradu* sunt hæc mala & quo magis inveterata, eo difficilior curantur. *Ægri quo seniores*, eo morbi hi curatu difficiliores. Si post pedum oedema reliquum etiam corpus & præcipue interiora quoque afficiuntur, malum est, & ex *cachexia hydropes, asthma*, aliaque mala oriuntur. Ubi vero viscera ad sunt corrupta, hoc est, vel scirrhus vel ulcere oblecta, eaque jam inveterata, plerumque nulla, vel saltem difficilis & rara, superest curatio.

V.

In curatione cachexiæ generatim *pituitosa* sive *viscida sanguinis & humorum qualitas* attenuanda est & corrigenda, par-

resque solidæ laxæ seu debiles roborandæ: Illud fit 1. per *salia alcalica fixa & media*, vulgo *digestiva* dicta, ut sunt sal absinthii, card. benedicti, &c. tartarus vitriolatus, arcanum duplicatum, tartarus tartarificatus, terra foliata tartari, nitrum antimoniatum, &c. in forma pulveris; vel arcanum tartari, aut tinctura aperitiva Mœbii, vel liquor terræ foliatæ tartari, in forma liquida, bis, terve in die apta dosi exhibita.

2. Per certa quædam corpora *gummosa*, ut gummi ammoniacum, galbanum, hederæ, itemque myrrhata, aloetia, & succinata, maxime in forma pilularum: ut sunt *pilula balsamica* Beccherianæ, Stahlianæ aliæque similes, noctu præsertim per aliquod tempus datæ.

3. Per *herbas ac radices amaras & aromaticas*, ut herb. absinthii, card. benedicti, centaurii minoris, trifolii fibrini, fumariz, rosmarini, salviæ, capilli veneris, itemque per herbas antiscorbuticas dictas, ut sunt cochlearia, nasturtia omnia, cardamine, acriviola sive cardamindum, lepidium sive piperitis, draco herba sive Draconia, sedum vermiculare acre, armoracia sive raphanus marinus, ut & radices attenuantes, ut pimpinellæ albæ, helenii, vincetoxici, gentianæ, cichorii, bardanæ, aristolochiæ, rhabarbari, ari, quinque aperientes, sub forma infusorum, decoctorum, aut vini medicati.

4. Per *ligna ita dicta antivenerea* sive exsiccantia ut lignum quaiaci, sassafras, juniperi, santalum citrinum, juncta uni alterive e radicibus modo laudatis, sub infusi vel decocti forma.

5. *Aromatica*, ut cinamomum, cardamomum, cadamus aromaticus, caryophilli, schoenanthum, piper, zingiber, zedoaria, galanga, macis, bacc. juniper. sem. 4. carminativa, dauci cretici, corticis citr. & aurantiorum, cascarillæ, chinæ, in infusis pulveribus, trageis, item pulvis stomachal. Birkim. & cachectic. Quercetani, Tragea aromat. Augustanorum, species diacinnanomi, diagalangæ, &c.

6. *Tinctura atque Essentia attenuantes & resolventes*, ut tinctura tartari, tinctura antimonii tartarifata, Elixirium proprietatis, Essentia lignorum, ligni sassafras, succini, scorpii, fumariz, trifolii fibrini, pimpinellæ albæ, helenii, alexipharmaca, absinthii, cardamomi, corticis aurantiorum, rhabarbari.

7. *Omnia extracta amara, roborantia & aromatica*, ut absinth. card. bened. cascarill. millefolii, gentianæ, cent. min. trifol. fibrin. galangæ; calam. aromatici; vel in forma electuarii, vel pilularum, præsertim cum aloe, myrrha aliisque gummatibus mixta; vel etiam in aquis idoneis

stoma-

Stomachicis vel vino hispanico soluta, admodum Elix. visceralis celebr. *Hoffmanni*.

VI.

Postquam sic horum aliquandiu continuato usu pituitosi humores attenuati sive correcti, supervacanea abundans & resoluta eorum pars *evacuanda*, vel per infusa aut vina laxantia, vel per pilulas varias sæpe jam & adhuc §. V. modo laudatas. Quæ vero in robustioribus resin. jalapæ vel scammonii vel diagrydii, elaterii, trochisc. albandi aut gummi guttæ aliquot granis pro ægrorum diversitate acui possunt, & subinde corrigentibus medicamentis interponi. Hæc etiam scopo egregie haud raro satisfaciunt *emetica*, ex observatione præstantissimi *Sydenhami*, *Werlhofii*, nostra aliorumque, præsertim in iis, qui facile vomunt: ubi inprimis *aqua benedicta Rulandi* ab ʒiʒ. ʒʒ. ad ʒiij. humores abundantes, tam sursum quam deorsum, optime expellit, maxime si alternis diebus, vel etiam pro virium ratione longioribus intervallis repetitur: cum primis si observamus malum a prioribus dosibus minui.

Evacuandum n. sus.

VII.

His (§. V. & VI.) aliquandiu usurpatis, si æger inde melius rursus se haber, ultimo *tonus partium* debilitatus *denovo roborandus* est, & quidem interne per blanda martialia, aromatica, & amara, ut tincturam vitrioli martis Zwelfferi, tincturam martis cydoniatam, limaturam martis cum elæosaccharo vel extractis amaris, (a) crocum martis aperitivum cum salibus herbarum; vel per Mixturam tonicam, ex spiritu C. C. cum tinctura tartari remixto, vel ex Essentia absinthii composita cum Essentia chinæ aut cascarillæ, vel & vina medicata amara & roborantia, quibus itidem cort. peruv. admiscendus, aliaque similia. Ita & *usus aquarum mineralium*, præsertim martialium aut thermarum legitimus ac circumspectus, ubi viscera adhuc integra sunt, & æger se movere valet, sæpe perquam egregius est; *alias vero ubi viscera corrupta*, aut æger jam nimis debilis, potius omittenda, ne ægrum, quem servare non possumus, occidisse videamur.

VIII.

Externe fricationes pedum sæpe instituantur, lique, si indecore intumescunt, fasciis, expellentibus dictis, idoneo modo involvantur, vel aptis machinis ex corio vel linteo ad modum tibialium constructis, de quibus vid. Institut. nostræ chirurgicæ, Tab. 36. Fig. 11. coerceantur.

Remedia externa & diata.

Diata sit parca, facilis digestionis & leniter calefaciens;

I 4

viten-

vitentur cruda, crassa, frigida, fructus horæi, acida, & refrigeratio. Conducunt vero calor moderatus, aromata, potus vini generosi in pastu vel meri, vel medicati, & motus frequens corporis.

IX.

*Cachexia
a febri-
bus.*

Si *cachexia a febribus intermittentibus inveteratis, vel male tractatis* oriatur, primo ad humores noxios evacuandos lenia laxantia, ut pilulæ tartaræ, extract. panchym. Crollii, pilulæ nostræ polychrestæ, Betcherianæ, aliæve similes dandæ, ac deinde medicamenta antifebrilia, salina & amara, quo & tandem cortic. aurantiorum, cortex peruvianus & cascarillæ pertinent, sæpius usurpata, maxime conducunt, & præsertim etiam vinâ medicata, quæ præter alia amara, modo laudati cortices ingrediantur.

X.

*Ab hæ-
morrhoi-
dibus aut
mensibus
suppressis.*

Si *ab hæmorrhoidibus suppressis*, tunc præmissis attenuantibus & evacuantibus §. V. vel VI. speciatim hæmorrhoides pellentibus supra Cap. VI. §. IX. & XVI. indicatis, curatio est instituenda, & si hæmorrhoides ab his non revocentur, & tamen eas revocare velimus, *birudines ano applicanda*, vel venulæ tumentes scalpello aperiendæ, aut si hoc nolimus, earum loco Venæ sectio in pede est instituenda, quæ deinde præservationis gratia circa æquinoctia repetenda, sub junctis postea modo §. VII. laudatis remediis, idoneo victu & motu frequenti.

Cachexia a mensibus suppressis vel inordinatis quoque requirit, ut fluxus eorum restituatur atque in ordinem redigatur: quod qua ratione fieri debeat, dictum est Cap. IX. N. VIII. & sequentibus: quibus postea modo dicta roborantia sive tonica cum eodem regimine subjungenda.

XI.

*Si ab hæ-
morrhagiis ni-
miis.*

Si *ab hæmorrhagiis nimis prægressis* cachexia oriatur, temperata blanda analeptica, emulsiones, gelatinæ, & juscula, maxime vero moderata diætâ adhibenda, ne copiosioribus alimentis chylus crudus indigestusque nimia copia generetur: quapropter & blanda stomachica ac roborantia, præsertim amara, itemque mixtura tonica sunt suadenda, vitando calidiora aromatica & spirituosâ, ne novus orgasmus aut ebullitio in sanguine excitetur, quæ alias novam facile hæmorrhagiam concitaret. Vinum rubrum bonæ notæ aqua temperatum subinde modica copia roborandi fine concedi quoque potest.

XII.

*Si a sca-
bie repul-
sa.*

Si *a scabie repulsa*, purgantia mercurialia & diaphoretica, sæpe jam laudata, alternatim adhibenda, speciatim vero inter diaphoretica Essentia helenii & fumaris, itemque deco-

decocta lignorum, sive infusa eorum pugillaria calida, cum leni sudoris, matutino præsertim tempore, regimine, reliquis palmam præripiunt. His denique Mixtura tonica aliæve roborantia subjungenda.

XIII.

De Chlorosi.

In cachexia virginum sive CHLOROSI eodem fere modo procedendum, ut §. V. ad VIII. in cachexia generatim diximus: attenuantibus scilicet, evacuantibus, roborantibus, bonaque diæta, & motu corporis. Speciatim vero si a *menstruis suppressis* oriatur, post idonea attenuantia & evacuamenta, danda sunt tempore instantium mensium menses moventia Cap. IX. §. VIII. & seq. adhibenda sæpe pediluvia, immo & V. S. in pede versus tempus menstruum, præsertim in plethoricis. Quandoque, cum primis si viscera adhuc sunt sana, potus legitimus *aquarum mineralium*, præsertim martialium, vel etiam *shermarum* usus, immo & *curatio per limaturam martis* subtilissime tritam, cum amaris vel aromaticis instituta Cap. X. §. XXI. valde conducit; sin vero hæc non sufficiant, aut ægræ ea adhibere nequeant, matrimonium in hoc morbo remedium est ut plurimum certissimum & probatissimum.

XIV.

De Oedemate.

Speciatim vero in OEDEIMATE curatio interna per attenuantia, amara & resolventia, ut in cachexia §. V. ad VIII. incipi debet, & deinde laxantia sæpius interponi; vel etiam pro re nata mox laxantia & attenuantia coniungi possunt, vel sub forma infusi aut vini medicati laxantis, vel pilularum balsamicarum Beccheri aut similium, pedesque *fasciis* simul involvendi, vel peculiaribus tibialibus coercendi; exque matutino semper tempore denuo firmandæ, si ægri eas sine incommodo & præsertim sine spirandi difficultate ferre possunt, atque a frigore probe defendendi. *Aquarum martialium*, vel & *shermarum* legitimus usus hic quoque perquam est egregius.

Sed si post febrem intermittentem oriatur oedema, roborantia amara & aromatica, interpositis subinde laxantibus continuanda, pedes sæpe fricandi, corpusque motu frequenti probe exercendum. Quod si autem febris simul adhuc adsit, præter dicta

dicta ipso cortice peruviano, præmissis tamen præmittendis, & febris & œdema, immo & hydrops sebi superveniens, sunt curanda. (a)

Oedema a fluxibus suppressis. Si ab hæmorrhoidibus vel mensibus suppressis, hi debitis remediis, Cap. IX. §. VIII. ad XVI. propositis, sunt restituendi, & si malum nondum inveteratum, Venz sectio in pede apud plethoricos locum quoque habere potest; sin vero jam inveteratum, aut ægri valde jam debiles, Venz sectio nocet, immo quandoque sphacelum in pede, ut ipse vidi, & mortem inducit.

Monitum de exterioris remediis.

Cavendum, ne œdema facile solis externis, præsertim frigidis aut adstringentibus, aut emplastris tractetur; quia his humores vitiosi ad nobiliores & internas partes facile repelluntur; atque asthma, hydrops, inflammationes internæ, polypi cordis, catarrhus suffocativus, apoplexia & mors sæpe inducuntur. Medicamenta vero externa maxime idonea in Institutionibus chirurgicis nostris indicata sunt Part. I. Lib. IV. Cap. XVII. p. 347.

XV.

De Hydrope.

Hydrops anasarca & ascites.

In HYDROPE, sive *Leucoplegmatia*, aut *Anasarca* sit, sive *Ascites*, curatio iisdem fere remediis est instituenda, quæ in curatione cachexiæ generali §. V. ad VIII. hujus capituli indicata sunt: nam & hic humores pituitosi & abundantes partim corrigendi, partim evacuandi sunt, partesque debilitatæ tandem rursus roborandæ. *Evacuatio* tamen abundantium humorum, urgente malo, sæpe præmittenda est correctioni, aut conjungenda, aut saltem per intervalla interponenda.

Curatio subinde emeticis.

Maxime vero hic notandum, quod ex Sydenhamii observatione evacuatio sæpe, præsertim si ægri haud difficulter vomunt, egregie per *emetica* obtineatur, & imprimis per *aquam benedictam Rulandi*, apta, attamen satis larga dosi ab ij. scilicet ad ðijj. alternis diebus aliquandiu, vel & pro virium ratione tertio quovis die mane exhibitam: interpolatis deinde semper amaris, roborantibus, tonicis, ac diureticis laudatis: ita enim quotidie fere aut post singulum usum aquæ illius benedictæ tumores & ventris & pedum minui sæpe observantur. Ergo ubi hunc modum ægro prodesse conspiciamus, (nam non semper succedit) continuandus erit.

XVI.

(a) Conf. filii mei vñr in *Ætios* Diss. de quartana & hydrope cast. peruv. curatis, Anno 1740. Helmstadii impressa.

XVI.

Sed si hic curandi modus minus arrideat, aut æger nimis difficulter vomat, aut eo uti nolit, vel etiam adhibitus nihil proficiat, pro diversa dispositione ægri vel ad sudorem vel diuresin facilem, vel ad alvum laxam, evacuatio nunc melius per sudorem, nunc per diuretica, nunc per purgantia instituitur: atque hic in primis valet illud dictum HIPPOCRATIS, quo natura vergit, ducenda. Maxime vero in anasarca sudorifera vel sola, vel roborantibus combinata, egregie sæpe profunt, præsertim ex decocto ligni quaiaci, vel iassafras sine vel cum radice bistortæ & cinamomo, vel cortice aurantiorum vel baccis juniperi, (quæ simul diuretica sunt) aliisque gratis aromatibus parata, cum regimine sudorifero: quorum virtus multum augetur, si simul semper cum hoc decocto Essentia lignorum, pimpinellæ vel alexipharmacæ apta dosi assumatur.

Alii mo-
di.

Quando-
que sudor
visus.

XVII.

Si urina adhuc bene & facile procedit, curatio per diuretica institui potest, ac diuretica vino rhenano, in pauperibus autem cerevisiæ tenui infusa; ut radix vincetox. levistici, asparagi, petroselinii, rusci, ononidis, baccæ juniperi, alkekengi, &c. optime profunt, si sæpius in die ℥ij. vel ℥iij. bibantur; vel *lixivia*, præsertim illud quod SYNDEHAMUS in hydropo commendat, quoque conducunt: (a) Itemque *salia media diuretica* subinde exhibita, vel liquor terræ foliatæ tartari, Tinctura antimonii acris, vel aperitiva Moebii, ut & succ. raphani vulgaris vel marini, qui armoracia dicitur, vel cum saccharo vel vino remixtus, sæpeque assumuntur.

Curatio
per diure-
tica.

Electuaria quoque ex conservis & extractis amaris ad modum Sydenhamii parata, corrigendo humores vitiosos, urinam movendo atque partes laxas roborando sæpe sunt egregia.

Si æstus aut siis vehemens ægros affligit, salibus illis diureticis mediis nitrum jungi & subinde præsertim vesperti exhiberi debet.

XVIII.

Quando ægri alvum habent laxam, aut alias facile purgantur, medicamenta alvum ducentia eaque paullo fortiora, ut elaterium, vel gummi guttæ, aliave resinosa purgantia, quo cumprimis etiam pertinent *pilule hydropicæ Bontii* a ℥ss. ad ℥j. exhibitæ, (b) sufficienti copia sæpius danda, cumprimis

Curatio
per pur-
gantia.

(a) Quod ita se habet. 2℥. Ciner. genist. ℞. j. infunde vini Rhenani ℞. iv. frigide, stent per noctem; postea liquoris filtrati ℥iij. mane & vesperti hora quarta vel quinta bibantur.

(b) Vide earum præparationem in *Junckenii* lexico Chym.

primis si illa commodè ferant & levamen inde sentiunt, interpositis tamen & subjunctis antea laudatis amaris, roborantibus, diureticis, martialibus. Nonnulli hic etiam eundem in finem infusum *radicis bryonia* valde commendant. Alii succum *radicis iridis palustris luteæ*, (a) alii vero pulverem *gratiola* ad ʒiſſ. vel ʒij. mane ex vino. *Lenibus* vero *purgantibus* plerumque nihil boni his in morbis effici solet. Conf. Sydenham. de Hydrope, qui aut fortiter, aut numquam hic purgandum esse statuit.

X I X.

*Curatio
hydropsis a
febre.*

Si *hydrops a febre intermittente ortus est*, vel febris intermittens simul adhuc continuat, tunc utramque, gravissimum quamvis malum, divini *corticis peruviani legitimo usu* sæpe simul tolli potest, non neglecto tamen & aliorum roborantium idoneorum recto usu. Qua de re vid. filii. dissert. de quartana & Hydrope per corticem peruvianum curatis, An. 1740. edita.

X X.

*Dieta
Hydropi-
corum.*

Dieta servanda bona, motus corporis, quantum fieri potest, præsertim quando se movere adhuc possunt, frequenter instituantur; alimenta aromatibus sint condita, *vinum generosum*, cum primis rhenanum, modice usurpetur, præsertim herb. absinth. bacc. junip. & cortic. aurant. immo & cortice peruviano ac *cascařillæ imprægnatum*; ubi vero in pauperibus loco vini, *cerevisia diuretica* bonæ notæ sumi potest. *Cerevisia* vero recens & seculenta omnisque potus refrigerans & nimius itemque spiritus vini vitetur. Si vero his non cedit, in *ascite* mature ad *paracentesin*, est confugiendum, de qua vid. Chirurgia nostra, non neglectis tamen interea & post eam remediis idoneis & apta victus ratione, ut modo præcepimus.

X X I.

*Hydropes
particula-
res.*

Hydropes particulares, ut hydrocephalus, hydrops pectoris, hydrocele, &c. interne eodem modo tractandi ac cachexia vel hydrops universalis. Reliqua vero, & præsertim externa, si interna illa parum proficiunt, ex Chirurgiæ nostris institut. peti possunt.

X X I I.

[a] Commodam ejus præparationem & usum cel. Werthofius observ. de febrib. p. 60. docuit.

XXII.

De Tympanite.

In TYMPANITE, quia humores pituitosi, relaxatio toni viscerum & flatus in causa sunt, qui intestina flaccida & ventrem adeo distendunt, roborantia sive tonica & carminativa, resolventibus, amaris & salinis in hydropse laudatis miscenda vel interponenda, ut Essent. cortic. aurant. flor. chamomill. Essent. & spiritus carminat. &c. item limatura martis cum extractis amaris, ad modum Sydenhamii pro tono partium roborando, vel in forma pilularum vel Electuarii valde hic conducit. Singulo triduo vel quatrduo laxans vel e pilulis lenioribus, utpote balsamicis aliisque similibus, vel pulvere e jalapa & mercurio dulci, vel sale amaro cathartico exhibeantur: hisque per duas tresve hebdomades aut diutius prout necessitas exigit, continuetur; postea vero praelaudata tonica sive roborantia, servato eodem regimine ac dicta, ut in cachexia & hydropse, subjungantur. Abdomini, olea destillata & balsama carminativa calide sæpe illini debent; vel emplastrum de camino aut de baccis lauri, vel diasaponis imponi potest. Si *alvus obstructa* negotium facit, vel indicato purgante vel clystere carminativo, quoties opus est, solvatur.

*Tympani-
sis.*

XXIII.

De Ictero.

ICTERUS est cachexia species, in qua biliosæ particulæ copiosius quam par est, per sanguinem totumque corpus, ac speciatim faciem & oculos diffunduntur, vel ob viarum biliarium in hepate obstructionem, vel hepatis spasmodicam constrictionem, unde transitus bilis ex vena portæ in ductus biliarios impeditur, eaque hinc per venam cavam ex hepate ad cor abire cogitur, unde per totum corpus diffunditur, cutemque, oculos & urinam potissimum colore flavo tingit.

Icterus.

XXIV.

In *curatione* bilis & sanguis tenax ac viscidus iisdem remediis, ut in cachexia, §. V. ad VIII. dictum est attenuandus ac resolvendus, maxime salibus digestivis, Essentiis amaris, & infusis radicum & herbarum attenuantium aquosis, ad modum Thez usurpatis, quibus etiam constric- tio hepatis moderatur, & icterus plerumque optime tollitur. Speciatim vero præter modo indicata, hic egregie pro-

*Ejus cu-
rasso.*

pro-

profunt radix rhei, curcumæ, chelidon. majoris, dulcamaræ, (a) pimpinellæ albæ, herb. marrubb. alb. hepaticæ nobilis, linguæ cervinæ, capilli veneris, cardui benedicti, *Anima seu Essentia rhabarbari*, aqua poratæ cochleatim usurpata, & denique *millepedes* vel in pulvere, vel electuario, vel succus eorum expressus, cum regimine diaphoretico, ita enim particulæ sanguinis & bilis viscidæ ac stagnantes resolvuntur, atque per ductus biliarios & cutim sensim expelluntur. Idem etiam obtineri potest legitimo usu *aquaturn medicatarum*, quæ hic quoque valde egregiæ. *Sapo* tandem bene præparatus & purus, ac præsertim venetus aut hispanicus a ʒss. ad ʒj. bis terve in die exhibitus, non omisiss infusis aqueis laudatis, tam in ictero, quam aliis cachexiis atque obstructionibus, ob vim ejus attenuantem, resolventem ac diureticam, valde hic prodest. Ita etiam *cortex peruvianus* cum salibus neutris sive mediis, tanquam insigne specificum in hoc morbo a quibusdam valde laudatur. Vid. *Camerarii* de hoc argumento peculiaris dissertatio.

XXV.

Si alvus hoc in morbo, ut plerumque fit, non rite succedit, dum feces albæ, duræ & siccæ, ut in canibus plerumque esse solet, rhabarbarum vel in pulvere vel in Essentia aquosa, vel in decocto sive potiuncula, sine vel cum foliis senæ, datum optime prodest: id quod etiam reliquis remediis, præsertim si morbus ab ira ortus est, sæpius interponendum.

Quando icterum æstus & sitis febrilis comitatur, salibus digestivis, nitrum & antimonium diaphoreticum addenda, potiusque sufficiens aqueus temperatus commendandus.

Vomitoria purgantia fortiora, sudorque, tam per medicamenta calidiora, quam per regimen coactus, plerumque nocent; lenis vero sudor seu transpiratio paullo auctior, manet, præsertim in lecto, aqueis præsertim calidis producta confert.

Dieta tenuis ac parca, quæ in aliis cachexiis convenit, cum potu sufficienti tenui, itemque motus corporis frequens hic valde sunt necessaria; ira vero ac tristitia, ut & quies nimia, sunt fugienda.

XXVI.

De Scabie.

Scabie SCABIEM quoque, (quæ cachexiæ species est cum acrimonia) interne eadem fere remedia sanant, quæ contra ca-

[a] Hæc radix valde commendata est a *Pekkeri* in Exercit. præc.

cachexiam in univerſum §. V. ad VIII. propoſita ſunt; imprimis vero Eſſentiz, pulveres & decocta vel infuſa diaphoretica, ac ſpeciatim Eſſentia fumariz; helenii, ſcordii, alexipharmaca, ſuccini, lignorum, ligni ſaſſafras, Tinctura antimonii tartarizata, lapides cancrorum, antimonium diaphoreticum, antimonium crudum, & flores ſulphuris parca doſi remixti, decocta radicum & lignorum, ſpeciatim radicis lapathi acuti, cum regimine diaphoretico, non ſudatorio, præmiſſis atque interpoſitis purgantibus ad materiam vitioſam evacuandam, quæ ſemper *mercurius dulcis* ingredi debet, egregie hic conducunt: hiſque aliquamdiu, obſervata ſimul bona dicta, continuatis, levior ſcabies, ſine externis etiam adhibitis remediis, ſæpe cedit.

XXVII.

Quod ſi vero hoc non fiat, ſed *ſcabies* pertinacior ſit, atque prædicta remedia per dies circiter quatuordecim adhibita fuerint, *externe* vel unguento ex ſulphure & axungia porcina, vel quod ſere melius adhuc eſt, unguento mercuriali partes affectæ, imprimis articuli, quotidie ſemel vel bis calide inungi, & mane rurfus vel ſapone, vel ſurfuribus ex amygdalis, præſertim amaris, vel decocto avenæ, vel aqua calcis vivæ, vel lixivio antimonii diaphoretici, aut lixivio ſulphuris aqua calcis vivæ parato, aut decocto radicis lapathi acuti, vel enulæ, vel herba ſaponariæ aut ſcabioſæ, admixto pauco nitro antimoniato, tepide ablui poſſunt, continuatis interea prædictis purificantibus medicamentis internis, donec malum omnino cedat.

XXVIII.

In *ſcabie maligna*, inveterata ſive *ſerina* interne etiam, præter dicta, medicamenta mercurialia, alterandi ſine, ut *mercurius dulcis*, parca doſi, mane & vespere, vel ſolus vel cum ſulphure antimonii remixtus, cum fructu dantur; vel ſi ægri ſint habitus *ſcorbutici*, ſucci recentes herbarum antiſcorbuticarum, ut cochleariæ, naſturtii, acetofellæ, numulariæ, &c. cum juſculis carniū vel ſero lactis mane dati & aliquandiu continuati, valde hic ſæpe proſunt; quibus Eſſentia fumariz cum ſpiritu cochleariæ parata, ante meridiem & circa vespere optime jungitur.

XXIX.

In *venerea ſcabie* frequens & moderatus uſus mercurii dulcis mane ſcilicet & vespere, cum vel ſine ſulphure antimonii, purgationes mercuriales ſæpe repetitæ, decocta lignorum ac radicum laudata, cum regimine diaphoretico paullo fortiori, præſertim mane in lecto, prædictæ eſſentiz & unguentum aliquod mercuriale plerumque ſufficiunt. Si vero

Pertinacioris.

ſerina curatio.

Curatio ſcabiei venereæ.

ma-

malum gravius, aliaque adhuc morbi venerei symptomata addunt, curatio ut in ipsa lue venerea adhibenda.

XXX.

Vitanda in scabie. In omni scabie vitandum est frigus, cibi salsi, aromatici, acres, caro suilla, aliaque sale vel fumo indurata, & nimia repletio, caveantque ægri, ne malum, partes prurientes sæpius aut vehementius scalpendo, exacerbent.

XXXI.

Retropulsa tractatio. Quando a scabie intempestive retropulsa symptomata oriuntur, ut capitis dolores, difficilis respiratio, angustiz præcordiorum, febres, epilepsia, asthma, &c. frigus vitandum; calor moderatus externus & remedia diaphoretica cum decoctis lignorum in lecto sunt adhibenda, ut essentia quædam diaphoretica, & pulvis ex lapidibus cancrorum, antimonio diaphoretico, arcani duplicat. cum parca copia mercurii dulcis & floribus sulphuris. Quod si vero ægrum calor simul febrilis scabie repulsa invasit, loco sulphuris pulveribus prædictis parum nitri admiscendum. Numquam igitur curatio affectuum scabiosorum externis, præsertim mercurialibus aut sulphuratis incipienda, quia scabiem repellunt, & varia periculosa symptomata, immo ipsam mortem sæpe, præsertim in infantibus & debilioribus producant.

Sanguineis & succulentis præsertim, scarificationibus alias jam assuetis, scarificationes quoque in scabie valde profunt, quæ malum jam ad cutem propulsum melius educunt, quam Venæ sectio.

XXXII.

De Scorbuto.

Scorbutus quid.

SCORBUTUS est cachexiæ species, in qua sanguis spissus, quasi coagulatus sive grumosus & ad motum ineptus videtur, atque singularem corruptionem, & quasi putredinem, cum acrimonia, modo alcalica sive calida, modo acida sive frigida, modo salsa, concipit: unde dolores, maculæ rubræ aut lividæ in artubus, ulcera mali moris, foetida, cruentationes & erosiones gingivarum ac dentium, os foetidum, debilitas & lassitudo totius corporis, anxietates circa præcordia, aliaque symptomata proveniunt.

XXXIII.

Ejus divisio & causa.

Dividi, mea quidem sententia, optime potest in alcalicum sive calidum; acidum sive frigidum, & salsum, ubi ægris sapor salsus semper in ore adest. Causa scorbuti calidi sive alcalini est nimia copia salium alcalinorum in sanguine, eoque calidioris temperamenti homines corripuntur, itemque illi, qui in calidiores, remotiores regiones iter

per

per mare faciunt: ubi salia sanguinis per calorem nimum in alcalica transmutantur, quæ deinde effectus scorbuti produ-
cunt. E contrario *scorbutus frigidus* sive *acidus* in frigidioribus potissimum regionibus dominatur, & non solum harum incolæ, ac præsertim qui circa maritima loca habitant, invadit, verum etiam qui navibus longinqua itinera per mare in boreales regiones faciunt, ubi tamen præcipue illos affligit, qui otio indulgent, & corpus non satis motu aut laboribus exercent: quibus caussis cibi crassiores & potus assumpti in ipsis quasi acescunt, atque sic acrimoniam acidam, una cum viscido, in sanguine producant. *Scorbuti falsi* causa videntur quam maxime cibi falsi, & cum primis frequens ac nimius usus salis, itemque carnum & piscium sale marino conditorum, qui sensim efficiunt, ut sal falsum sive muraticum in corpore ac humoribus prædominium adipiscatur.

XXXIV.

Præter signa generalia in §. 32. indicata, *alcalicus* ex calore p. n. rubore faciei, oris & labrorum; *frigidus* sive *acidus* ex sapore, sudore & ructibus acidis labris & oris parte interna pallida, alba vel cærulescente, pallore & frigore corporis cognoscuntur. In *falso* vero scorbuto sapor falsus fere semper in ore adest. Quo leviora vero vel graviora symptomata adsunt, eo facilius vel difficilius curatur.

XXXV.

In *curatione*, generatim viscidum & acre corrigendum, atque impurum per sudorem & urinam expellendum. Quem in finem generationi profunt decocta & infusa aquosa, diaphoretica, in scabie laudata, & in primis decoctum radicis cichorii, lapathi, bardanæ, scorzonæræ, sassaparillæ, chinæ & ligni sassafrae, si modo corpus contra frigus probe muniatur, in perpetua transpiratione conservetur, ac frequenti motu exerceatur. Cibus vero parvus ac potus tenuis, aquosus sive temperatus sufficienti quantitate assumatur, præsertim in scorbuto calido & falso. *Aquarum tandem vel medicatarum vel & simplicium purissimarum usus* legitimus, per plures dies aut hebdomades continuatus in quocumque scorbuto *præstantissimus* est: quia optime diluunt viscidum atque omnem acrimoniam egregie corrigunt, temperant atque eluunt, ita tamen, ut in sanguineis, calidioribus & robustis, prægressa Venzæ sectione, magis acidularum, Pyrmontensium nimirum, Sualbacensium, Egranarum, Spadanarum, &c. in frigidioribus vero ac debilioribus aquarum temperatiorum, ut Selsenensium; vel Thermanum, ut Emsensium, vel Wilbadensium, Carolinarum, Aquisgranensium, usus, & quidem in his calidus, in illis frigidiusculus fere præferendus videatur.

*Cura
specialis
scorbuto
calido.*

Speciatim vero in iis, qui calidioris sunt temperamenti, sive *scorbuto calido laborant*, utpote in quibus acrimonia alcalica peccat; præter remedia temperantia & diluentia generalia, conducunt quoque & alia moderata *medicamenta acidula*, ut acetosa, acetosella; succus citri, aurantium, pomorum sinensium, cerasa, fraga, rubi, ribesia alique fructus horæ, maturi, grate acidi. Præterea *unctura acidule*, ut rosarum; florum bellidis, aquilegiæ; papaveris rhead. itemque condimenta & embammata acidula, ac denique nitrum & nitrum antimoniatum, cum pulveribus temperantibus, succo citri aut limonum, vel aceto saturatis subinde data; vitando omnis generis calefacientia & spirituosas, atque imprimis antiscorbutica calidiora, ut cochleariam, nasturtium, raphanum rusticanum sive armoratiam, sinapi, aromata, & inde parata. Prodest his etiam egregie *potus feri lactis*, lactis ebutyrati, præsertim verno tempore, mane quotidie ad libram unam vel alteram hausti; vel & *aque medicata* aliæve puræ frigidæ, legitime usurpatæ.

XXXVII.

*Scorbuto
frigido.*

In *frigidioribus* vero, sive qui *frigido scorbuto laborant*, qui septentrionalibus valde familiaris est populi, & in quo *acidum* ac *viscidum* præcipue peccare videntur, stricte sic dicta *antiscorbutica aciora*, sive *alcalica*, ut cochlearia, nasturtium, lepidium, beccabunga, chelidonium minus, sedum acre vermiculare, raphani quicumque & præsertim rusticanus dictus, sinapi, cepæ & allium in substantia, jusculis medicatis & in cibo conveniunt. Ex preparatis vero imprimis hic conducit vel spiritus cochleariæ, vel Essentia fumarie cum spiritu cochleariæ parata, aliquoties in die usurpata, itemque amara quæcumque & præparata ex eis, vel in forma infusi, aquosi vel vinosi, essentia vel extracti: ut fumararia, trifolium fibrinum, cardus benedictus, chærefolium, radice chorii, lapathi acuti, chinæ, sassaparilla, vel etiam in forma decocti, interpositis subinde lenibus laxantibus. Præterea etiam ex prædictis herbis *antiscorbuticis*; *acribus*, succus recens expressus, ad cochlearia duo vel tria conducit, vel si cum jusculo carnis tenuioris prius coquantur juscula medicata sunt efficacissima, si quotidie per aliquod tempus, subjuncto moru, matutino tempore, usurpantur. Speciatim vero & *cochlearia* & *nasturtium* vel in succo, ut modo dictum est, vel reniter tantum dissecta, cum vel sine pauco saccharo, utilissime sæpe ab his comedi possunt: quibus omnibus vero aliquamdiu cum debito regimine & diæta continuandum. Essentia lignorum, ligni sassafras & tinctura antimonii tartari-

tatiffata hic quoque, ut in plerisque sanguinis impuritatibus, valde egregiæ sunt.

XXXVIII.

In eâ denique *scorbuti specie*, quæ *falsa* dici solet, ubi *Scorbuto ægri continuo salsum saporem in ore percipiunt*, præter aquas medicatas modo laudatas, aut simplices alias purissimas, rite præparatæ *aque calcis viue* legitimus usus internus adiuturus, a libra una ad duas eam quotidie mane, immo & circa vesperam bibendo, pro summo specifico merito habetur vitando simul abulum salis, carnesque & pisces salios.

XXXIX.

Contra stomacacem sive gingivarum erosionem ac cruentationem, una cum laudatis internis medicamentis, externe utiliter adhibetur Tinctura gummi lacæ, qua gingivæ manè & vesperi leniter fricantur; vel Essentia myrrhæ aut succini; vel mel rosarum spiritu salis vel succo citri leniter acidulatum, vel *sal culinare* leviter contritum, quo dentes eadem ratione bis vel ter in hebdomade blande fricantur, quod ultimum etiam dentium sordes ac putredinem egregie expurgat. Ita & *myrrhæ* sæpius manducata & aliquandiu in ore detenta, immo & si dentes ea fricantur, contra hæc originitia perquam utilis est; vel electuario ex myrrhæ, sanguine draconis, radice bistortæ, nuce moschata & paucalumine crudo vel bisto, cum melle rosato parato, gingivæ subinde gravi ter detergantur. *Salvia* etiam ejusque infusum aqua vel vino, præsertim rubro utilitet pro abstergendis sæpe gingivis putridis cum fructu adhibentur. Si *myrrhæ* & *terra japonica*, vel *rosmarinum* & *muscus pruni sylvestris* in vino rubro decoquantur, eisque gingivæ sæpius eluuntur egregie quoque eas mundant ac gingivas firman.

XL.

Ad maculas scorbuticas abigendas, interne laudata diaphoretica, infusa nimirum calida radicum, herbarum, & lignorum, Essentia alexipharmaca, lignorum, M.S. pulveres diaphoretici cum evitatione frigoris, lenique subinde sudore mane in lecto excitatio, adhibenda; & si forte post horum usum aliquandiu continuatum non evanescant, externe aqua calcis viue, calide quotidie paucò spiritu vini camphorato acuata, abluì possunt; vel etiam unguento ex mag. marcasitæ, mercurio præcipitato albo & unguento rosato, vel etiam ex duobus ultimis solis paratum his maculis vesperi inungi.

XLI.

*Dieta
Scorbutica
rum.*

In *Dieta*, scorbutici calidi, omnia calefacientia, acria, (sal-
sa, aromatica, & spirituoſa; *frigidi contra*, acida refrigeran-
tia, utrique vero crassa & quæ difficulter concoquuntur, ni-
miamque alimentorum copiam vitare debent: & quoniam
sæpe plethora concurrit, præsertim in calido, Venæ sectio vere
& autumnò & præservandi & curandi scopo utiliter adhibe-
tur. *Frigidi etiam vitent*, quantum fieri potest, *aerem frigi-
dum & humidum*, quærantque contra calidum & siccum,
atque aromatibus & antiscorbuticis in cibis, ut zingibere, si-
napi, cinamomo, cardamomo, caryophyllis, mace, nuce mo-
scata, pipere, armoracia, nasturtio, cochlearia, aliisque mo-
derate calidi modice utantur; *calidiores* vero contrarium ob-
servent.

XLII.

*Scorbutus
& L. V.
non con-
fundenda.*

Denique *vitanda est scorbuti & luis venerea confusio*: hæc
enim, licet varia signa ac symptomata cum scorbutò habeat
communia, tamen antiscorbuticis plerisque, præsertim acro-
ribus, non curatur, sed potius exacerbatur: ille vero, &
cum primis alcalicus sive calidus, plerumque per mercurialia,
præsertim fortiora, itemque per purgantia ac sudorifera va-
lentiora redditur deterior. Ubi vero complicata sunt lues ve-
nerea & scorbutus, ut sæpe fieri solet, illa suis medicamen-
tis prius aggredienda atque expurganda, & postea quoque
scorbutus, nisi jam simul, ut sæpe fit, illius remediis subia-
tus sit. Tandem adhuc indicare volui, quod *bona dieta §.
41. indicata, motus frequens corporis, & posus sufficiens tem-
peratus*, præsertim aquosus, præcipua sint scorbuticorum
tam ad præservandum quam curandum remedia atque asy-
la.

XLIII.

De Morbis Venereis.

*Morbi ve-
neri & 1.
Gonor-
rhœa.*

MORBI VENEREI præcipui sunt *Gonorrhœa*, & ita di-
sta *Lues venerea* cum suis symptomatibus, ad quas ceteri o-
mnes referri possunt. GONORRHŒA vero est vel *benigna*,
vel *maligna* sive *virulenta*. *Benigna* dicitur fluxio seminalis
materiæ ex urethra, quæ sine dolore & inflammatione;
sed potius a laxitate, debilitate, sive *atonia glandula pro-
statæ, vesicularum seminalium, aut ductulorum* in urethra
MORGAGNI, vel ab exulceratione post gonorrhœam vi-
rulentam relicta provenit; oriturque vel sine contagio im-
puro venereo, a nimio coitu, nimis pollutionibus, aut aliis
nimis seminis profusionibus quibuscumque; vel post gonor-
rhœam

thoracem virulentam vel frequentiore, vel diuturniore, non ſatis curatam, veneno licet venereo deſtructo aut ſublato. *Virulenta* contra, ſive *maligna* inflammationem, dolorē & exulcerationem in urethra, a contagio venereo ſive coitu cum imputa ſive lue venerea affecta contractam, pro cauſa habet, dolores hinc acerbos creat, cum ardore vehementi in urethra, præſertim quando ægri urinam emittunt, atque materia excreta purulenta, viſcens & quandoque ſanguinolenta exiſtit. Superveniunt ſæpe *inflammatio & tumor præputii, tumores teſticulorum dolorifici, bubones* in inguinibus, (*poulains* Gallis) ulcera in præputio, aut glande penis, *chancres* vulgo dicta, *priapiſmus, phimofis, paraphimofis* aliæque mala, immo haud raro *ipſa lues venerea*, præſertim ſi vel negligitur, vel non rite curatur. Atque ex his *diagnofit & differentias* utriusque gonorrhœe, tinâ cum parte prægnoleos patere exiſtimo, & hoc ſolum hic adhuc addimus, quod gonorrhœa benigna inveterata ut plurimum difficilius quam maligna & recens curationem admittat, ob partes læſas nimium quantum relaxatas ac debilitatas, adeoque & ab hæc curationem noſtram auſpicabimur, atque de benigna deinceps acturi ſumus.

XLIV.

In curatione igitur virulente ad expurgandum virus venereum incipiendum a potu frequenti piſinæ tenuioris, temperantis, ſirupo dialtheæ parum edulcoratæ, atque idoneis purgantibus, iſque aliquoties repetitis, vel ex pulv. jalappæ idonea copia, vel extract. panchým. Croll. vel ex pulpa Caſſiæ, (quibus ſemper mercurius dulcis, tanquam præſtantiſſimum gonorrhœæ antidotum, apta portione, admiſcendus) conſtantibus. Deinde ulterius pro corrigenda ac deſtruenda materia virulenta bis in die vel ſæpius decoctum ex radicibus antivenereis, ſed abſque regimine ſudorifero, aſſumant, ac ſimul cum hoc præſertim in frigidioribus, Eſſentiæ & Tincturæ, quæ in ſcabie & ſcorbuto laudatæ ſunt, propinentur. Inprimis vero hic valent Tinctura antimoniî tartariſata, Eſſentia lignorum, pimpinellæ albæ & Succini. In calidioribus vero ac ſanguineis pro dolore, priapiſmo moleſtiſſimo, & ardore mitigando ſanguis mittendus, & pulvis temperans ex lapidibus cancrorum citratis, conchiis aceto præparatis, vitro & comphora compoſitus ſæpius exhibendus, eiſque interpoſito ſubinde, quovis, verbi gratiâ, tri-duo, conveniente purgante, per duas circiter hebdomadas vel diutius, pro ſymptomatum gravitate continuandum, donec fluxus ſeminalis vel purulentus, dolor allaque ſymptomata valde remittant, vel omnino ceſſent.

Curatio virulente

*Quid sub-
dito ve-
neno vene-
reo agen-
dum.*

Quod si vero, ardore & dolore cessante, fluxus tamen materiz albæ blandæ adhuc continuet, id quod virus subactum & destructum indicat, tunc *specifica fluxum hanc sistentia*, præsertim os *sepia* sæpius parca dosi exhibeatur, & vel cum Essentia balsamica vel balsamo copaivæ aliquandiu continuetur, donec omnino cesseret. Servanda vero simul diæta tenuis, vitanda venus, vinum, spiritus vini, motus vehementior & omnis excessus. Pro ordinario potu intersit vel pitana, vel simplex decoctum hordei aut avenæ, præsertim sirupo dialtheæ modice edulcatum.

XLVI.

*Quid in
malo con-
tumaci.*

Quod si *malum contumacius*, cuivis dosi pulveris ossis *sepia*, sacchari saturni, gr. i. ij. vel in robustioribus tria admisceantur, aut *pilule Blancardi* contra gonorrhæam, ex gummi. eleini, mastichis a ʒij. & terra catechu ʒj. constantes, a ʒss. ad ʒj. vesperi quotidie vel alternis diebus cum fructu usurpantur, immo & prædicto pulveri adjungantur *Injectiones in urethram* principio lenientes, ex lacte vel decocto hordei aut avenæ cum melle rosarum; circa finem vero adstringentes & roborantes, ex aqua plantaginis & calcis vivæ cum saccharo saturni, vel lapide medicamento Crollii, aut paucō spiritu vini camphorato remixta cum fructu adhibentur.

XLVII.

*Tumores
preputii
& testium.*

Bubones & ulcera venerea, preputii & testium tumores, a liaque hujus morbi symptomata, interne eodem, ut gonorrhœa recens, modo tractanda; externa vero curatio ex Chirurgia nostra prolixius peti potest: interna tamen præcipua hic trademus. Igitur si *inflammatio vel tumor preputii*, quæ sæpe vel *phimosis* vel *paraphimosis* constituere solent, adest levior, egregie discutitur, si spiritus vini vel simplex vel maxime camphoratus, tepide sæpius illinitur, cavendo, ne partes forte erosæ eo tangantur, eoque ipso dolores vehementiores moveantur; aut fomentum cum splenio sæpius applicetur ex aqua calcis vivæ, paucō spiritu vini camphorato roborata, addita cerussæ præparatæ, vel lithargyrii portione. Sin vero jam *vehementior*, aut prædicta parum sunt, unguentum album camphoratum, admixto paucō mercurio vivo, aut præcipitato albo, sæpius illinatur, & subinde decocto calido ex emollientibus & resolventibus cum lacte parato aliquandiu foveatur, vel eidem tepidæ penis per aliquod tempus immittatur, donec tumor dispareat.

XLVIII.

*Ulcera pe-
nis.*

In glandis aut præputii *erosione* sive ulcere (*chancere*) aqua calcis vivæ paucō mercurio dulci vel præcipitato albo ro-
bo-

borata, subinde abstergatur, & deinde oleum ovorum & philosophorum, partibus æqualibus mixtum, applicetur, quod oleum philosophorum etiam fungosas horum ulcerum excrescencias, consolidationem impediens, quia lenissimum septicum est, tollit. Ita & unguentum ex mercurio vivo, terebinthina, quantum sufficit, subacto, & unguento rosato paratum, aliave unguentâ ex mercurio confecta egregie hic conducunt.

XLIX.

Si ex gonorrhœa nimis cito per adstringentia suppressa, *Bubones* bubones aut testiculorum tumores orti, illa purgationibus sæpe repetitis ope mercurii dulcis, decoct. lignorum, & Essentia succini, alexipharm. vel pimpinell. alb. revocanda, & postea, ut §. XLIV. propositum est, curanda. Externe vero bubones sæpe fricandi unguento mercuriali gryseo, atque Emplastr. diachyl. cum mercurio vivo roboratum superaddendum. Si vero jam in abscessum vergunt, emplastro diachylo cum gummis, vel de melioto suppurandi, atque ut in Chirurgia docuimus, aperiendi ac persanandi.

Testiculis vero tumidis vel aqua calcis vivæ cum spiritu vini camphorato & cerussa, splenis beneficio calide imponenda, vel cataplasma ex mica panis cum lacte & croco cocta paratum; vel decoctum oryzae spissum cum lacte, aliudve simile supra dandum; & si tumor valde rursus immixtus est, reliquum emplastro de ranis cum mercurio vel diaphoretico *Myns.* vel de cumino, optime resolvitur; usurpatis simul internis modo §. precedenti laudatis.

LI.

IN GONORRHOEA BENIGNA, quæ difficilius plerumque, ut dictum est, sanatur, quam maligna, ad diffundendum serum superfluum partesque laxas roborandas, conducunt frequens motus corporis, decocta lignorum cum radice tormentillæ vel bistortæ ac pimpinellæ albæ parata, & Essentia lignorum, pimpinellæ albæ, succini, alexipharmaca, aliquoties in die hausta, interpositis subinde laxantibus mercurialibus & speciatim pilulis nostris polychrestis, aliisque similibus. Quibus post aliquod tempus, si prædicta non sufficiant, fortiora roborantia & moderate adstringentia adiungenda ac subjungenda: ut pulvis ex osse sepiæ & cyto martis, vel pilulæ Blancardi contra gonorrhœam supra §. XLIV. laudatæ, itemque Tincturæ martiales aut Mixture tonica, ex Tinctura rartari cum spiritu C. C. remixta; vel & infusum vinosum ex roborantibus, ut radic. bistortæ, tormentillæ, pimpinellæ cum cortic. aurantium, ac præsertim etiam calcarillæ confectum. Externe injectio roborans ex aqua calcis vivæ cum pauco sacchari saturâ in urethram, vel ex aqua

Calceis vivæ, vel plantaginis cum pauco spiritû vini carniphorato supra jam laudata, valde etiam hîc conducit. *Dieta* simul sit parca, siccans & roborans; bibant subinde vinum *Pontac* dictum, vel aliud simile modice adstringens; vel etiam illud cum aqua mixtum divitibus pro potu ordinatio concedi aut suadeti apte potest. Denique etiam opus est, ut ægri illo tempore a venere abstineant, donec curati sint, atque etiam postea frequentiore venerem diu evitent.

LII.

De Lue venerea.

Lues venerea.

LUES VENEREA est cachexiæ species, in qua serutis sanguinis singularem crassitudinem & acrimoniam, ut plurimum, a contagio per impurum congressum suscepit: unde stagnationes, dolores capitis & artuum præsertim noctu ingravescentes, artuum lassitudines, maculæ rubræ & crustæ sive & scabies in variis partibus, præsertim in facie, fronte, & capite, tumores, erosiones & ulcera partium mollium æque ac durarum, imprimis in partibus genitalibus, labris, palato, faucibus, & naribus, eveniunt, ita tamen, ut horum symptomatum modo minor, modo major copia adsit. *Sæpius sequitur gonorrhæam*, vel in mulieribus *post fluxum album virulentum*, intempestive suppressum aut neglectum; vel quod frequentius, *bubones* aut *ulcera venerea* (*chancres*) in partibus genitalibus neglecta aut male tractata; unde fermentum sive virus venereum totam massam sanguineam ipsasque partes solidas inficit ac lædit.

LIII.

Ejus divisio.

Dividi apte potest hæc Lues in *leviorem* & *vehementiorem*. **LEVIOREM** vocamus gradum, si malum tantummodo in humoribus adhuc existit, & lassitudine, torpore, doloribus capitis & artuum, nocte ingravescentibus, terro faciei colore, maculis lividis, scabie capitis aut frontis, vel etiam bubonibus, aut levioribus ulcusculis in partibus genitalibus vel faucibus, &c. se manifestat. *Sin vero partes solidas*, ut fauces, uvam, palatum, nasum, penem & præcipue ossa palati, nasi aut cranii jam invasit, & quidem jam vehementius, ita ut vel uva exesa, vel septum nasi aut palatum erosum, vel omnino jam perforatum, tumoresque hinc inde sive nodi venerei, & graviores aliæ exulcerationes oriuntur, *gradus hujus morbi est vehementior*, periculosior, curatuque longe difficilior: immo quo plura & pejora adsunt symptomata & læsiones, quo diutius jam duravit, quo corpus ma-

his extenuatum ac consumptum, & quo magis jam vires de-
 stitit, eo difficilius curatur, aut quandoque, præsertim ob
 virium defectum, prorsus est insanabilis. Qui a juventute
 sive a matre, sive a nutrice impura jam infecti sunt, o-
 mnium difficillime, aut prorsus non curantur.

LIV.

In curatione igitur Lævis veneræ virus venerethim est ex-
 pellendum, destruendum, & cachexia illa peculiaris corri-
 penda: id quod in leviori (vel saltem non adeo vehementi
 gradu, sine salivatione & solum attentantibus, sudoriferis,
 maxime decoctis lignorum, ut ligni sassafras, quajaci, ju-
 niperi, radicis saraparillæ, chinæ, bardanæ, pimpinellæ al-
 bæ; ut & herba saponaria; mane & citra vespertam, vel
 sæpius larga satis copia datis, præmissis & interpositis sæpe
 purgantibus mercurialibus, haud raro obtineri potest; cum
 quibus tamen decoctis Tinctura antimonii tartarisata, Es-
 sentia lignorum vel pimpinellæ, &c. majoris efficaciae causa
 apta dosis semper exhibeatur, adjuncto regimine diaphore-
 tico aut blande sudorifero, mane vel in lectulo, vel quod
 nonnullis magis placet, in stuphis aut artculis sudatoriis.
 Certius tamen & melius succedet curatio, si simul singulis
 vel alternis diebus parva dosis mercurii dulcis vel panaceæ
 mercurialis exhibetur; vel & quotidie unguento mercuriali
 tarsi ac malleoli pedum, itemque flexuræ cubiti probe fri-
 cantur, hisque prudenter continuatur, (vitando salivationem)
 donec symptomata sublata sint. *Frigidioribus*, phlegmaticis &
 succolentis temperamenti pro decoctis illis magis ligna;
validioribus vero & macilentioribus, radices & herbas lau-
 datas, tanquam temperatiores, præscribere soleo, & pro po-
 tu ordinario decoctum secundarium harum radicum, vel &
 prisanam.

LV.

In graviore aut inveterato malo, maxime ubi partes geni-
 tales, fauces, palatum, nasus, frons, immo ossa jam ero-
 sa, tumores duri & dolores osteocopi fixiores, &c. adfunt,
sudorifera hæc cura sæpe non sufficit, sed vel fortior usus mer-
 curialium, verum absque salivatione, attamen ad instantem
 usque salivationem, vel ipsa salivatio mercurialis requiritur,
 quæ medicamentis vel internis vel externis solis, vel am-
 bobus combinatis, eaque vel leniori vel fortiori modo, ex-
 citari potest. *Utrique præmissenda* una aut altera *lenis pur-
 gatio* mercurialis, usque aliquot dierum decocti lignorum
 ac radicum primarii & secundarii, modo laudatorum, lar-
 gis, itemque diæta moderata tenuis; atque in plethoricis
 quoque sanguinis missio.

LVI.

Curatio
 gradus le-
 vioris.

Gradus
 gravioris.

*Quomodo
salivatio
instituen-
da.*

Sique deinde *internis salivationem excitare lubet*, mercurii dulcis (qui inter *mercurialia securissimus* mihi videtur,) gran. V. VI. VIII. vel X. pro subjectorum diversitate, bis, terve in die, sub boli, pilularum, vel pulveris forma agris exhibeantur, donec tumor faucium & gingivarum, anima fetida, exspitio crebrior, aliqualis erosio linguæ labrorum, genarum, & gingivarum, dentiumque vacillatio, tanquam lenis salivationis signa appareant; quæ si incidunt, ab usu mercurii desistendum, & interea decocta & pitana apta continuandum, donec fluxus salivæ sufficiens sensim sequatur; & si postea quotidie libræ duæ vel libræ tres circiter intra horas XXIV. expuantur, sufficit: atque sic per hebdomades tres, quatuor, quinque vel sex, donec symptomata, maxime dolores, tumores & ulcera, valde sint imminuta, aut prorsus evanuerint, continuetur, exhibendo subinde, si minui salivatio videtur, circa vespertim, aliquot grana mercurii dulcis vel panaceæ mercurialis; atque hoc modo salivatio per sat longum tempus continuanda: nam brevi tempore in graviori malo curatio plerumque absolvi recte nequit, sed malum si non satis diu continuatur facile post hanc curationem recrudescit.

LVII.

In nonnullis laudata *mercurialia salivationem, haud produ-
cunt*, sed parum sunt, præsertim in robustioribus; quibus in casibus, si aliquandiu frustra adhibita fuerunt, singulæ dosi mercurii dulcis aut panaceæ, *surpetibi mineralis* gran. ij. vel iij. admisceo, sic plerumque brevi inde succedit: sed his deinde in casibus iisdem remediis etiam salivatio, si minui incipit, est continuanda, quandiu malum eam exigit.

LVIII.

*Quid post
salivatio-
nem egen-
dum.*

*Postquam sic symptomata maxima ex parte vel in totum eva-
nuerunt*, decocta sudorifera aliquandiu cum regimine diaphoretico sunt continuanda, ad malum radicitus extirpandum, interponendo simul subinde vespertim pauca grana mercurii dulcis, ad lenem salivationis vestigium adhuc aliquandiu conser- vandum, donec omnia mala sublata sint.

LIX.

*Quomodo
per exter-
na excita-
tur.*

Si vero externis salivationem instituere placet medicamentis, unguentum mercuriale, ex mercurio crudo & axungia porcina paratum, inungitur primo quotidie bis aut ter calide tarsis pedum, malleolis & suris, singula vice fabæ aut phaseoli magnitudine: & quidem melius ab ægro ipso quam ab alio, ad ignem vel fornacem, linteo postea involvendis, & si post alterum tertiumve diem nulla adhuc salivationis signa adsunt, etiam flexuris cubiti, immo & parotidibus

alibus sub auribus, per mercurium inungat, partes unguento illo probe ac calide fricando, donec salivatio sequatur sufficiens, ubi ab inunctione abstinendum, quandiu saliva satis fluit: quæ vero fricatio cum unguento mercuriali, quories salivatio minuitur, vespertini iteranda, involutis semper parvis bandis per lintea & fascias, atque sic circumspecte continuandum, ut antea dictum, donec malum sublatum est.

LX.

Quando internis & externis remediis simul salivationem producere volumus, quotidie semel vel bis parva dosis mercurii dulcis exhibetur, & simul semel vel bis fricatio pedum & crurum vel & cubitorum, si lubet, instituitur, eisque continuatur, donec salivatio sequatur. Nonnulli etiam spinam dorsii unguento mercuriali fricant; verum quia hoc facile varia damna producere potest, & antea §. 59. descripta satis efficax est, ab hoc abstinendum esse censeo.

Quomodo
utraq.
salivatio.

LXI.

Interea dum hæc fiunt, atque durante etiam salivatione, os sæpe aqua calida aut gargarismate emolliente eluatur, potus assumatur sufficiens, aquosus, diluens, ut mane & a meridie decoctum aliquod radicum & lignorum huic morbo contrariorum, reliquo diei tempore vel decoctum huius secundarium, vel pisanum aut decoctum hordei cum passulis, vel cum liquiritia & semine anisi aut fœniculi paratum, immo & cerevisia tenuis bonæ notæ, quandoque, si eam anxie desiderant, concedi potest, itemque Thea & Cossæ: sed si æger forte, ut sæpe contingit, temporis tractu fiat debilis, interponi subinde potest mixtura ex aquis cordialibus, vel emulsio similis, itemque gelatinæ roborantes; si que æger a lacte non abhorret, decoctis prædictis semper aliquid lactis calidi admisceri, immo lac cum pane triticeo calide pro cœna, immo & pro prandio cum fructu dari apte potest, præsertim macilentis & debilibus.

Quid du-
rante sa-
livatione
facien-
dum.

LXII.

Dieta sit parca & tenuis, ex solis fere iusculis, ac, si plus Dieta appetant, cibis mollioribus sive facilis digestionis constans; vitentur vero aromata, salsa, acida, cruda & crassiora, caro suilla, lardum, legumina, olea duriora, repletio nimia, ac frigus, corpusque semper in aere temperato ac leni diaphoresi conservetur, quamdiu salivatio durat, corpusque & mens sint tranquilla.

LXIII.

1. Si salivatio oriatur nimia, & fauces nimis quantum intume-
scunt, ita ut periculum suffocationis inde imminet, mox vel clystma forte, vel purgans aliquod paulo vehementius, sed sine mercurio, ad affluxum ad fauces nimium revellendum, exhibea-

Quomodo
salivatio
instituen-
da.

Sique deinde *internis salivationem excitare lubet*, mercurii dulcis (qui inter *mercurialia securissimus* mihi videtur,) gran. V. VI. VIII. vel X. pro subjectorum diversitate, bis, terve in die, sub boli, pilularum, vel pulveris forma ægris exhibeantur, donec tumor faucium & gingivarum, anima foetida, expuitio crebrior, aliqualis erosio linguæ labrorum, genarum, & gingivarum, dentiumque vacillatio, tanquam lenis salivationis signa appareant; quæ si incidunt, ab usu mercurii desistendum, & interea decocta & ptisana apta continuandum, donec fluxus salivæ sufficiens sensim sequatur; & si postea quotidie libræ duæ vel libræ tres circiter intra horas XXIV. expuantur, sufficit: atque sic per hebdomades tres, quatuor, quinque vel sex, donec symptomata, maxime dolores, tumores & ulcera, valde sint imminuta, aut prorsus evanuerint, continuetur, exhibendo subinde, si minui salivatio videtur, circa vespertinam, aliquot grana mercurii dulcis vel panaceæ mercurialis; atque hoc modo salivatio per sat longum tempus continuanda: nam brevi tempore in graviori malo curatio plerumque absolvi recte nequit, sed malum si non satis diu continuatur facile post hanc curationem recrudescit.

LVII.

In nonnullis laudata *mercurialia salivationem* haud producant, sed parum sunt, præsertim in robustioribus; quibus in casibus, si aliquandiu frustra adhibita fuerunt, singulæ dosi mercurii dulcis aut panaceæ, *surpeshi mineralis* gran. ij. vel iij. admisceo, sic plerumque brevi inde succedit: sed his deinde in casibus iisdem remedium etiam salivatio, si minui incipit, est continuanda, quandiu malum eam exigit.

LVIII.

Quid post
salivatio-
nem agen-
dum.

Postquam sic symptomata maxima ex parte vel in totum evanuerunt, decocta sudorifera aliquandiu cum regimine diaphoretico sunt continuanda, ad malum radicitus extirpandum, interponendo simul subinde vesperti pauca grana mercurii dulcis, ad lenæ salivationis vestigium adhuc aliquandiu conservandum, donec omnia mala sublata sint.

LIX.

Quomodo
per exter-
na excite-
tur.

Si vero *externis salivationem instituere* placet medicamentis, unguentum mercuriale, ex mercurio crudo & axungia porcina paratum, inungitur primo quotidie bis aut ter calide tarsis pedum, malleolis & suris, singula vice fabæ aut phasoli magnitudine: & quidem melius ab ægro ipso quam ab alio, ad ignem vel fornacem, linteo postea involvendis, & si post alterum tertiumve diem nulla adhuc salivationis signa adfunt, etiam flexuris cubiti, immo & parotidibus

dibus sub auribus, eger mercurium inungat, partes unguento illo probe ac calide fricando, *donec salivatio sequatur. Sufficiens*; ubi ab inunctione abstinendum, quandiu saliva satis fluit; quæ vero fricatio cum unguento mercuriali, quoties salivatio minuitur, vespere iteranda, involutis semper parvibus mandis per lintea & fascias, atque sic circumspicte continuandum, ut antea dictum, donec malum sublatum est.

LX.

Quando internis & externis remediis simul salivationem promoveri volumus, quotidie semel vel bis parva dosis mercurii dulcis exhibetur, & simul semel vel bis fricatio pedum & crurum vel & cubitorum, si lubet, instituitur, eisque continuatur, donec salivatio sequatur. Nonnulli etiam spinam dorsi unguento mercuriali fricant; verum quia hoc facile varia damna producere potest, & antea §. 59. descripta satis efficax est, ab hoc abstinendum esse censeo.

Quomodo utraque salivatio.

LXI.

Interea dum hæc fiunt, atque durante etiam salivatione, os sæpe aqua calida aut *gargarisate* emolliente eluatur, *potus* assumatur sufficiens; aquosus, diluens, ut mane & a meridie decoctum aliquod radicum & lignorum huic morbo contrariorum, reliquo diei tempore vel decoctum huius secundarium, vel ptisana aut decoctum hordei cum passulis, vel cum liquiritia & semine anisi aut fœniculi paratum, immo & cerevisia tenuis bonæ notæ, quandoque, si eam anxie desiderant, concedi potest, itemque Thea & Caffè: sed si æger forte, ut sæpe contingit, temporis tractu fiat debilis, interponi subinde potest mixtura ex aquis cordialibus, vel emulsiō similis, itemque gelatinæ roborantes; si que æger a lacte non abhorret, decoctis prædictis semper aliquid lactis calidi admisceri, immo lac cum pane triticeo calide pro cœna, immo & pro prandio cum fructu dari apte potest, præsertim macilentis & debilibus.

Quid durante salivatione faciendum.

LXII.

Dieta sit parca & tenuis, ex solis fere iusculis, ac, si plus appetant, ribis mollioribus sive facilis digestionis constans; vitentur vero aromata, salsa, acida, cruda & crassiora, caro suilla, lardum, legumina, olea duriora, repletio nimia, ac frigus, corpusque semper in aere temperato ac leni diaphoresi conservetur, quamdiu salivatio durat, corpusque & mens sint tranquilla.

LXIII.

1. *Si salivatio oriatur nimia*, & fauces nimis quantum intumescunt, ita ut periculum suffocationis inde imminet, mox vel clystma forte, vel purgans aliquod paulo vehementius, sed sine mercurio, ad affluxum ad fauces nimium revellendum, exhibea-

hibeatur : idque , si opus , repetatur , donec rufus detu-
muerint.

2. Quando una salivatio morbum non omnino sustulit , aut
ob ægri impatiëntiam vel debilitatem satis diu continuata
non est , post aliquod tempus , vel etiam redeuntibus vene-
reis symptomatibus , repeti potest ; præsertim si æger robu-
stus , & salivatio prior facile successit.

LXIV.

De usu sa- Denique norandum , salivationem non solum contra morbos
livationis venereos prodesse , verum etiam in multis aliis morbis per-
in aliis tinacibus & gravibus , ut amaurosi , cataracta , ulceribus re-
morbis. bellibus , scabie pertinaci , tumoribus , &c. sanandis adhibe-
ri posse .

LXV.

Sympto-
matica mor-
bi venerei.

Scirrhi , *Tophi* sive *nodi venerei* sub usu laudatorum me-
dicamentorum antivenereorum & cumprimis salivationis ,
plerumque digeruntur ac dissipantur , præsertim si nondum
inveterati , & si sub ea simul empl. vigon. eunt. duplo vel
triplo mercurii , vel diachylum cum mercurio superimponi-
tur , & unguento mercuriali tractantur . Sin. vero dissipatio ,
uti quandoque contingit , obtineri non possit , *tophi* scalpel-
lo aperiendi , mercurio præcipitato rubro , unguentis admixto ,
mundandi , ac postea , ut ulcus , consolidandi . *Scirrhi* vero
quando resolvi nequeunt , si tuto id fieri potest , & ægri ab
his liberi esse volunt , excindendi .

Ulcera venerea externa curatione generali sæpe simul sanan-
tur , sine peculiari sæpe ad ea attentione . Interea tamen me-
lius agimus , si ea simul mundantur mercurio præcipitato ru-
bro ; unguento basilico vel digestivo modico intermixto , vel
æqua phagedenica , & dein vel unguento mercuriali , vel es-
sentia lignor. vel succini , myrrhæ aliave simili sanantur .

Ulcera faucium venerea , præter curationem internam , sæ-
pius abstergenda decocto lignorum , Essentiâ succini & myr-
tha imprægnato ; vel decocto herbæ cujusdam vulnerariæ ,
mellè rosarum & spiritu vitrioli imprægnato , vel etiam hoc
mellè & spiritu subinde solo . Si vero *malum ossa palati at-*
rosit , oleum caryophyllorum , cum oleo ovorum temperatum ,
sæpe adhibendum .

Ulcera nasi venerea requirunt , ut turundæ , aqua calcis vi-
væ , mercurio dulci imprægnatæ , sæpius imbuantur , & in
nares immittantur ; vel ut unguento mercuriali subinde quoque
illinantur , curatione simul internâ laudata rite adhibita ,
utpote sub qua ut plurimum glutinari solent .

Verruce & excrescentia venerea circa partes genitales spiritu
vitrioli vel salis , vel pulvere herb. sabinz , cum mercurio
præcipitato rubro vel lapide infernali , si prædicta curatio acce-
dat

dat interna, auferuntur, sine hac vero perfecte vix curantur.

LXVI.

Du Fluore albo.

FLUOR ALBUS *mulierum* quoque cachexiæ species est, *Fluor albus ejus-que divi-* & quasi coryza uteri, sive gonorrhœa mulierum, atque hinc *so.* quoque in benignum & malignum sive venereum, aut virulentum dividi solet.

In *benigno*, serosa magis aut mucosa & plus minus rodens est materia effluens; sed siue aliis indicibus luis venereæ; in *maligno* vero sive *venereo*, purulenta, viridescens, flavescentes, versicolor, magis foetida, & magis erodens effluit, aliisque luis venereæ sæpius comitatur symptomatibus, temporeque mensium fluere non intermittit; quæ vero in benigno tunc intermittere solet.

LXVII.

Ratione curationis *fluor albus benignus*, præsertim qui jam diu duravit, ob partes nimium quantum relaxatas curatu difficillimus est, attamen ad eum tollendum in plethoricis revulsionis gratiæ Venæ sectio instituat in brachio; quæ vero in pituitosis nocet, adeoque intermittenda. In utroque autem casu ad *scri supervacui*, quod hic peccat, *evacuacionem & revulsionem* curationi idoneis purgantibus, admixtis serum corrigentibus vasaque simul roborantibus, est inchoanda, *inprimis vero vino quodam medicato*, quotidie apta copia per aliquod tempus, ex herbis & radicibus uterinis balsamicis & aromaticis parato, ut herba melissæ, rosmarini, marrubii, abrotani, radic. aristolochiæ, cichorii, charyophyllatæ, helenii, pimpinellæ albæ, levistici, rhabarbari, helilebori nigri, & foliis fennæ parato; vel pilulis balsamicis Beccherianis, aliisque similibus, per plures dies apta dosi usurpatis. Postea autem pro cachexia viscida & lymphæ corrigenda tonoque partium relaxatarum rursus roborando, diuturnus usus Essentiæ succini, cui parum Essentiæ myrrhæ additum sit, præstantissimus est, si quotidie bis vel ter assumatur ex infuso aqueo herbæ melissæ, vel rosmarini, vel millefolii, &c. vel his & similibus combinatis. His utrumque ob scopum interponantur adhuc sæpius pilulæ balsamicæ Beccherianæ, aut aliæ similes. Denique quando multum hic fluxus imminutus est, & prædictis omnino tolli nequeat, id quod tamen haud raro contingit, interne loco præcedentium, paullo *fortiora roborantia* & quidem martialia præstantiora ac probatiora, ut Tinctura vitrioli martis Zvvcelff, Tinctura martis aperitiva Ludovici, Tinctura martis cydoniata, aut crocus martis aperitivus loco priorum usurpanda.

LXVIII.

Curatio interna benigna.

Curatio externa. Externe verò ex herbis nervinis, uterinis & subadstringentibus balnea sive *injectiones*, immo in malo rebelliori, in *injectiones* quoque cum vino rubro ex similibus paratz, in vaginam uteri aliquoties in die fieri possunt: ut ex roremarino, hormino, matricaria, mentha, melissa, pulegio, salvia, millefolio, cum radicibus bistortæ, tormentillæ & pauco alumine; vel & ex aqua calcis vivæ; ita & *aque medicatæ martiales*, vel *thermæ* externe & intetne per satis longum tempus & rite usurpatæ, hoc in malo cum fructu ut plurimum si venerea labes abest, adhibentur.

LXIX.

Dieta. *Dieta*, sicut in cachexia generatim dictum est, & hic probe observetur: in primis vero vitentur lac, acida, fructus horzi, farinacea, pingua & omnia quæ pituitam generare possunt, itemque potus nimius Theæ, Coffeæ, cerevisiæ, ut & venus nimia, &c. alias omnia medicamenta in pernici aut rebelli hoc malo frustranea sunt.

LXX.

Fluoris albi mali sui curatio. FLUOR ALBUS MALIGNUS sive *venerens*, ut gonorrhœa virulenta in vinis, quia eandem causam agnoscit, curandus; aut si ipsam luem *venerream* comitetur, ut hæc quoque tractandus: ubi vero simul *infectio ex aqua calcis vivæ* cum mercur. dulci in vaginam uteri aliquoties in die immissa, egregie hic commendat, roborat & sanat. Si tamen destructo veneno venereo, ob partes affectas, sive patientes a morbo valde relaxatas ac debilitatas, fluxus aliquis, sicut post gonorrhœam virulentam sæpe quoque fieri solet, remaneat, quia hic tunc, ut benignus considerandus, etiam eadem, quo modo hunc curare præcepimus, ratione, N. LXVII. est sanandus.

CAPUT XII.

De Obstructionibus.

I.

Quid obstructio.

SI transitus rerum fluidarum aliarumque quarumcunque in corpore humano contentarum, quæ moveri, fluere, propelli aut expelli debent, quocunque modo in vasibus, canalibus, ductibus, intestinis, vesica, aliisque viis ac partibus corporis humani impeditur, *Obstructio* appellatur, unde, ut omnis generis morbi proveniant, necesse est; sicuti ex fluxibus sanguinis, præsertim mensium aut hæmorrhoidum suppressis, obstructis, aliisque supra jam cap. IX. p. 98. expositis, intelligit

telligi potest. Nunc vero alias adhuc obstructions, quæ in corpore humano contingunt considerabimus: ubi sciendum est, liberum in corpore motum sive transitum, ut quis sanus sit, desiderare sanguinem aliosque humores utiles & excrementitios, itemque spiritus, bilem, genituram, salivam, lac, aerem, flatum, feces, urinam, foetum & secundinas in partu, &c. Hoc vero ut rite fiat, partes, quæ transitum concedere, & res, quæ transire debent, recte sint constitutæ, necesse est, atque ut causa sive vis propellens & expellens sit satis valida. Quando igitur liber itus aut reditus rerum propellendarum impeditur, obstructio aut saltem motus vel transitus remora & varia inde pendentia symptomata proveniunt: causæque erit vel in movente, vel in viis, vel in re transmittenda, vel in variis his simul.

II.

Vasa & viæ, dum ad transitum ineptæ fiunt, vel angustantur, collabuntur, obstruuntur, comprimuntur, vel conrescunt, & sic, quod transmittere debent, transmittere non possunt. Eorum causas, I. angustatio vasorum.

Angustantur autem a rebus variis: nimirum vel a tartarea vel gypsea substantia, iotus parietibus vasorum adnata, verbi causa, viæ bilis in hepate; vel a glutinosa aut viscida materia, sive a pituita, intrus obducuntur certæ partes, ut nares, bronchia & aspera arteria, sicut in coryza, tussi, dyspnœa & asthma; vel a spasmodicis prædictæ partes respiratori inservientes contrahuntur, unde eadem mala; vel angustantur a tumoribus & inflammationibus, ut fauces a tonsillis intumescens; itemque subinde in urethra a cavernosa ejus substantia turgescens, (a) qua urinæ libera excretio sæpe impeditur; vel a rebus p. n. excrecentibus, sive tuberculis & carunculis; ut a polypo narium, caruncula urethrae, vaginae uteri, intestini recti, &c.

III.

Vel collabuntur vasa a sanguinis aut humorum defectu, post hæmorrhagias largas, fluxus alvi longos, inediam diuturnam, &c. unde tabes vel atrophia; vel a spirituum defectu nervi coincidunt, in deliquiis animi, affectibus soporosis, commate, caro, lethargo, apoplexia, paralyti, marasmo senili, &c. II. Collapsus.

IV.

Obstruuntur vero vasa sangüifera sæpissime a rebus transmittendis; ut a sanguine viscido tenaci, aliave materia spissata, ut in tumoribus varii generis, in glandulis induratis quibuscumque, earumque schirris & scrophulis; vel canales & meatus a corporibus solidis, ut ductus biliaris a calculis; vel terrea sive gypsea substantia; meatus auditorius; a cerumine duro, &c. III. Obstructio.

duro; a pisib; vel calculis illapfis aut intrufis; *ureteres* & *urebra*, itidem a calculis vel fanguine craffo, in vel post mictum cruentum; *nares* a polypo; *bronchia*, *aspera arteria*, ab illapfis rebus folidis quibufcumque; *œſophagus*, a deglutitis offibus, ſpinis piſcium, vel nucleis, v. gr. prunorum ibidem ſubſiſtentibus; vel corporibus *excreſcentibus* aliſque rebus; *ſinus cerebri* & *vaſa majora cordis*, immo ipſum cor a *polypofis* concretionibus; *mammæ* a ſanguine vel lacte nimis ſpiſſo; *teſticulari* a liquido genitali virioſo; *alvus* plerumque a fecibus durioribus, quandoque etiam a calculo, (a) *nucleis ceraſorum* copioſe cum ceraſis comeltis. in quibus omnibus, quo major eſt obſtructio, eo major inde oritur noxa. Huc etiam pertinet *fœtus nimis magnus* vel monſtruofus, uterum tempore partus ita occludens, ut expelli nequeat; id quod etiam de *ſecundis nimis magnis* poſt partum, intelligendum.

V.

4. Com-
preſſio vel
coarctatio.

Comprimuntur vaſa a ligaturis fortioribus, ut in fracturis, luxationibus, vulneribus, ut humores ea tranſire nequeant, atque inde tumores, inflammationes, gangæna, ſcirrhi, &c. oriuntur; vel *ab humoribus extra vaſa ſua p. n. effuſis*, ut in cerebro & thorace: unde apoplexiæ diſpnoea, ſuffocatio, ſyncope, &c. & ſæpe mors proveniant. Quandoque *certaine partes magna ex parte vel omnino p. n. coaleſcunt*, aut in utero materno jam ſunt coalitæ; ut *partes genitales* & obſcena in ita dictis *aretis*, de quibus in Inſtit. chirurg. ita ut id, quod tranſmittere debent, tranſmittere nequeant, vel etiam a *leſionibus externis* quædam partes ſubinde vel integre, vel ex parte *concreſcunt*: ut oculi & nares a variolis; vel ambuſtione; vel vagina uteri poſt partum difficilem, facta inde gravi quadam laceratione, vel *vulnere aut ulcere barum partium male curatis*; id quod & in antiquo quoque ab ejuſmodi læſione factum eſſe recordamur.

VI.

4. A ſpi-
rituum
deſectu.

In partium morientium aut ſpirituum culpa reſidere quoque poteſt cauſa variarum obſtructionum, ſi *fibra partium nimis ſunt flaccida*, & *sanguis aut ſpiritus vel deficient*, vel narcoticis rebus oppreſſi; ſicut obſervatur in morbis ſoporofis, comate, caro, apoplexia, paralyſi, iſchuria ſenili, virium languore quocumque, in ſenibus aliſque debilibus, & imprimis quoque in *parturientibus* in partu longo ac difficili; quo etiam pertinet *ſumus carbonum* in cubilibus lociſve clauſis quibufcumque.

VII.

[a] Novi exemplum, ubi nobili in vicinia magnus calculus, annis pertinaciter obſtruens, ope ſeramentorum ſeligiter extractus eſt.

VII.

In curatione igitur obstructionum generatim illud, quod *Cura et* *obstru-*
 beret, siue fiat & quietum est, in motum est concitandum, *num gene-*
 & causa siue remora vias angustans vel obstruens, aut motus
 impediens, investiganda ac tollenda; id quod pro causarum
 diversitate diverso modo fieri debet. Si enim *vasa collapsa*,
 distendenda; si *constricta* aut *compressa*, relaxanda; si *obstru-*
cta; aperienda; si p. n. *concreta*, incidenda, &c.

VIII.

De Dyspnœa & Asthmate pituitoso.

In spirandi difficultate siue *dyspnœa* vel *asthmate* ab hu- *Dyspnœa*
 moribus viscidis, quod *asthma pituitosum* vocant, & ex re- *& asth-*
 jecta multa pituita dignoscitur, *infusa* aut decocta cum
 aqua *ex resolventibus herbis & radicibus pectoralibus* compo-
 sita; ut ex herba veronicæ, hyssopi, radic. fœniculi, ari,
 enulæ, semine anisi, fœniculi, &c. mane & circa vespertam
 assumpta, egregie conducunt; itemque *infusa* ex iisdem ra-
 dicibus & herbis cum vino parata, & vel in pastu vel cir-
 ca pastum usurpata, ut & Essent. helenii, pimpinellæ,
 succini, Elixir. pectorale Wedelii, spir. salis ammoniaci
 anisat. balsam. sulphuris anisat. cum prædictis infusis data;
 ita & species diaireos, vel *pulvis pectoralis* dictus, ex la-
 pid. cancrorum cum sperm. ceti & sacchar. cand. composi-
 tus, adjectis aliquot guttulis olei anisi, egregie resolvit, si
 sæpius a ℥j. ad ʒss. exhibetur. Aut *gummi ammoniacum*
 vel in pilulis, vel in potiuncula, aqua hyssopi vel veroni-
 cæ ac vino rhenano solutum & sæpius ad ℥j. vel ʒss. ex-
 hibitum, vel in celebri *potiuncula asthmatica Bruneri* datum.
 (a) Quandoque *Loach ad asthma* usitatum bene prodest; qui-
 bus vero omnibus subinde *purgantia* idonea sunt interponen-
 da, vel quandoque etiam *emeticum* ad humores noxios per
 superiora ejiciendos; immo & *vesicatoria* in suris aut cruri-
 bus adhibita in hoc malo sæpe sunt valentissima, itemque
pediluvia, atque, si fieri potest, *frequens motus corporis* simul in-
 stituatur. Multis etiam *aquarum medicatarum* usus his in malis e-
 gregie prodest, præsertim si calide vel saltem tepide bibantur.

L

Non-

[a] Quæ ita se habet. 2℥. gummi ammoniaci purissimi ʒij.
 ʒij. solv. in aqua hyssopi ʒiv. & vin. rhenan. ʒij. M. dentur sæpius
 cochlearia tria, donec respirandi difficultas remittat.

Nonnulli pulverem radices squille hic valde commendant & mira inde prædicunt, qui etiam sæpe egregius est. Vid. de hac. cum primis sæpius jam laudari WAGNERI observ. clinicæ. Quod si forte paullo *vehementior paroxysmus asthmaticus* ægrum aggregiatur, quavis hora etiam *oxymellis squillitici* ℞. vel cochlear. j. cum fructu exhibetur, donec ℞. vel ℞ij. nisi citius remittat, assumatæ sint. *Præservandi* gratia valde conducunt, fonticuli in pedibus, purgantia idonea per intervalla exhibita, sanguinis missiones in plethoricis, & aquæ medicatæ cum motu & exercitatione frequenti.

IX.

De Asthmate sanguineo, flatulento, spasmodico & scirrhuso.

Asthma sanguineum & flatulentum.

Si Asthma est sanguineum, quod a nimia sanguinis ac præsertim spissi copia, in vasis pulmonum hærente, oriri videtur missio sanguinis utilissima ac summe necessaria est, præmissis & subjunctis laudatis modo §. VIII. infusis aut decoctis pectoralibus, guttis, pulveribus, potiunculis & ceteris. Quando a flatibus, ventriculorum & intestina valde distendentibus, atque diaphragma & pulmones ita prementibus, ut libere ac recte respirationem perficere nequeant, quod Asthma flatulentum appellare solent, servata primo moderata victus ratione, status discutientia sive carminativa, ut aqua carminativa officinar. aqua anisi vel carvi vel cortic. aurant. spirituosæ, ad cochlear. j. ij. vel iij. Essent. carminativa Wedelii, Cortic. aurant. spiritus nitri dulcis, vel carminativus aut anticolicus de tribus, a gutt. 30. ad 50. per intervalla exhibita, eeregie profunt. Ita & pulvis flaved. corr. aurant. a ℞. ad ℞j. cum vini ℞j. vel ℞ij. calefactus aut leviter coctus, addito panxillo sacchari ad gratiam, vel iidem cortices vino vel cerevisia infusi valentissime etiam status expellunt, & viscera simul roborant; immo & clysteres ex carminantibus adhibiti magnum quoque sæpius, præsertim si alvus obstructa, his ægris levamen afferunt.

X.

Asthma spasmodicum.

Si asthma a bronchiis spasmo constrictis, sive angustatis, quod asthma spasmodicum appellatur, provenit, antispasmodica, temperantia, cinnabarina, nitrosa ac succinnata, & inprimis etiam liquor. C. C. succinatus, pulvis antispasmodicus, pulvis Marchionis, cum spec. cephal. Michaelis, immo & cum his pediluvia, & vesicatoria pedibus sunt adhibenda.

Asthma scirrhusum.

Si a scirrhis in pulmonibus, quod asthma scirrhusum dici potest, resolventia, ac diluentia, §. XII. laudata, itemque aquæ

aque medicatæ, immo & mercurialia lenia, diu usurpata egregie profunt, atque in sanguineis venæ sectio quoque subinde est adhibenda.

De *Ictero*, quia sæpius ab obstructione vasorum sive ductuum biliarium ortum trahit, hic quoque jam agi posset; verum quia jam Cap. XI. de cachexia §. 23. de eo actum est, nolumus idem hic repetere.

XI.

Si viæ angustantur ab inflammationibus aut tumoribus, ut fauces, in tonsillarum & pharyngis inflammatione, inflammationes hæ, sicut supra Cap. VII. §. XX. & XXI. docuimus, sunt resolvendæ. Si a corporibus excrecentibus, tumoribus duris, aut scirrhis, quæ medicamentis in Insistunt. chirurg. nostris, locis debitis, indicatis, tolli aut resolvi nequeunt, manu chirurgica, si tuto id fieri licet, auferendi.

XII.

De Alvi obstructa.

In alvi obstructione sive segnitie, flatulentia & colica; a virium defectu, conducunt roborantia, ut vinum generosum, aquæ, spiritus & essentia roborantes, carminativæ & blande aromaticæ, spiritus nigri dulcis, spiritus carminativ. de tribus, sive anticolicus, & clysmata aut supposito-
ria. In hac alvi segnitie præter dicta, spiritus etiam torpidos & fibras languidas intestinorum excitant purgantia leniora; ut aqua amara cathartica Seidlitzensis, Carlsbadensis, Wisbadensis aliave similis; vel sal quoddam amarum catharticum, ut bohemicum vel anglicanum, aut mirabile Glauberi, aqua calida vel simplici vel minerali quadam solutum & haustum; vel potiuncula quedam laxans ex tamarindis, foliis sennæ & manna, ut *Mangetta*, vel *Sydenhamii* aliave similis, itemque Electuar. de tamarindis, cum fol. sennæ paratum, iusta quantitate datum.

Si alvus a fecibus durioribus obstructa, victu humectante ac lubricante ex prunis, cerasis aut pomis coctis, cum vel sine passulis aliisque similibus, potu copiosiori, præsertim etiam Coffeæ, cum vel sine paucillo lactis admixto, lotionibus alvi sive clysmatibus; emollientibus, itemque modo laudatis blande alvum moventibus aquosis aut salinis.

Si nuclei cerasorum copiosius comesti alvum pertinaciter obstruunt, ut quandoque observatum est; vel calculus major in intestinis natus, ut aliquando contingere solet.

§. IV. jam indicavi, uncinulis in chirurg. noſtr. Tab. 27. fig. 10. aut Tab. 33. fig. 17. itemque forcipibus calculariis Tab. 28. aliisque idoneis instrumentis ejiciendi.

XIII.

De Ileo.

*Iliaca
paſſio.*

In ILEO, (quod pertinaciſſima eſt alvi obſtructio cum vomitu vehementi, naſea, atque acerbiffimi ventris doloribus) quod vel a ſecibus induratis, vel ab inflammatione inteſtinorum, vel quod frequentiffimum eſt, ab hernia umbilici aut inguinum aut ſerotri *incaſcerata*, ut vocant, producitur, pro cauſſæ varietate etiam curatio eſt varianda. Adeoque ſi a *ſecibus induratis* oriatur, lenia laxantia exhibenda, & præſertim *ſal catharticum Anglican.* vel Bohem. cum aqua ſellerenſi aliave medicata datum; vel *decoctum ex foliis ſennæ*, tamarindis & mænna, paratum ac partitis vicibus exhibitum, egregie ſæpius prodeſt, præſertim, quando ſequenti ratione præparatur & uſurpatur.

℞. Tamarindor. ʒj. ſol. ſennæ elect. ʒvj. crem. tartari, ʒj. ebull. in f. q. aquæ ſimplicis per momentum horæ, Colaturæ ʒvj. add. mannæ calab. vel ſirup. roſar. ſolutivi ʒj. de quo æger primo capiat ʒiij. & poſtea, ſi alvus inde poſt bihorium non movetur, quovis bihorio rurfus ʒj. donec alvus ſolvatur. Sed ſimul *clyſteres* emollientes ac paullo aciores, ex lacte & ſapone veneto parati, injiciantur, aut præmittantur; aut ſi hi parum, *ſumus Nicotianæ* peculiari fiſtula, quæ *clyſter tabacalis* appellari ſolet, in anum impuſus, valde hic ſæpe conducit.

Quando ab *inflammatione inteſtinorum* iliaca paſſio oritur, id quod ex febre & ardore in inteſtiniſ cognoscitur, interne porus tenuis, aqueus; pulvereſque ac mixturæ temperantes & antiſpaſmodici nitroſi & camphorati, ſicut in aliis inflammationibus, ſunt exhibendi. *Externæ* eadem ſunt facienda, quæ in inflammatione inteſtinorum commendavimus, cumprimis, *ſpiritus vini camphoratus* cum linteis complicatis, vel *veſica* aqua vel lacte calido, in quo flores chamomillæ cocti, repleta, ventri imponenda; non neglecta in ſanguineis matuta Venæ ſectio. Quando vero ab *hernia incaſcerata* ileus oriatur, *ſanguinis miſſio* quoque utiliſſima eſt, & deinceps inteſtina prolapſa, ubicumque hoc vitium ſit, una cum loco prolapſus, ſpaſmodice conſtricto, externis medicamentis emollientibus, præſertim unguentis & cataplaſmatibus, vel *veſica* lacte aut aqua calida repleta, itemque clyſteribus ſimilibus, ſunt emollienda atque inteſtina

stina deinde, manibus, si fieri potest, blande reponenda; aut si his reponi nequeant, fumus *Nicotianæ* fortioris, prædicta fistula, largiter per anum immittendus, donec æger ad desidendum stimulum sentiat, quo ipso intestina intus ita stimulantur, ut se contrahant & angustiora fiant, atque sic in ventrem sæpe retrahantur. Sed si & hoc parum esset, ad ferrum confugiendum, & post maturam incisionem tegumentorum communium & loci prolapsus, qui est vel annulus musculorum abdominis, vel arcus arteriæ cruralis, nimis constricti, vel in hernia umbilicali, ipse umbilicus, antequam intestina sphacelo corripiantur, sunt restituenda; de qua uberius vid. Chirurgia nostra cap. de bubonocoele & hernia scroti incarcerata; quo facto prædicta symptomata plerumque mox cessare solent, quo tamen in statu blandum laxans ad intestina a saburra collecta liberanda commode subjungitur.

XIV.

De Dysuria & Ischuria.

S I V E

Urina ex parte aut omnino suppressa.

Dysuria & Ischuria sunt morbi affines iique valde molesti *Causa.* ac dolorifici, atque a causis quamplurimis oriri possunt: hinc quoties quis hoc malum prima vice sentit, in veram causam Medicus quam curiosissime inquirere, eaque perspecta, remedia cuius speciei propria adhibere rite debet. Si vero jam, sæpius eam laboravit, causa plerumque jam magis cognita esse solet. Oriuntur vero sæpissime vel a calculo, vel ab inflammatione renum, vel cervicis vesicæ, in sanguineis, itemque in iis, quibus hæmorrhoides aut menses vel suppressi, vel qui moliminibus hæmorrhoidum urgentur; vel ab urethra spongiosa sive cavernosa substantia, a sanguine abundante ibidem congesto, nimis distenta & quasi inflata, ita ut urinam vel difficulter, vel omnino non transmittat. In aliis, urina a spasmu cervicis vesicæ, vel ab acri urina, vel a sanguine ob quamcunque causam ibidem congesto, concitato retinetur; in aliis vero ob vesicæ ipsius resolutionem sive paralytin, quando urinam expellere nequit, supprimitur; vel a caruncula, quam vocant urethræ; vel a tumore, abscessu aut ulcere, in glandula prostatica; vel ab eadem hac prostatica jussu majore atque indurata, sicut & MORGA- GNUS, (a) & ego quoque jam aliquoties observavimus.

L 3

Ita

Ira & a mictu cruento urina haud raro vel supprimitur, vel difficulter saltem & non nisi magno nixu ac dolore expellitur, quando scilicet *sanguis contritus urinae iter occudit*.

XV.

Signa di-
uresiarum
specie-
rum.

Ut verò hæ causæ atque inde natæ *diversæ species* horum malorum suis signis probe a se invicem distinguantur, summa ope Medicum hiri decet. Quando enim *ab inflammatione renum*, dolor potissimum & ardor in eorum regione cum febre urgent; *si a calculo renum*, dolori renum vomitus accedere solet; quæ duo indicia jam a Baglivo pro signis pathognomonicis calculi renum haud male habiti sunt; sin verò *a calculo vesicæ*, dolor vehemens est in vesica, & per urethram ad extremam usque glandem se extendit; mucus aut pus cum urina pallida excernitur, digitoque in anum immisso sæpe sentitur; certissimum vero signum catheter in vesicam immissus & in corpus lapideum impingens præbet. Quoties a calculo in urethra hæ noxæ oriuntur, hic vel tactu per digitos, vel specillum aut catheterem quoque deregitur. Si *ab inflammatione cervicis vesicæ*, tumor & dolor in perinæo percipiuntur, quando locus hic tangitur; & adhuc melius eam cognoscimus, si digito in anum immisso eoque versus vesicam sursum reflexo, tumor ibidem a Medico, ab ægro autem dolor ardens & premens percipiuntur, atque catheter in urethram, immissus circa collum vesicæ impedimentum deprehendit, ut ulterius progredi nequeat. His signis in graviore malo sæpe accedit tenesmus, ani restrictio, anxietas præcordiorum, frigus extremorum; vomitus & pulsus febrilis. Quod *urethra cavernosa substantia sanguine nimis sit inflata*, inde intelligimus, quando urina suppressa, fistulam argenteam in urethram vix vel non nisi difficillime immittere possumus, præsertim si ægrotum multo sanguine abundare cognoscimus. Quod *spasmus in collo vesicæ* adsit, ex eo dijudicamus, quando prædictæ causæ desunt, attamen spasmodica restrictio circa collum vesicæ ab ægro percipitur, & catheter commode ad cervicem vesicæ usque, sed non ulterius, ad vesicam scilicet, dimitti potest, nullo præsentē calculo vel in urethra vel in vesica. Si *urina acris* hunc spasmum inducit, dijudicamus hoc ex urina valde foetente, præsertim si ægri vel senes sunt, vel scorbutici, & in urina multæ particulae salinæ, & quasi gypseæ se manifestant. An autem *caruncula* in vesicæ collo urinae iter obstruat, præsertim cum multi ex recentioribus eam prorsus negent, sicut prolixius hac de re in Chirurg. nostris Institut. Part. II. Cap. 138. p. 885. disputavi, quam difficillime certo scire possumus. Abscessum vero in glandula proflata loco carunculae sæpius urinae fluxum impedire ex

Bene.

Benevoli observationibus (a) eodem in libro asseveravimus. Quod vero scirrhus glandulae prostaticae sit causa urinae suppressae, durus, at vel indolens tumor in perineo, vel saltem non multum dolens indicat.

XVI.

Si canales uriniferi obstruuntur a corporibus solidis, ut pelvis renum, ureteres, vesicae cervix, aut urethra a calculo, eo-
que nuper orto, aut recens saltem e renibus in ureteres aut
vesicam delapso, ita ut urina vel difficulter exeat, vel omni-
no suppressa sit, isque adhuc parvus, propellitur & expellitur
saepe diureticis variis, supra pag. 125. & seqq. ubi de calculo
egimus, indicatis; quibus hic adhuc addam decoctum rad.
eryngii, itemque pulverem praestantissimum ex pulv. antispasmod.
ʒj. & lap. canceror. ppt. ʒ. compositum; vel & ejus loco
sal cathart. Anglic. aut Bobemic. ad ʒj., vel cum eryngii
radicis decocto, vel cum aquae seltzerensis haustu saepius as-
sumtum, Sed si dysuriae aut ischuriae causa calculus major est
vel in vesica vel urethra haerens, quam ut per hanc expelli,
aut medicamentis solvi possit, pellentia, praesertim fortiora
hic summe noxia, adeoque vitanda, isque potius heroica se-
ctione excidendus est; sicut in Institut. Chirurgic. Part. II.
Cap. 139. & seqq. prolixè satis docuimus. Quod si vero æ-
ger sit vel nimis debilis, vel nimis senex, ut difficilem &
periculi plenam hanc curationem per scalpellum sustinere
commode nequeat, aut etiam illam ob quamcumque ratio-
nem admittere nolit, palliativa tantum sic dicta cura tunc
locum habet; quæ consistit primo in eo, ut quoties calcul-
us major urinae iter occludat, hic cathetere repellatur, ut u-
rina exire queat; deinde ut dolores aegris leniamus: id quod
fit interne, antispasmodicis modo laudatis, & simul medica-
mentis lenientibus, lubricantibus, oleosis & blandis anody-
nis; externe vero clysteribus laudatis, unguentis, linimentis
ac balneis emollientibus ac lenientibus, de quibus supra jam
pag. 126. proposuimus. His in doloribus vehementioribus
addi possunt injectiones lenientes in vesicam ex ol. olivarum,
lini, papav. albi vel amygdal. dulc. vel & ex-decocto sem-
lini, aut rad. malvæ in lacte, addito pauxillo butyri recentis.

*Curatio
dysuriae
& ischu-
riae a cal-
culis.*

XVII.

Si urinae difficulter fluentis aut omnino suppressae causa est
inflammatio renum vel vesicae, diuretica, praesertim calidiora,
summe quoque sunt perniciofa; immo vel ipsæ etiam aquae
minerales egregie alias diureticae, haud satis tuto tunc adhiben-
tur. Verum potius hoc in malo danda saepe sunt remedia

*Curatio si
ab inflam-
matione
aut pie-
thura.*

refrigerantia, *nitrosa*, *salia media*, lapid. canc. vel conchæ acido citri vel tartari saturatæ, addito singulæ dosi *campboræ* gr. j. vel aliter, quæ efficacissima hic sunt cum diluentibus aqueis refrigerantibus, ut *decocto vel infuso* radic. petroselinii, eryngii, herbæ theæ, hederæ terrestris, fragar. aliarumque similium, vel & *aquis destillatis* petroselinii, fragariæ, alkekengi, exhibita; itemque *Emulsiones* ex sem. 4. frig. cum lap. cancror. antimon. diaph. & nitro vel ex semine violariæ (quæ & alvum & urinam simul utiliter mover): quibus adiungendæ *fomentationes*, & præcipue *vesica lacte* vel aqua calida repleta, aut *cataplasmata* emollientia & resolventia, renum vel vesicæ, immo & perinæ regioni, si inflammatio in hoc loco, itemque *balnea* ipsa; præ omnibus vero *sanguinis missio* hic est instituenda, quæ cæteris fere omnibus palmam hic præripit, præsertim in ægris plethoricis & calidioribus: quæ & *omnibus eis in casibus* est adhibenda, *ubi sanguis abundat*, & comprimis etiam in *hemorrhoidibus* aut *menstruis obstructis*, hæc mala inducentibus, quando nimirum sanguis hic retentus circa vesicam congeritur, & urinae excretionem sæpe molestissimam & crebro redeuntem concitat, quæ in senibus raro prorsus tolli possunt. Interea tamen studendum, ut suppressæ hæc sanguinis evacuationes suis remediis, ex Cap. IX. restituantur: vel si hoc fieri nequeat, sanguinis missiones earum loco sæpius iterandæ substituantur, & aperientia ac resolventia simul adhibeantur, ut pulveres ex lap. cancror. citr. arcan. duplic. tartaro vitriolato & nitro, ut & lie. terr. foliar. tartari vel *aque medicatæ*, interpositis subinde salibus amaris catharticis, vel & *pilulis balsamicis Becheri* aliisque similibus, præsertim in sexu fœminino.

XVIII.

Ab urethra nimis tumore.

Ita etiam si urina ob *urethræ substantiam spongiosam*, a sanguine in ea largius congesto, *nimis tumentem* & quasi inflatam, reddi nequeat, *Vene sectio* quoque larga primum rursus hic est remedium, quia sanguinem huc inde revocat & educit, immissis deinde per aliquod tempus *candelis* aptis *cereis*, aut *stylis plumbeis*, cerei tenuioris amplitudinem habentibus, ad urethram nimis angustatam rursus diducendam & ampliandam. Quando urina hoc in casu valde urget, *catheteres* etiam, qualis ille est, qui in Institur. chirurg. nostr. Tab. XXVII. fig. 7. sistitur, tunc adhiberi apte possunt; ordinarii vero & consueti illi, qui eadem tabula fig. 3. 4. & 5. exhibentur, & circa extremum utrinque foraminibus oblongis præditi sunt: quia hæc inflata urethræ substantia in hæc foramina se ingerit, atque motu ejus inde male afficitur, aut omnino laceratur, noxii; hoc in casu deprehenduntur.

Quan-

XIX.

Quando *spasmus cervicis vesicæ* difficultatis reddendi *urinae* causa est, pulveres temperantes & antispasmodici, ex aquis vel infusis diureticis, supra §. 17. commendatis, interpositis *emulsionibus* aut *oleis lenientibus*, v. gr. amygdal. dulc. olivarum, rec. papav. albi vel lini, ut & externe *cataplasmatibus*, *unguentis*, *clysteribus* atque *balneis* emollientibus ac demulcentibus, ibidem laudatis, immo & lenia *opiatâ*, si vis mali ea exigat, hic maxime profunt.

Si *spasmus ab acri urina proveniat*, serum acre scorbuticum partim blandis purgantibus, partim idoneis diaphoreticis est evacuandum atque divertendum; reliquum vero corrigendum 1. *absorbentibus* sive *terreis*; ut lapid. cancror. matre perlar. creta præpar. antimon. diaphor. succino præparato; 2. *decoctis* lenientibus rad. chinæ, sarsaparillæ, malvæ, altheæ; 3. *emulsionibus* & *oleis demulcentibus* modo laudatis, quo & *sirup. dialtheæ* referri recte potest; 4. in doloribus vehementioribus, ipsis moderatis *opiatis*: non omissis unguentis, cataplasmatibus, clysteribus & balneis prædictis lenientibus.

XX.

Sed si hoc vitium a *paralyfi* aut resolutione ipsius corporis vesicæ ortum trahit, sicut in *senibus* præsertim id haud raro incidit, (quæ species leviores, immo subinde nullos movet dolores), primo *fricationes* & *fomentationes* ventris ac perinæ remediis roborantibus, nervinis, spirituosius diligenter sunt adhibendæ, *cataplasmata* quoque ex cepis aliisve roborantibus ac stimulantibus vesicæ superimponenda; *clysteres* ex herbis ejusdem naturæ ac nervinis in intestinum rectum injiciendi, non neglectis remediis antiparalyticis ac roborantibus internis, ipsoque vino generoso rhenano aut mosellano. Interea tamen, quando *urina forte nimis urget*, ne vesica nimium inde distendatur atque resolvatur, mature hæc *fistula idonea argentea*, quam *catheterem* vulgo vocant, prudenter per urethram in vesicam immissa, educenda, hocque negotium, si urina postea ex arbitrio reddi nequit, bis vel ter in die, prout res id exigat, iterandum, continuatis laudatis internis atque externis; donec successu temporis vesica eam rursus virtutem recuperet, ut sponte urinam pro lubitu rursus expellere valeat; id quod sæpe post aliquot demum hebdomades contingere memini, ita ut hi ægri posthac hoc modo perfecte fuerint restituti.

XXI.

Quod si in *miſtu cruento* sanguinis pars in vesica, ut quandoque fit, concreſcat, atque cervicem ejus, aut viam urinæ obstruat, sanguis hic spissus & concretus est resolvendus & expellendus; id quod faciunt 1. *infusa calida barbarum digerentium*

A spasm.

Ab urina acri.

Si a paralyſi.

A miſtu cruento.

tium ac simul urinam pellentium cum aqua, ad modum Theæ parata, & cum primis herbæ hederæ terrestres, arnicæ, chærefolii aut veronicæ, &c. 2. *Tinctura tartari* vel liq. tetræ fol. tartari, cum infusis his apta dosi assumpta. 3. *pulveres digerentes*, ex lap. cancror. succ. citri aut limonum saturatis, sperm. ceti, tartaro vitriolato, nitro & cinnabari parati, atque ex aqua chærefolii aut petroselinii subinde dati. 4. *cepa affata* regioni pubis & perinæi calide superimponantur, vel *cataplasma* ex farina tritici in lacte cocta, addito butyro & pauxillo croci, aliudve, ex rad. lilior. alb. herb. malvæ, althææ & flor. chamomillæ paratum, ad spasmodum colli vesicæ relaxandum; vel etiam *vesica lacte calido*, in quo flores chamomillæ aut meliloti cocti fuerunt. 5. *clysters emollientes & resolventes*, ex floribus chamomillæ in lacte coctis, addito oleo vel butyro recenti. 6. Si forte hæc omnia parum essent, & urina nimis ægrum torqueret, *cathetere* hic sanguis in vesicæ collo hærens repellendus vel perrumpendus, & per eum urina ejicienda.

XXII.

*Ab ulcere
vesicæ aut
urethræ.*

Ulcus in vesica etiam haud raro suppressæ urinæ causa est; id quod *ex urina purulenta ac fœtida*, doloreque vesicæ sæpe vehementissimo, haud aliter, ac si calculo vesicæ ægri laborent, cognoscitur. *Hoc ulcus in senibus*, sicut *Hippocrates* jam notavit, vix unquam; in junioribus vero non nisi *difficillime curatur*, præsertim si inveteratum, & vesica jam nimis inde exesa atque corrupta est. Interea tamen, vitæ primo omnibus acerbis & stimulantibus, *infusa radicum & herbarum* vulnerariorum, absorbentia §. 19. oleosa & mucilaginosæ, blanda balsamica, cum primis *balsamum de Meccha* in elæosaccharo, & moderatus *usus mercurii*, præsertim ubi venerea subest causa, sæpe quamplurimum hic præstant. Immo & post hæc *aque minerales*, tam simplices, quam cum lacte tepide ac per plures hebdomades potæ, itemque ipsæ *therma*, ut Emsenæs, Carolinæ aliæve similes hæc ulcera quandoque una cum dysuria adhuc perferant. Quibus omnibus vero & *injectiones* ex decocto herbarum traumaticarum, ut agrimonæ, hyperici, plantaginis aut millefolii, melle rosarum temperato præparatæ & per fistulam æneam vel argenteam in vesicam immissæ, subinde interponantur, vel horum loco *lac cum sirupo dialtheæ* aut butyro recenti, vel & oleum hyperici injici possunt. Si *dysuria* ab *ulcere urethræ* in gonorrhœa, hoc ita curandum, ut in gonorrhœa docuimus.

XXIII.

*Si in gravidis
aut
puerperis
urina sup-
pressa.*

Si *urina in gravidis*, ultimis præsertim mensibus, *difficiliter succedat*, vitanda diuretica, quia fœtum præmature expellere facile possent; verum quia hoc vitium tunc plerumque a col-

a collo vesicæ, ob uterum valde turgidum, compresso, oriri solet, remedium ipsis sæpe est, sola ventris gravidæ utraque vel alterutra manu in altum elevatio, vel si hæc parum est, catheteris provida in vesicam immissio, atque per hunc urinæ facta emissio. Ita si *puerpera in partu*, præsertim diuturno ac difficili, urinam mittere non possunt, atque vesica distenta partum adhuc difficiliorem reddat, catheter quoque hic & ad urinam & ad partum promovendum, summe necessarium & optimum est auxilium.

XXIV.

Denique si a *glandula prostatica nimis tumida* atque indurata, vel ab ipso *scirrhus hujus glandule* urinæ liber exitus prohibeatur, ea, quæ ad ejusmodi tumores & scirrhos digerendos infra §. 29. & seqq. tam interne, quam externe commendavimus, quam solertissime adhibenda sunt.

Aprostatica tumida.

Quod si vero malum his non cedat, & urina prorsus atque ita supprimatur, ut & catheteri via ad vesicam omnino præcludatur, cum in hoc ultimo, tum in aliis præcedentibus ejusmodi casibus, vesica ferro tereti, triangulari cuspidem donato, & tubulo argenteo incluso; quod *Troicar* Gallis vocatur, (a) vel ab inferiori, quæ curatio *punctura perinei* appellatur, vel a superiori parte, quam *vesicæ puncturam* Chirurghi nominant, prudenter perforanda, factaque perforatione, ferrum e tubulo educendum, sed hic in vulnere & vesica relinquenda, urinaque per hunc dimittenda, & ne excidat, funiculo circa ventrem firmandus, os deinde hujus fistulæ sive tubuli turunda vel subere claudendum, & per hanc postea pro lubitu & quoties opus est, urina emittenda, donec causa ischuriæ sit sublata. Periculosum quidem & molestum est auxilium, sed cum unicum sæpe sit, non omnino contemnendum. Uterius hoc de auxilii genere evolvi possunt Institut. Chirurg. nostr. Cap. 144. Part. II. p. 1005. Ita & si a *caruncula*, vel ab *abscessu*, aut *ulcere*, vel *tumore* in urethra locum supprimatur, remedia e Chirurgiæ Cap. 138. Part. II. petenda sunt.

XXV.

In Dysuria & Ischuria senum, morbis hic vix unquam omnino tollendis, sed tantum leniendis, præter *analeptica*, præsent. liq. terræ foliatæ tartari, aut tinctura tartari, vel sola vel cum spiritu nitri dulci remixta; item *emulsiões* ex semine violarum cum aqua chærefol. petroselinii, fragariæ, saxifragiæ, admixta pauca aqua cinamomi cum vino paratæ, vel emulsiões ex nucleis persicorum factæ, & sz-

Dysuria & ischuria senum.

(a) Quod videri potest in Institut. Chirurg. nostr. Tabul. XXIV. figur. v. & Tab. 31. fig. 3.

172. *Caput XII. de Urina suppressa, obstructionibus, & sæpius haustæ. Externe allium vel cepæ sub cineribus asfatæ, & chærefol. in forma cataplasmatibus, aut ol. scorpi-
num, juniper. succini in forma linimenti pubis & perinæ
regioni, excitandi & stimulandi fine, applicanda. In ischu-
ria senum plethoricorum & laute viventium, vel hæmorrhoi-
bus suppressis laborantium, præter dicta, missio sanguinis,
sicut in aliis plethoricis, sæpe urinam egregie solvit; dum
sanguinem in collo vesicæ congestum revellit. Sed si hæc
non sufficiant, & symptomata urgeant, cathetere vel ipsa
punctura vesicæ, si nimirum urina ip. vesicæ hæret, educen-
da; sin vero causa urinæ suppressæ in renibus, hæc operatio-
nes chirurgicæ non sunt adhibendæ, quia eis urina e reni-
bus educi nequit. Sed præter laudata interna, regio renum
sæpe oleo scorpiorum, juniperi & succini illini & cataplasma
emolliens deinde imponi possunt: ubi & clysteres emollien-
tes ac balnea egregiam sæpe opem præstare solent. In malo
autem inveterato, vix ulla superest curatio. Vid. Hipp. aphor.
31. Sect. VI.*

XXVI.

De Morbis sive Obstructionibus vasorum a viscido generatim.

*Obstru- Si obstruções vasorum ab humoribus lentis, viscidis, spif-
sionet ab humoribus viscidis. tis, grumosis, coagulatis, ut in tumoribus glandularum, scrophu-
lis, dyspnœa & asthma a vasis pulmonum obstructionibus, polypo
cordis, &c. illi sunt attenuandi, resolvendi & fluxiles red-
dendi: id quod iis maxime remediis fit, quæ supra in ca-
cachexia curanda Cap. XI. laudavimus; præcipue vero infu-
sis, decoctis, & essentiis herbarum, lignorum & radicum,
diaphoreticis; omnis generis medicamentis amaris; salibus
alcalicis, mediis, digerentibus sive digestivis vulgo dictis; &
maxime quoque aquis medicatis, non omisis purgantibus &
sanguinis missione. Præterea etiam notandum, quod in mor-
bis a viscido, obstructionibus variis vasorum & nervorum at-
que cachecticis affectibus, ab humoribus tenacissimis, oriun-
dis, mercurialia quoque prudenter adhibita, absque, vel &
quandoque cum excitata salivatione, sæpe egregie condu-
cant; immo sæpius summe sint utilia ac necessaria: ut in
cephalœa & bemicrania pertinaci, amaurosi ab obstructione
nervorum opticorum, in cataractæ initio, vel saltem non
inveterata; epilepsia, affectibus catarrhalibus diuturnioribus,
aut sæpe recurrentibus, præsertim ophtalmiis ejusmodi, affe-
ctibus paralyticis, scorbuto viscido & frigido contumaci, lue
venerea, scabie inveterata, quartana rebelli, ulceribus cacoe-
rbi-*

thicis, variosis, spina ventosa, plica polonica, obesitate nimia, & fluore albo pertinaci, aliisque in affectibus rebellibus; qua de re prolixius videri potest STAHLII dissertat. de salivatione mercuriali aliis præter luem veneream morbis rebellibus exstirpandis parè, & dissertat. nostr. de Amaurosi salivatione curata.

XXVII.

De Glandulis induratis, Scirrho & Cancro.

Speciatim vero ad obstructions ab humoribus viscidis etiam merito referuntur *glandularum tumores*, *scirrh*i & tandem *carcinomata* sive *cancrosi* affectus, qui omnes ab obstructione vasorum & præsertim in glandulis, ab humoribus crassis, viscidis, tanquam causa propinqua, suam originem ducunt; quibus vero in *cancrosis affectibus peculiaris & quasi venenata acrimonia* rodens, cujus natura hactenus perspicere & curari nondum potuit, accedit, qua dolores rodentes sæpe vehementissimi & partium læsarum ac vicinarum erosiones sive ulcera concitantur.

XXVIII.

Cognoscuntur hæc mala ex tumoribus duris, plerumque mobilibus & initio indolentibus; quo in statu *glandule induratae* dicuntur; sed quando hæ non brevi digeruntur, aut suppurantur, sed potius negliguntur & magis adhuc indurescunt, *glandule scirrhosæ* sive *scirrh*i appellantur, & si hi, præsertim in mammis, rodere ac dolere incipiunt, *carcinomata* sive *cancri* incipientes vel *occulti*, sed si jam diu duraverunt, *cancri occulti inveterati*; si vero cutis & vicinæ tandem inde eroduntur atque exulcerantur, *carcinomata & cancri aperti* sive *exulcerati* dici solent; quorum priores tumores medicamentis raro ac difficulter digeruntur & curantur; posteriores vero vix unquam & rarissime. Immo secundum præceptum Hippocratis (a) melius est *cancros occultos intactos relinquare*, quia medicamentis commoti plerumque deteriores fiunt, & ægros citius interficiunt.

Glandule colli indurate, quia in pueris a voracitate & prava victus ratione oriuntur, hac emendata atque correctis humoribus corruptis, motu fortiori, ipsa ætate ac tempore, naturæ vi, plerumque rursus digeruntur. Interea tamen hoc sæpe non fit, verum e contrario glandulæ hæ indurate hæc haud raro successu temporis augentur vel multiplican-

cantur, præsertim circa collum, atque auctæ *scrophularum* (Gallis *Ecroutelles*), immo si adhuc majores sunt, *strumarum* nomen adipiscuntur, licet hæc hæc raro glandulæ induratae non sint, sed tumores potius *tunicati* sive *saccati*, varios humores prave continentes, qui mirum sæpe in modum excrescunt, atque varia gravia mala ægris inducunt.

Denique hic adhuc observandum, quod *plerique homines solis externis remediis duos hosce tumores digerere ac curare velint*; verum cum hæc sola vix internam humorum vitiosam intemperiem corrigere valeant, hac ratione curati in peiorem plerumque statum abeunt; adeoque ab *internis potius remediis* auxilium & petendum & sperandum esse existimo.

XXIX.

*Curatio
glandula-
rum dura-
rum de-
collis.*

Remedia vero, quæ glandulis induratis emolliendis ac dissolvendis maxime opportuna esse censemus, sunt:

I. *Infusa & decocta* ex radicibus, lignis & herbis resolvendis parata, bis terve in die usurpata: ut ex rad. *sarsaparillæ* cum ligno *quajaco*; vel ex radic. *sarsaparillæ*, *chinezæ* & ligno *sassafras*; vel ex radic. *scrophulariæ* aut *vincetoxicæ*, quæ in *Ephem. Nat. Cur. Dec. I. An. 1. Obs. 57.* valde laudantur. Ita *decoct. ligni quajaci* cum radic. liquirit. vel *infus.* aut *decoctum herbe rosmarini* cum saccharo, ad glandulas colli tumefcentes digerendas recte commendantur a *D. Kueblero*, Medico Lipsiensi, (a) quod cumprimis etiam valet in puellis mox adultis, quibus menstrua adhuc deficiunt; cum quibus vero omnibus subinde apta dosis tinct. antimon. vel essent. lignorum aut succini data negotium hoc tanto melius expedit.

XXX.

2. Pulveribus digredientibus.

Præter hæc quoque 2. *pulveres* sanguinem hunc viscidum attenuantes, exhibendi: inter quos celebris est *pulvis ad strumas August.* cui vero *cinnabaris* vel *mercurii dulcis* gr. j. vel alterum in quovis præbio apte addi potest. Ita & *antimonii crudi pulvis* huic pulveri ad strumas commode substituitur, præsertim si ipsi in quavis dosi gr. j. vel alterum *mercurii dulcis* adiungitur, qui egregie glandulas puerorum in collo & minores ac recentiores *scrophulas dissolvere solet*. *Pulvis millepedum* a *℞.* ad *℥i.* cum gr. j. vel altero *mercurii dulcis* probatissimi quoque est usus, cum in *externarum glandularum tumoribus*, tum & in viscerum tumoribus duris, præsertim si quovis triduo vel quatrinduo interjecto idoneum purgans mercuriale interponitur. Ita & *pulvis radic. at.*

cum

[a] In d'ert. de glandulis colli puerorum tumefactis, Lipsiæ in 4.

cum *mercurio* dulci datus, valentissimus est in tumoribus induratis internis & externis dissolvendis, a quibusdam etiam *athiops mineralis* valde commendatur, quamvis a *Boerhaavio* in chemia sua tamquam corpus iners rejiciatur: quæ vero remedia omnia diu sunt continuanda, præsertim in malis jam inveteratis, vitata molesta salivatione; alias brevi tempore parum vel nihil efficere solent.

XXXI.

Conveniens simul his in malis *victus ratio* est observanda, *victus* vitando omnia *alimenta austera, cruda, crassa, flatulenta,* difficulter digerenda, olera hyberna, legumina ac similia; itemque voracitatem ac nimiam etiam alimenterum teneriorum aut leviorum copiam; *aerem* frigidum & insalubrem, *marorem, tristitiam, nimium otium,* &c. sed contra corpus sæpe exercent.

XXXII.

EXTERNE pro scopo glandulas & scirrhus recentes dissolvente hic conducit *fotus spiritus vini calidi simplicis,* cum splenis sæpe super impositus; vel *spiritus vini camphoratus & crocatus,* aliquoties in die renovatus. Ita & *emplastra resolventia,* ut sunt empl. de ranis Vig. cum mercurio, de meliloto, diaphoret. Myns. diachylum, aliaque in Institut. chirurg. nostr. p. 337. commendata, calide his tumoribus imponi & prædictus fotus, si lubet, vel & *sacculi digerentes* calide superaddi apte possunt, vel ex *herbis & floribus fragrantibus,* vel ex *cineribus calidis,* vel ex *sale & arena* compositi; hinc & *Deidier* in mammis scirrhosis valde commendat *arenam maris calidam (a);* cui vero forte arena vulgaris cum sale æquipollet. *Vapores acidi* a quibusdam etiam vehementer laudantur, de quibus quoque *uberius Institut. chirurg. nostr. videri possunt.*

XXXIII.

In quibusdam ad glandulas & tumores scirrhosos discutiendos egregium quoque est *oleum philosophorum & balsamum sulphuris Ruland.* si aliquoties in die his calide ac probe fricentur, supradato postea *emplastro, fotu* vel *sacculo* ex modo commendatis. Illorum loco etiam valde efficax est *Linimentum* ex oleo destillato, saponis, petroleo albo, axungia humana & unguento martiali August. paratum, cui postea *emplastr.* ex gummi ammoniaco, vel de sapone, vel de meliloto, vel de sperm. ceti, aut de ran. Vigon. cum mercurio superimponendum, factaque his emollitione *emplastr. oxycroceum* cum diaphor. Myns. sufficere asseverat *Misterra-*

ma-

mayer (a); si modo interna supra laudata simul diligenter assumantur.

Si a labe venerea, ut sæpe fit, istiusmodi tumores oriuntur; unguenta mercurialia utilissima & valentissima sunt, si eis sæpius calide & diu probe fricentur: quæ vero & in aliis profunt; si interna non negliguntur.

Si vero omnia hæc, ut haud raro contigit, parum essent, scalpello sæpe excindi possunt, quando locus ac mali conditio extirpationem admittunt; quæ vero de re cons. Institut. nostræ chirurg. P. I. lib. IV. Cap. 16. item P. II. Cap. 98.

XXXIV.

Cancris curatio.

Cancris
curatio in-
terna.

Quod si vero scirrhus extirpari nequeat, aut ægri extirpationem ejus admittere nolint, is tamen dolere incipiat, inæqualiter tumeat; augeatur, venæ circa illum, ut sæpe fit, intumescant, & sic malum carcinomatis, quod vulgo *cancrum* & quidem *occultum* appellare solent; (b) indolem assumat, studendum est, ut hi dolores, quia tolli prorsus vix possunt, quantum fieri potest, ægris leniantur ac tolerabiles reddantur; id quod tamen difficillime ac raro, præsertim in mammarum cancro, utpote frequentissimo, obtineri potest, sicut jam dudum expertissimus *Hildanus* monuit, (c) optandumque est, ut meliora aut valentiora his in malis cognita essent remedia, quæ huic scopo satisfacerent, quam quæ hucusque ad nostram cognitionem pervenerunt; cum e contrario a quamplurimis potius remediis, ut §. 28. jam diximus, exacerbentur, atque incrementa sumant. Interea tamen interne, præter temperantiam & aptam victus rationem, decocta lignorum, vel horum loco decoct. cortic. ulmi, & foliorum saniculæ, (d) pulveres antispasmodici & nervini, primo sine anodynis aut opiatis, sed si illi non sufficiunt, cum extractis papaveris aliquot granis, vel horum loco emulsionem papaverinæ, aut Essentia croci vino malvatico parata, & vesperti ad gutt. 30. & plures sensim data; vel hujus loco laud. liquid. Sydenhamii a gutt. 15. ad plures sensim ascendendo; egregie benefaciunt; vel denique & massa pilul. de cynoglossa, cum pulveribus antispasmodicis, a gr. j. ad plura ascen-

[a] In dissert. de Strumis Bungenium. [b] Plura hac de re in Institut. chirurg. n. p. 242 legi possunt. [c] Lib. de Gangræna, Cap. V&L. [d] Quod *Harris* in dissertat. chirurg. sua X. valde commendat.

ascendendo; aut denique ipsum, si prædicta parum sunt, *laudanum opiatum*, quia natura sensim huic vel illi assuescit, ita ut mutatione remediorum subinde opus sit, si aliquid levaminis ægris præstare velimus. His *lenia purgansia* & cumprimis extract. *bellebor. nigr. cum mercurio dulci* a RIVERO etiam feliciter usurpatum (a), interponenda & in plethoricis, vel ubi consuetæ sanguinis evacuationes suppressæ, *sanguinis detractio* subinde instituenda, pro ægrotum & rerum, quæ circumstant, diversitate.

XXXV.

Extrinfecus super scirrhum dolentem aut cancerum incipientem, vel saltem adhuc *clausum*, *lamina plumbea*, mercurio imprægnata imponatur, qua subinde in nonnullis dolores per aliquod tempus egregie leniuntur; vel loco hujus varia *emplastra* & *unguenta saturnina* commendantur; quæ vero, quia jam Institut. chirurg. nostr. p. 340. nominata vel descripta sunt, ne actum hic agere videar, lectorem ad illas remitto. Matra vero *Carcinomatæ extirpatio* præcipuum hic est remedium; quamvis hoc malum etiam post hanc sæpe redeat, ut sæpius expertus sum, & nemo certam curationem sperdere possit.

Remedia
externa
canceri oc-
culsi.

XXXVI.

In cancro exulcerato, qui ut plurimum vehementissime dolet & foetet, præter ea, quæ in Institut. Chirurg. nostr. ad hoc malum leniendum commendavimus, *Harriſius* adhuc laudat *serebinthinam* splenio illitam: quæ etiam subinde revera aliquid præstat. Ita & *pulvere ligni sancti*, *sarsaparilla* & *santali citrini* mammam cancerosam se curasse scribit, loco antea citato, parte solum a frigore defensa; qui vero pulvis forte quædam, certe non adeo multas liberabit; partem læsam etiam tenui *lamina plumbea* & splenio spiritu vini imbuto, obtegi suadet. Alii *succum tabacchi* recens expressum, tam mundandi, quam consolidandi fine laudant. Alii *succum bella donna*, alii *folia* & *decoctum* ejus & externe & interne magnificiunt (b), verum sine fructu hæc adhibita fuisse novi. In quibusdam *aqua calcis cerulea* aliquid levaminis præstitit; in quibusdam *unguent. nutritum*, ex aceto lythargyr. cum oleo rosarum, vel solani paratum; in aliis *spirit. vini simplex* linamentis impositus. Si vero hæc omnia parum sunt, *ferrum* sæpe, præsertim si mature adhibeatur, sanat. Verum ab omnibus his certam curationem non esse expectandam, usu didici. Si em-

Si cancer
exulceratus.

M

pla-

(a) Obs. 97. Cent. 4. & *Scultes*. in *Armam. Chir.* Obs. 35.

(b) Qua de re videri potest dissert. de *Bella donna* Halmæ edita.

plastro tegendus & ea agra ferre potest, optima sunt *saturnina*, & inprimis illud de minio camphora roboratum.

XXXVII.

Obstru- Ubi *obstructiones & inflammationes a ligaturis fortioribus*,
niones a ut in fracturis, vulneribus, hæ sunt solvendæ & moderatius
vasis co m- adstringendæ, adhibito simul fomento digerente ex spiritu
pressis vini calido vel aqua calcis cum spiritu vini camphorato.
 Quando ab effusis humoribus in capite, sive calvaria, & hi
 resolventibus medicamentis, in Chirurgia nostra, cap. de capi-
 titis vulneribus, laudatis, tolli non potuerunt, perforatione
 sive *trepanatione*, ut vulgo vocant, cranii; sed si *quis in tho-*
race effusi, & præsertim pus in *empyemate*, aut sanguis in
 vulneribus pectoris, *paracentesi* sunt educendi, de quibus o-
 perationibus vid. Institut. nostræ chirurgiæ.

XXXVIII.

Obstru- *Extranea aures vel nates obstruentia*, ut pisa, fabæ, lapilli,
niones a si, vossellis uncinulive eximenda, id quod etiam in calcu-
vasis co m- lo urethræ fieri debet. *Polypi in navibus*, hærentia in oesophago,
pressis *phagus*. *prolapsa solida in asperam arteriam*, tubercula sive
tumores e vagina uteri aut intestino recto *excrecentes* & vias
 naturales obstruentes, itemque ita dicta *cavuncula in ure-*
thra, manu quoque chirurgica sunt auferenda.

Si *vie naturales*, ut palpebræ, aures, nares, anus, vagina uteri, urethra p. n. sunt *coalitæ*, ut in ita dictis *atretis*, scalpello sectione provida sunt aperiendæ. Omnium denique obstructionum, ut brevis sim, quæ manum chirurgicam requirunt, curationes ex Institut. Chirurgic. nostris peti possunt, quæ in ejusmodi malis evolvendæ.

XXXIX.

Partus difficilis est quoque species obstructionis, dum fœtus in partibus genitalibus hæret, eas obstruit, & transire nequit; verum de hoc quoque ample satis in Institut. Chirurgic. egimus, & nonnullæ adhuc infra, ubi de morbis mulierum Cap. XVI. acturi sumus, proponemus.

CAPUT XIII.

De Fluxibus sive Fluxionibus, iisque maxime serosis.

I.

Quid sit FLUXUS p. n. opponuntur obstructionibus, atque per eos
nos intelligimus quascumque profusiones aut affusiones p. n. sanguinis aliorumve humorum sive utilium, sive excrementi-
 tiorum, corpore humano: unde debilitas virium aliaque symptomata, immo, nisi in tempore rite succurratur, sæpe
 mors,

mors, sequuntur. Quoniam vero de fluxibus sanguinis plenisque supra Cap. V. jam actum est, reliquos hoc in capite proponemus.

II.

Contingere solent tales fluxus in capite, thorace, abdomine, partibusque genitalibus utriusque sexus, ut & in tota peripheria corporis. *In capite* contingunt fluxus lacrymarum nimius sive *lacryma involuntaria*, oculus lacrymans quoque dictus & *epiphora*, atque deinde *rhyas*, *coryza*, *ptyalismus* sive *spatatio* aut *salivatio* nimia, &c. *In thorace*, tussis humida, rheuma, sive catarrhus pectoris, cum vel sine difficili respiratione, vel *raucedine*. *In abdomine*, diarrhoea, dysenteria, eaque vel cruenta vel biliosa, vel purulenta; lienteria, coeliaca passio, cholera, vomitus, fluxus hepaticus, diabetes, urinae incontinentia, pollutio nocturna nimia, gonorrhoea & fluor albus: sed de his duobus ultimis quoque jam Cap. VIII. ubi de cachecticis affectibus egimus, dictum est. *In corporis peripheria*, sudor nimius & *ulcera serosa* occurrunt.

*Contin-
gunt va-
riis in
partibus*

III.

CAUSSA horum fluxuum generativam vel in humoribus haeret, vel in *partibus solidis*; in humoribus, quando vel quantitate, vel prava quadam qualitate, aut motu turbato peccant. A *quantitate excedente* oriuntur saepe diarrhoeae serosae ac biliosae, dysenteriae, vomitus, cholera, sudor nimius, omnis generis catarrhi, tussis, coryza, praesertim si transpiratio ob quameunque causam fuit suppressa, vel crapula praecessit.

Causa.

A *quantitate humorum*, maxime spirituum, *deficiente*, proveniunt debilitates, animi deliquia, urinae & faecum incontinentia, ut & sudor frigidus debilium atque morientium, vel & calidus quandoque nimius, sive colliquativus, ut in hecticis & phthisicis.

A *debilitate spirituum & inde pendente partium debilitate*, observantur etiam, praeter modo dicta mala, lacrymae involuntariae, diarrhoea, lienteria, coeliaca passio, diabetes, gonorrhoea benigna in viris, fluor albus diuturnus & rebelis in quibusdam mulieribus.

Prava qualitas & quidem *acrimonia humorum*, praesertim biliosa, saepe excitat vomitum, diarrhoeam, dysenteriam, cholera; *acrimonia serosa*, partim eadem, partim *tussim*, *raucedinem*, *coryzam*; unde & *ulcera* ichorosa, scorbutica ortum suum trahunt. Ab *acrimonia venerea*, gonorrhoea, fluor albus virulentus, ulcera venerea, fistulae, caries, spina ventosa aliaque mala producuntur.

A *motu turbato spirituum atque humorum*, ut a tertore,

metu; ira, oriuntur subinde, præter varias hæmorrhagias, diarrhæa, vomitus, cholera, alvi & urinæ fluxus, uteri hæmorrhagiæ, immo abortus ipse in gravidis. Quo gravi-
bus vero comitati sunt symptomatibus, eo majus adest pe-
riculum.

IV.

*Cursus
generalis.*

In curatione harum fluxionum generatim ad diversas cau-
sas semper probe est respiciendum: ut si *vasa & spiritus
debiles*, roborantia, tam ex diætâ, quam pharmatica, sunt
adhibenda; si *humores acres aut biliosi*, hi per contraria
sunt corrigendi, alterandi, atque etiam evacuandi; si quan-
titate excedunt, purgantibus, diaphoreticis, diureticis, vel
& pro re nata vomitoriis, sicut sæpe in diarrhœa & dy-
senteria opus, sunt expellendi. Si a motu turbata spirituum,
hic quiete, nervinis & anodynis in ordinem est redigendus.

V.

De Coryza.

*Speciatim
coryza.*

Speciatim in CORYZA, si fortior, (nam levior, si mo-
do conveniens victus ratio servatur, naturæ relinquenda) pri-
mo purgantia & postea diaphoretica, anticatarrhalia sunt
exhibenda, & imprimis Essentia quædam diaphoretica ma-
ne, & vesperi pulvis quidam diaphoreticus. His præmissis,
externe omnia ex *majovana* confecta naribus modice attracta
vel inuncta dissipant & roborant; vel *femen nigella* cum
pauca camphora remixtum & naribus subinde admotum,
itemque *balsama cephalica*, aut *salia volatilia urinosa* eadem
ratione adhibita; sed cavendum, ne *solis externis* & quidem
nimis cito, eam aggrediamur: quia abundans & noxium,
quod expellendum, his ipsis repellitur, vel sistitur; unde
dolores capitis, vertigo, aliæque graviora mala inde oriri
solent. *Diætâ* sit parca & temperata, vitandusque aer hu-
midus & frigidus; quamvis iter sæpe aut motus fortior in
quibusdam, ut sæpe expertus sum, hunc morbum solvat.

VI.

De Oculo lacrymante.

*Oculus la-
crymans.*

OCULUS LACRYMANS, si a debilitate glandulæ la-
crymalis oriatur, conveniunt primo roborantia externa, ut
spiritus vini, vel aqua Reginæ Hungariæ, aqua simplici,
vel aqua fœniculi, valerianæ aliæque simili temperata, & su-
perioribus palpebris aliquoties in die illita. Interne, serum
abun-

abundans purgantibus est evacuandum & revellendum, acrius vero balsamicis & anticatarrhalibus est alterandum & corrigendum, ut Essent. succini & lignorum, ut decoctis lignorum, atque simul revellendum, *vesicatoriis*, vel & pro re nata, *fomentis*. Sed si ductus nasalis est obstrictus, aut causa hujus mali sit fistula lacrymalis, vel aliud chirurgicum vitium lacrymantem oculum faciat, ex Chirurgia auxilium petendum. Vid. Chirurgia nostra, Cap. de oculo lacryman- te: Si *curuncula lacrymalis* vel rodentibus medicamentis *erosa*, vel sectione improvida ablata, vel aliam ob causam deficit, quod vitium *rhyas* appellari solet, malum est irremediabile; sicut & si a senectute oriatur.

VII.

De Spuito nimio.

In *pyralismo*, spuito aut salivatione nimia, præsertim cum faucium magno tumore, humores revellendi & per alias vias, maxime autem per alvum, sunt evacuandi, atque vasa salivalia nimis laxa in ore roboranda: quapropter hic purgantia, sed sine mercurio, & postea sudorifera, anodyna atque gargarismata adstringentia requiruntur.

Pyralif. mus.

VIII.

De Tussi humida, & rauce dine.

TUSSI *humida & rauce dini*, purgantia, & præsertim potiuncula purgans ex senna, manna, aliisque, si lubet, parata, ac deinceps diaphoretica & pectoralia medentur: quæ tamen pro ratione causæ sive materiæ peccantis varianda. Quod si enim materia rejecta sit acris ac tenuis, intricantia, oleosa & mucilaginosa danda: ut saccharum candidum, vel saccharum hordeatum, vel succus Glycyrrhiæ vel *mas- sa pectoralis* ex cremore hordei, saccharo, gummi arabico aut tragacanthæ in formam mörulotum redacta, de quæpius frustulum in ore dissolvitur, ac sensim deglutitur; vel rotulæ diatragacanthæ, aut trochisci bech. albi, vel ol. amygdalarum dulc. solum aut cum sirup. flor. papav. vel violar. temperatum; *infusa* mucilaginosa ex hordeo, avena, oryza, sagopyro aut similibus parata; *infusa pectoralia*; ex radic. liquirit. sicbus, dactylis, passulis & herb. pectorali. composita, ut sunt spec. pectorales nostræ, Dispensatorii Brandeb. aliæque similes, atque si tussis vehementior; *anodyna*, ut massa pilularum de styrace vel de cynoglossa, vel laud. opiat. parca copia; vel Rotulæ

Tussis & rauce dine ab aere.

becchicæ opiatæ disp. Brandeb. vel *emulſiones* ex sem. papav. albi, vesperi exhibitæ,

IX.

*Tussis a
sanſſa vi-
ſcida.*

*Sin materia tussis est viscida & tenax, resolventia, attenuantia, abstergentia, lenibus dulcibus remixta, optime conducunt, ut radices & herbæ pectorales attenuantes: rad. scilicet helenii, pimpinellæ, irid. florent. ari. herb. veronicæ, hyssopi, scabiosæ, toffilaginis, cum sem. fœnic. anisi & anisi stellati, in forma infusi, vel decocti, atque præter hæc inprimis etiam *sperma ceri*, in jusculeo calido, vel decocto Coffeæ aut pectorali solutum, vel cum lapid. cancr. & saccharo in pulverem redactum, atque aliquoties in die apta dosi adhibitum: cui etiam aliquot guttulæ olei anisi instillari commodè possunt. Ita & spec. diarr. vel in pulvere vel in rotulis, Elix. pectorale Wedel. Essent. helenii, pimpinellæ albæ, spirit. salis ammoniaci anisati, sirup. de erysim. Lobellii, egregie hic profunt, præmissis & interpositis, pro re nata, idoneis *purgantibus*, ad pituitam abundantem a pulmonibus revocandam atque evacuandam. In *sexu femini- no*, quia mensum sæpe obstructio & redundans ad pectus sanguis tussis producit ac fovet, horum fluxus, ut supra Cap. IX. docuimus, est restituendus; interea tamen hic *pediluvia* revellendi sine prosunt, sed inprimis *Vene sectio in pede* quoque multum confert, & diurnam tussim inde ortam, aliis frustra adhibitis, sæpe sanat. Confer. Histor. Morbor. Uratislaviensium.*

X.

De Diarrhœa sive Alvi fluxu.

Diarrhœa.

DIARRHOEA, quia sæpe est fluxio sive excretio naturæ salutis materiæ alicujus abundantis aut vitiatæ, præsertim si æger inde non debilitatur, & cibi fastidium deest, *principio non est sistenda*; sed vel abſtinentia curanda; vel *potius evacuatio* supervacui aut noxii *juvanda*, potu scil. calido diluentium temperantium, ut aquæ calidæ aut tepidæ, Theæ, Coffeæ, jusculi tenuis e carne quacumque, decocti hordei vel avenæ, immo subinde leni laxante ex rhabbarbari pulvere aut decocto, vel ejus essentia, vel potu aquarum mineralium temperantium, ut Selterensium, aut purgantium, ut Egreſium, Pyrmontanarum, &c. ad libras ij. vel iij. tepide haustarum. Postea vero *stomachica* roborantia specifica, ex mentha, cydoniis & cinnamomo parata, ut aqua menthæ cum vel sine vino, aqua cinamomi simplex & cydoniata vel vinosa, itemque theriacalia, ut theria-

ca vel diascordium a 3℔. ad 3j. per intervalla data, optime opem ferunt, observata simul quiete corporis & calore temperato. Si in forma guttarum remedia desiderentur, omnis generis Essentiæ stomachicæ, & cumprimis Ess. Nucis Mosch. cinnamomi, terræ japonicæ, theriacæ vel diascordii hic conducunt. *Diarrhæa* tamen etiam *motu corporis, velleione cumprimis in curru aut equitatione*, immo & *sudore provocato* haud raro egregie compescitur, nam una excretionē aucta, altera imminuitur: quam obcausam & vomitorium, atque inprimis hyepecacoanna sæpe fluxus ventris pertinaciores, ut HIPPOCRATES (a), & CELSUS jam dudum notarunt, atque recentiorum observationes quamplurimæ confirmarunt, compescere haud raro solet. *Externe* balsama stomachica ex ol. N. M. express. & oleis destillat. stomachicis, ut menthæ, absinthii, chamomillæ, mastichis, carvi, fœniculi & balsamo peruviano; vel ex theriaca & oleo Nuc. mosch. parata, ventriculo sæpius illinantur, superimposito etiam in malo graviore Empl. vel ex theriaca, vel de crusta panis, vel de tacamahaca, aut sacculis stomachicis, ex herb. menth. chamomil. rad. Zedoar. Galangæ, sem. carv. aneth. fœniculi supradatis, aut crusta panis tosti, cum spiritu vini calido vel vino hispanico imprægnata, ac nucem moschata aliisque aromatibus conspersa, vel cataplasmate ex pane mellito, aromatibus roborato, & vino hispanico ebrio; vel & cataplasmate ex frumento saracenicico, quod Mayz vulgo appellari solet, in formam pultis redactio. Quæ ipsa etiam medicamenta & interna & externa roborantia in *hyperæstharfi* adhibita, optime conducunt.

XI.

De Vomitu, & Hyperemefi.

Vomitus, quia sæpius etiam est naturæ excretio salutaris humorum noxiorum præsertim in ventriculo hærentium, cavendum quoque ne mox adstringentibus aut opiatibus cohibeatur; verum studendum potius, ut ejectio eorum *parum aquæ tepida*, aut jusculi tenuis frequenti promoveatur; vel ipso etiam, si res id exigit, leni emetico & cumprimis radice hyepecacogannæ, nam hic sæpe verum est dictum vetus, *vomitum vomitu curatur*. Postea vero eadem roborantia interna & externa sunt adhibenda, quæ modo in diarrhœa §. X. commendavimus. Atque eodem etiam modo Hy-

M 4

peræ-

peremeſis ſive nimius vomitus, a medicamento purgante vel emetico fortiori ortus, eſt curandus.

XII.

De Cholera.

Cholera. In *cholera*, in qua vomitus & diarrhœa ſimul affligunt, & morbus ex his duobus quaſi compoſitus eſt, quia cauſa fere eadem, ſaltem paullo vehementior, eodem fere modo procedendum: ab initio nimirum hæ excretiones adſtringentibus aut opiatīs non mox cohibendæ, ſed potius largo potu aquæ calidæ, ut *Ceſius* jam docuit; vel juſculi carnis tenuis calidi, quod *Sydenhamus* tantopere commendavit, vel decocti avenæ, materia irritans, acris, quæ plerumque hic bilioſa, eſt diluenda, corrigendâ atque évacuanda; poſtea vero, ceſſante cholera, quieſcendum ac ventriculus rurfus internis externiſque roborantibus ac ſtomachicis, modo in diarrhœa §. X. laudatis, vino item generoſo ſimplici vel aromatibus, præſertim cinamomo aut mace imprægnato, aliisque idoneis, aquis, eſſentiis & elixiriis ſtomachicis roborandus ac reſtituendus, ſervata ſimul diætâ modica.

XIII.

De Lienteria, & Cœliaca paſſione.

Lienteria & cœliaca paſſio. In LIENTERIA, ubi aſſumta nondum digeſta per alvi fluxum excernuntur, id quod ventriculū debilem & valde læſam ciborum concoctionem indicat, præmiſſa & interjecta evacuatione per *rhabarbarina*, ventriculi coctio ſtomachicis roborantibus, vino generoſo, ſimplici & aromatibus roborato §. XII. aqua cinamomi, cortic. aurantium, ſtomachali quacumque, carminatiya, vitæ Matthioli, pulveribus & trageis ſtomachalibus, eſſentia abſinth. compoſ. Zedoar. galangæ, aliisque idoneis externis internisque, quæ §. X. ſub diarrhœa laudata ſunt, eſt promovenda ac reſtituenda; ſervata ſemper parca diætâ, adjunctoque moru corporis frequenti, ambulatione, equitatione, veſtione. In CŒLIACA PAſſIONE, ubi chyloſa materia ſæpe per alvum rejicitur, id quod vaſa lactea in inteſtiniſ obſtructa denotat, eadem conducunt, ſed ſalia media his interponenda, ad vaſa lactea obſtructa rurfus aperienda.

XIV.

XIV.

De Dysenteria.

In DYSENTERIA, quæ vel *cruenta* vel *alba* sive biliosa, & in qua aliquid acre, quod intestina erodit, inflammatur & corrumpit, (quodque propterea evacuandum & corrigendum) ad hanc materiam acrem irritantem temperandam, corrigendam & ex intestinis evacuandam, exhibendum 1. vel *lene evacuans per inferiora*, ex pulv. rhabarb. cum pauxillo nitri, inprimis ubi æstus adest, vel ex anima rhabarbari, ad cochlear. j. vel ʒiʒ. exhibita, vel ex infuso vel decocto rhabarb. cum fol. senn. & tamarindis; vel etiam mox in principio *emeticum*, præsertim si per nauseam, pressioni sensum, & anxietatem circa præcordia, vel vomendi conatum indicatur, ex rad. hypëcacoanæ, quæ hic securissima ad grana XX. XXV. ʒiʒ. vel ʒij. (a), vel & *potus aqueus calidus copiosus* assumptus: de quo infra pluribus.

Dysenteria.

2. Post 6. vel 8. circiter horas ab assumpto primo purgante vel emetico, *pulveres acrimoniam & æstum*, si quis adest, *temperantes*, ut pulvis ex lap. cancr. vel conch. citratis, crysallo montana præp. & nitro, singulo bihorio vel trihorio ex aqua quadam diaphoretica, cum pauxillo aq. cinamomi cydon. roborata, vel potu conveniente sunt porrigendi; vel horum loco magno cum fructu præsertim si nullus adest calor p. n. pulvis *gummi arabici* aut tragacanthæ ad ʒi. sæpe eodem modo exhiberi potest; quæ gummata ob vim temperantem & demulcentem in multis hic valde sunt egregia.

XV.

Si vero *dolores vehementes* intestinorum sive tormina valde urgeant, optime profunt, præter modo laudata gummata 3. *oleosa*, ut ol. amygd. dulc. vel olivarum, vel sem. lini aut papaveris, vel per se quodlibet, vel saccharo remixtum, sed larga dosi, singula scilicet vice ad ʒj. ʒiʒ. vel ʒij. & quidem aliquoties in die data, quia parca dosi parum proficit; quæ olea simul acrimoniam rodentem egregie temperant, partemque erosam demulcent ac rursus sanant, ita ut multi e vulgo solis hisce oleis & saccharo ab hoc gravi morbo se liberent. Ita etiam pulveribus illis temperantibus *lene anodynum*, præsertim vespèri, contra illos dolores, apte admisceri potest.

Quomodo dolores mitigandi.

Præ-

(a) Infansibus & pueris pro ratione ætatis tantum aliquot grana exhibentur, eaque subinde totus morbus tollitur, vel saltem minuit solet.

Præterea 4. *Clysteres* vel ex decocto feminis lini, vel ex lacte & oleo ac theriaca, vel sero lactis & theriaca, velex solo oleo olivarum aut lini, in malo vehementiori, sunt injiciendi, & quidem, si dolores urgent, aliquoties in die, quæ & *tenesmo*, symptomati hic sæpe molestissimo, egregie medentur. Ventri denique vel eadem applicari possunt, quæ §. X. in diarrhœa laudavimus; vel *sacculus* imponatur e femin. carvi, anethi, & flor. chamomillæ; vel, ubi inflammationis in intestinis signa adsunt, *spiritus vini camphor.* calidus cum theriaca ope linteorum complicatorum.

XVI.

Potus idoneus.

Loco potus ordinarii, *cerevisia haud bibenda* præsertim frigida, aut sæculenta, quia hac ipsa omnia redduntur pejora; sed potius his ægris suasi, ut utantur *decocto*, C. C. vel hordei succo citri imprægnato, vel avenæ, vel ichtyocollæ, vel sero lactis, vel *aqua felferensi*, addito semper panco lacte, quando ægri ab hoc non abhorrent, & quidem; primis diebus larga copia & sæpius bibant, ad acria temperanda, eluenda & demulcenda. Sic *juscula* etiam *vitulina*, gallinacea, vervecina, præsertim incotto semine carvi, si æger juscula non averfatur, haud raro egregie hic profunt; sed de his §. XXIV. plura.

XVII.

Qui alvum deponenda.

Quoties alvum deponere cogitur æger, patina aut vas aliud huic usui idoneum in lecto ei subjiciatur, ne surgere cogatur, ob frigus his ægris summe noxium evitandum, præsertim quando in loco non satis temperato decumbit. Sed si hoc præsto non sit, aut æger surgere malit, extra cubiculum haud prodeat, verum perforatæ sellæ semper insideat, cui caloris causa vas supponatur aqua calida (in qua *verbenas* decoqui suadet CELSUS) impletum, lateresque calidi pedibus subjiciantur, ne frigore lædantur, corpusque in perpetuo blando calore, vestibus probe defensum, ad transpirationem, quæ hoc in morbo plerumque imminuta, restituendam, conservetur, omne enim frigus, quia transpirationem lædit, hic valde nocet & tormina augeat: hinc & *potus semper sit calidus*, aut saltem tepidus, viteturque frigidus qualiscumque quam solertissime.

XVIII.

Degneri modus curandi dysenteriam hypocæcannæ.

DEGNERUS, Medicus clarissimus Neomagensis, qui in vehementi dysenteria epidemica haud pridem vixit, arque utilissimum librum cum multis egregiis observationibus hoc de morbo nuper edidit; initio, ubi signa vomitus indicantia aderant, radicem *hypocæcannæ* optimo semper, ut asseverat, cum successu exhibuit; verum non solum in principio, sed etiam quovis morbi tempore, ubi indicia, noxiam quandam

in

in ventriculo adhuc hære materiam, se exhibebant, nisi forte virium defectus aut aliud quid id vetabat, eam a ℥ss. ad ℥ij. dedit, & si hæc materiam flavam aut viridem sursum vel deorsum evacuabat, alvi fluxus ut plurimum inde minuebatur & ægri plerumque intra paucos dies reconvalescebant.

XIX.

Sed si adhibita hypecacoanna alvi fluxus cum cæteris malis continuabat, ad materiam vitiatam acrem, tanquam illorum causam, uberius & evacuandam & corrigendam, horis XII. elapsis, *essentie rhei aquee sive anime rhabarbari cochleare dimidium vel integrum*, pro ægrorum diversitate, ipsis dedit, idque singulis IV. vel VI. horis repetit, donec malum imminutum fuit; atque de hac præterea affirmat, materiam noxiam non solum omnem hac ipsa blande evacuari, verum etiam intestina debilitata egregie roborari; immo simul, quando dolores ægros vehementer divexant, eam quoque præstantissimum illis esse anodynum.

XX.

Non in omnibus autem curationis initium ab *hypecacoanna* fecit; sed ubi vel non indicabatur, vel morbus jam invaluerat, *initium* quocumque morbi tempore *cum modo laudata rhabarb. essentia* fecit, atque præstantissimos inde fere semper vidit effectus; ægri quoque, ut asseverat, hoc remedio evacuante non debilitantur, sed fluxus potius sub usu ejus continuato sensim, una cum ventris doloribus, imminuebatur, & sæpe sine aliis remediis adhibitis plane cessabat, ægrique optime inde, nisi jam, quando accederet, prorsus desperati essent, sanati sunt.

XXI.

Sed præter evacuantia hæc, si malum his omnino tolli non potuit, *remedia quoque corrigentia & roborantia* in usum vocavit, inter quæ præ cæteris novum specificum, nimirum *decoct. corticis exotici, simarubæ* dicti, quod celebris JUS-SIEUS jam antea in Acad. Reg. Par. 1729. valde commendaverat, cujus ℥ij. in libris circiter ij. aquæ ad residuum ℥viij. pro tribus cyathis, coquuntur, quæ ordinaria dosis est quæ fluxum hunc sistit. Si tamen hi tres cyathi hoc prima vice haud præstent, iterandum est illud decoctum, ita plerumque post sextum haustum fluxus cessat, ægrique ut plurimum jam ab altero cyatho multum levaminis sentiunt. Attamen illud nunquam adhibendum esse præcipit, nisi evacuatis & liberatis prius primis viis a materia acri rodente, tanquam causa hujus morbi per prædicta evacuantia. Veleiam omni bihorio vel trihorio ℥j. vel ℥ij. hujus decocti ægris bibendas dedit, ad plenam usque curationem, per

per aliquot dies. Effectus ejus blandos & lenes esse docet, sine aliqua evacuatione, & dyenteriam, præsertim cruentam; sub ejus usu fere semper sensim decrevisse. Immo si cohibitus hic fluxus, ut fieri quandoque solet, aliquando redierit, repetito ejus usu intra triduum denuo ipsum curatum fuisse. Lenit (inquit) corrigit & roborat, ob amaritatem blandam; quam possidet. Si quibus sapor ejus est adversus, addito si-
rupō quodam verb. gr. papaveris, &c: emendari commodè potest; in substantia vero ventriculo molestus est. Si decoctum hoc desideratum effectum non præstabit, forte ob materiam non satis evacuatam, tincturam rhei laudatam bono eum successu ei admiscuit.

XXII.

*Cascarilla
& terra
japonica
usur.*

Denique notat DEGNERUS, egros fuisse, attamen paucos, ubi prædicta omnia desideratam opem non præstabant, & præsertim ubi tonus intestinorum nimis quantum debilitatus erat, atque tunc se ad fortiora adstringentia, corticem scilicet cascarilla, ipsum progressum esse: ubi autem primo non cascarilla pulverem, sed plerumque ejus tincturam sive essentiam cum simarubæ decocto mixtam, propinavit. Non raro etiam hanc tincturam cum tinct. rhei, partibus æqualibus sine decocto simarubæ dedit; atque bonum inde effectum vidit. Notat autem simul decoctum simarubæ majores vires in fluxu cruento, quam bilioso, mucoso aut purulento, (quem vulgo dysenteriam albam vocant) exeruisse; quo vero in casu huic decocto cascarillam utiliter admiscuit. Verum & hac nihil proficiente, tandem ad tertiam japonicam dictam, sive ad succum catechu, tanquam fortius adstringens; progressus est, eumque vel in pulvere vel in tinctura reliquis adstringentibus admixtum turissimum deprehendit.

XXIII.

*Radix Sa-
lab.*

Quoniam verò in doloribus oleosa à multis ob nauseam peculiarem sumi nequeunt, loco oleorum supra §. XV. laudatorum, Degnerius contra vehementes dolores aliud specificum, radicem scil. salab, quæ orchidis persicæ species esse dicitur, & naturæ macilaginosa est, valde laudat, cujus ꝑ. subtilissime pulverizata in aquæ viij. infunditur, & leni calore extrahitur; postea per linteum expressa quiete in gelatinam abit pulcherrimam, de qua contra dolores singulis duabus vel tribus horis cochleate dimidium vel integrum, prout dolorum vehementia est, sumitur, qua

qua egregie eos leniri, & intestina ulcerata sanari prædicat. (a)

XXIV.

DIÆTA ex Degneri consilio, acrimoniæ alcalicæ sit contraria, adeoque fere ut in febribus ardentibus moderata acida tantum abest ut noceant, ut potius tuto moderata copia omni cibo addi possint, & imprimis succus citri sive limonum, aut ipsum etiam acetum. Pro potu optime adhibetur decoctum bordei vel C.C. cum succo citri, vel decoctum album Sydenhamii, vel ichthyocollæ, item Thea, Coffea, aut horum loco decoctum sem. Carvi, quod egregium hic est anodynum, cum & sine lacte; vel etiam illorum loco & variationis causa lac obutyratum & serum lactis; (b) quibus roborandi gratia subinde haustulus boni vini rhenani vel mosellani, præsertim si æger illud appetat, interponi potest. Sed hæc omnia moderatis haustibus & non frigide sunt bibenda. Absint cerevisiæ, præsertim fœculentæ & frigidæ; nam hæ sæpe æstare; ex mea sententia, dysenteriz causæ sunt, eamque magis & sæpius, quam fructus herari, ut sæpius vidi, producant. Vina dulcia quæcumque, canariensis, hispanica & gallica, immo & rubra, & speciatim illud quod Pontac vocatur, aliave similia adstringentia his ægris nocere DEGNERUS quoque notavit, præsertim initio morbi, sicut omnia alia adstringentia. Quies servanda & calor moderatus, ut §. XVII. jam docuimus, cubiculo temperato, vestibus regumentisque procurandus; motus vero ac frigus at præsertim potus frigidus, aut incessus per pavimenta lapidea aliaque frigida, nudis, præsertim pedibus, summe sunt noxia.

XXV.

Morbo multum imminuto aut omnino superato, conducunt roborantia, & tonum intestinorum restituentia; ut spec. de hyacintho, corall. rubr. terra japonica, terra sigillata, cort. cascarillæ, crocus martis adstringens; essent. absinth. cort. aurant. cascarillæ, millefolii, ova ad duritiem cocta, cum pauco aceto in pastu, vinum rubrum aliudve generosum, & si intestina valde erosa fuerunt, oleum lini vel amygdalar. dulc. vel olivarum ad cochlear. j. vel gummi arabici ʒʒ. subinde interponendum, factaque curatione, exacta & moderata vitæ ratio per aliquot adhuc hebdomades requiritur, vitando noxium cibum atque potum, & cumprimis etiam frigus;

Vitæ & regimen.

Quid morbo superato faciendo.

(a) Inquirendum an non idem effectus vel a nostris orchidibus, quæ quoque mucilaginosæ sunt, vel etiam a mucilagine radices symphyt. coctæ, vel malva, vel althea vel seminis lini aut cydoniorum vel ichthyocollæ, aliisque similibus obtineri queat.

(b) Quod Baglivius & Degnerus quoque valde laudant.

gus; alias facile morbus cum periculo redit, ægrosque perimit.

XXVI.

Præservatio dysenteria.

Præservationis gratia bona est servanda diæta, & deinde quotidie mane, ex *Degneri* consilio, *tinctura rhei* cochli. j. assumendum. Ita & essentia millefol. cum essent. scordii, vel essent. pimpinellæ aut alexipharmaca egregie conducunt, si quotidie bis, matutino scilicet & vespertino tempore, apta earum dosi utamur; *corpus a frigore*, ubi opus, probe defendamus, cerevisiam sæculentam aut non probe coctam fructusque horæos, præsertim magnam eorum copiam vitemus, & moderatam diætam servemus. *Haustris vini rhenani generosi* in pastu etiam ad malum hoc avertendum egregie prodest, & apud ægros *saliva non est deglutienda*, neque etiam *edendum* aut *bibendum*. Quibus nullum est negotium apud ægros, eos vitent, quia dysenteria sæpe valde contagiosa.

XXVII.

Monita adhuc quedam medica circa dysenteriam.

Monita practica.

1. *Nulla dysenteria periculo vacat*; adeoque nunquam flocci facienda; qua in re multi peccant, malum, initio præsertim, nimis leve existimando, illudque sic negligendo, vel adhuc magis inepto vitæ regimine augendo.

2. *Haud facile sponte cedit, & natura sola in ejus curatione* ut plurimum stat post principia, & *parum valet*; artis vero præstantia & Medici dominium supra naturam hic egregie eminet, quia evacuando & corrigendo in tempore materiam noxiam & acrem, tanquam causam mali, morbum plerumque feliciter sanat.

3. *Omnes, qui hoc morbo pereunt, ex sphacelo intestinorum moriuntur*; quare hic omni modo præcavendus.

4. *Adstringentia* in principio & speciatim terrea, ut terra sigillata, japonica, corallia, C. C. ustum, crystallus montana, croci martis, tincturæ martiales, immo & vinum, *Ponsac* dictum, aliæque ejusmodi, nocent, adeoque vitanda; quia retinendo vitiatos intestinorum humores eorum inflationes, dolores, exulcerationes, itemque febres, aphthas aliæque mala, immo ipsam mortem inducunt, in fine tamen, sicut §. XXV. dictum est, roborandi causa adhiberi apte possunt; ubi ex *DEGNERI* sententia observatione *simaruba, ascarilla & terra catechu* reliquis roborantibus palmam hic præcipiunt, & securissima sunt.

5. *E contrario diluentia, potus aqueus, copiosus, calidus*, initio largiter haustris, ut cumprimis hydrogalæ; feri lactis, lactis

lactis ebutyrati, lactis ipsius, aquæ fellerensis cum lacte, decocti hordei vel citrati, vel ad modum coffeæ parum tosti, vel ichtyocollæ, cum vel sine gummi arabico, aliive similes, tam egregie sæpe profunt, ut multi fere solis his, mox in principio largiter adhibitis, servato simul apto victus regimine, restituti sint.

6. Ita & *salia omnia*, intestinis erosis, nocent: neque *mineralia* quæcumque hic magni sunt usus; sed *vegetabilia* & nonnulla ex *animali regno* hic prævalent.

7. *Omnia drastica purgantia*, immo & *aloetica*, ac speciatim quoque *Beccherianæ pilulæ*, sive simplices correctæ, ex DEGNERI & mea experientia, nihil boni præstant: quamvis hæ ultimæ a nonnullis in hoc malo valde commendentur.

8. Neque *gummata resinosa*, & nominatim mastiche, olibanum, aut *balsamica*, aut balsamus peruvianus, terebinthina, &c. a multis olim hunc fluxum sistendi sine proposita, neque *sudorifera*, præsertim calidiora, magnam virtutem hic exerunt.

9. *Rhabarbarum tostum*, a non paucis hic adeo laudatum, minus valet in hoc morbo, quam simplex pulvis & essentia ejus; quia torrendo vires ejus potius minuuntur quam augentur.

10. *Opiata* & inter hæc etiã *theriaca* ac *diascordium* in dysenteria Neomagensi nocuerunt; aliis vero in locis, evacuata prius & correctæ probe materia noxia, aliis admixta, sæpe profuerunt. Hinc caute observandum, ubi ea vel possint vel noceant.

XXVIII.

De Diabete.

In *Diabete*, cum scilicet urina eaque plerumque cruda Diabetes. super potionis modum, cum ægri languore excernitur, id quod plerumque *ob renes debiles* & nimis quantum laxos contingere solet, præsertim in iis, qui potu quocunque annis præcedentibus se *nimium & sæpius repleverant*, roborantia, blande adstringentia, imprimis species de hyacintho cum croco martis, & anodynis matitata, vel terra japonica aut ejus essentia, tinctura martis cydon. vel tinctura vitrioli martis, & vinum rubrum, aqua temperatum, modica quantitate profunt; potus vero sit parvus, & nimius quicunque vitandus. *Exercitatio* quoque & fricatio corporis frequens egregie hic conducunt: quia partes roborant, & transpirationem augendo serum a renibus divertunt.

XXIX.

XXIX.

Urina incontinentia.

Urine in- *Urina incontinentia* recens, quia *Sphincterem* *vesicæ de-*
continen- *tilem* pro causa agnoscit, roborantibus & nervinis externis
tia. atque internis, martialibus, aromaticis ac spirituosus, balneis
 martialibus & nervinis, vino rubro vel alio generoso modi-
 ce usurpatq, curanda; atque externa præcipue regioni pu-
 bis & perinæ imponenda. Vel si hæc parum sint, &, ut
 haud raro fit, nihil efficiant, congruis *instrumentis* (de qui-
 bus in chirurgia nostra) cohibenda.

XXX.

De Pollutione nocturna.

Pollutio- In *pollutione nocturna nimia*, si a sanguine abundante *acri-*
nes nimia. *ac fervido* originem ducit, præter venæ sectionem & dietam
 tenuem, refrigerantem aut temperantem, ac potum aquæ,
 blanda acida, ut cremor tartari, hepaticum rubr. Dres-
 dense, temperantia citrata, nitrosa, cum paucis saccharo
 saturati & camphora profunt, vitandusque, quantum fieri
 potest, in somno decubitus supinus. Si vero *debilitas jam*
insignis adfuit, & *pollutiones tamen*, ut sæpius observavi,
continuent, curatio sæpe est perquam difficilis; quia refrige-
 rantia & tenuis dieta adhuc magis debilitant, pleraque ve-
 ro roborantia pollutiones provocant & augent, atque hinc
 rursus debilitant; unde novi quosdam in summam corporis
 maciem, debilitatem cerebri ac memorie incidisse. His ve-
 ro, quia acrimonia stimulans mali causa fuit, præmissis
 modo dictis, cura *lactea* per aliquot hebdomades adhibita
 egregie profuit: postea suavia alimenta roborantia ex bonis
 jusculis & lacte, sed sine aromatibus aliisque acribus, item-
 que *emulsiones* ex amygdalis & seminibus frigidis, quibus
 malum tandem sublatum est. Quibus vero *pollutiones a se-*
minis nimia copia oriuntur, matrimonium est optimum re-
 medium.

XXXI.

De Fluxibus a motu turbato.

Fluxus a Si a motu turbato spirituum, fluxiones oriuntur, ut fluxus
motu tur- alvi post terrorem, tristitiam & metum, spirituosus, roborantia,
bato. insula aquea calida, motus corporis, immo in sanguineis ipsa
 sæpe

*sæpe venæ sectio conveniunt; post iram vero fluxus ventris aut vomitus, quia salutare sunt biliosæ acris materiæ evacuationes, non mox sunt sistendi, neque spirituum motus calefacientibus excitandus; sed potius placandus temperantibus, absorbentibus, nitrosis & cinnabarinis: ut pulvere temperante, vel pulvere marchionis ac specifico cephalico Michael. ex aqua temperata assumptis, & denique quiete. Vi-
tandæ contra sunt mox post iram evacuationes fortiores, præsertim emetica aut purgantia fortiora, quia turbatum nimisque exagitatum motum sanguinis & spirituum adhuc magis, ideoque nimis turbant; itaque eandem ob causam vitandus cibis, aut potus, maxime spirituosus. Lene tamen evacuant ex rhubarbo præsertim, aliove simili, aliquandiu post assumptum non nocet: & quando post aliquod temporis ab ira intervallum, amarities in ore, dolor ac pondus circa ventriculum, nausea, conatus vomendi, aut ipsa jam febris percipiuntur, leno emetico, ad majora mala a bile vitata in primis viis hærente præcavenda, utilissimum esse cognovi: quamvis nonnulli id pro veneno proclamant. Vid. F. HOFFMANNI dissert. de emetico aut purgante post iram veneno.*

XXXII.

De Sudore nimio.

Sudor nimius raro per se morbus est, verum plerumque non nisi aliorum morborum effectus vel symptoma est: quandoque tamen sudor copiosus salutaris est excretio sive crisis, qua natura a multis noxiis humoribus, aut saltem a supervacaneis sese liberat, sicut in catarrhalibus, febrilibus, aliisque nonnullis malis fieri solet, ubi ægri hoc ipso vel a malis liberantur, vel saltem insigne levamen sentiunt; quandoque autem symptoma est, quo ægri incredibiliter debilitantur atque extenuantur, quemadmodum hoc in hecticis, phthisicis, febribus quibusdam malignis, aliisque quibusdam morbis observare licet, quibus in casibus etiam colligativus dici solent.

XXXIII.

Quando forte a nimia humorum abundantia oritur, nullo modo est impediendus: novi enim sic plures, qui quotidie fere mane in lecto fortissime, sine omni incommodo aut noxa sudarunt, qui ceterum sani vixerunt, leves & agiles inde fuerunt, atque ad magnam ætatem hujus beneficio pervenerunt, & qui male se semper habuerunt, quando ille sudor consuetus matutinus non rite succederet, aut ob quamcumque causam impediretur aut interromperetur.

N

Igitur

Igitur ejusmodi sudor neque stragulorum rejectione, neque refrigeratione, neque medicamentis quibuscumque adstringentibus aut opiatibus est cohibendus, si tamen ille hominibus istis molestus esset, & inprimis illis noxius esse posset, quibus noctu sæpe aut summo mane, antequam hic sudor finitus, surgendum & in aerem frigidum exendum esset, sicuti verbi divini Ministris, Medicis, &c. iis præter parciores dietam in cibo & potu, suaderem sæpius repetita *purgantia*, ut sic humores illis abundantes per aliam viam e corpore eliminarentur; aucta enim una evacuatione, imminuitur altera, adeoque & hanc ob causam *diuretica* his prosunt.

XXXIV.

Si in he- Sudor nimius *hecticorum & phthisicorum* sive tabidorum
ctica aut noctu quoque potissimum eos affligens numquam levamen
sape. eis affert; sed potius mirifice illos debilitat, adeoque symptomaticus est, atque non nisi curato morbo, cujus symptoma est, curari potest, de quorum curatione supra Cap. VI. & Cap. X. §. XVI. egimus. Interea tamen aliquo modo ipsum minuunt & calorem temperant, primo *tegumenta leviora*, deinceps *pulveres temperantes*, ex conchis vel lapidibus cancrorum citratis, & nitro parati atque circa vesperam semel bisve exhibiti; vel spec. de hyacinth. cum pauillo nitri, adjecto uno alterove grano mass. pil. de cynogloss. & interjecto *potu sufficiente feri lactis* vel simplicis. vel cum herb. bellid. & acetosæ aut acetosellæ parati, aut *lactis ebulliyati*, vel & *emulsionis tenuioris*: quibus si non cedit, atque fluxus alvi adhuc supervenit, res conclamata esse solet.

XXXV.

Si in & Sudores largi in fine *paroxysmorum febrium intermitten-*
post fe- *tium*, itemque in crisis febrium acutarum boni moris, non
bres. sunt impediendi; sed quia critici & salutares tranquillo decubitu, potu temperato sufficiente, & potiunculis diaphoreticis ac temperantibus promovendi.

Quando autem ægri *post superatas febres intermittentes* *malum sudant*, ut sæpe fieri memini, interdum bis vel ter ess. quedam amara cum quarta parte essent. cortic. cascarillæ, noctu vero dosis spec. de hyacinth. cum mass. pil. de cynogloss. gr. j. vel ij. data egregie sudores hoscæ moderantur & tandem compefcunt.

Sudores copiosi, iique præsertim *frigidi*, febribus acutis & præsertim malignis, itemque inflammationibus viscerum partiumque internarum, ut & gangrænæ & sphacelo supervenientes, ut plurimum certam brevique secuturam mortem indicant, nullisque remediis cedunt.

XXXVI.

De Ulceribus.

In ulceribus serosis, serum abundans & acrius, *purgantibus*, Ulcera se. cumprimis *mercurialibus* & balsamicis, itemque diureticis & *resol.* diaphoreticis, ac nominatim essentis & decoctis lignorum aut herbarum traumaticarum, est evacuandum ac divertendum, lymphæque corruptio & acrimonia similibus, itemque succinatis, myrrhatis, pilulis Beccherianis, aliisque ejusmodi balsamicis corrigenda; immo *quandoque ipsa salivatione* per hydrargyrum, servando simul aptam victus rationem, & vitando acria, falsa, potiusque nimium, ulcera hæc optime curantur. De externis medicamentis, conf. Chirurgia nostra P. I. L. V. C. III.

CAPUT XIV.

De præcipuis sensuum morbis.

I.

Sensuum organa objectorum motus nervis recipiunt, atque ope horum, si rite sunt constituta, ad cerebrum *Quomodo oriuntur.* & animam transferunt; quando vero vel in mechanica organorum fabrica sive in partibus ipsorum solidis aliqua læsio contingit, vel in humoribus, aut in spiritibus aliquod vitium oritur, sensus unus aut plures vel prorsus abolentur, vel solum imminuuntur, vel depravantur, prout læsio illa & impedimentum actionis majus vel minus est: quandoque enim non tantum organum in una vel pluribus partibus simul læditur, sed vitium adhuc vel humorum vel spirituum accedit.

II.

Quo minor est spirituum cõpia & in organa sensuum influxus, eo minor est sensatio; hinc in *Causse generali.* *unimi deliquis & anæsthesia.* *poplexia* a virium defectu, vel omnes vel plerique pereunt sensus. Ita & quo humores magis vel minus circa organa vel nervos sensuum accumulantur & quiescunt, eo magis vel minus læduntur sensus. Ita & a læsione organi sensorii, verbi gratia, vulnere oculi, vel ruptura aut læsione membranæ tympani, visus vel auditus vel omnino destruitur, vel minuitur.

*Speciatim
visus vi-
tia.*

Speciatim vero *cecitas* oculo inducitur vario modo: nam *visus* tollitur in **AMAUROSIS** sive *gutta serena* (ubi nulum fere vitium in oculo apparet, & æger tamen haud videt) quando spiritibus a cerebro per nervum opticum ad tunicam oculi retinam transitus ob quamcunque causam denegatur: quo casu oculus ipse quidem sæpe sanus, & ut jam diximus, fere sine labe apparet, attamen æger cæcus est.

SUFFUSIO sive **CATARACTA** plerumque ab humore crystallino opaco, ut in scriptis meis de cataracta evici, ut plurimum albicante sive gryseo aut margaritis simili inducitur; rarissime vero a corpore membranaceo in humore aqueo genito, ut olim purarunt, oritur.

GLAUCOMA ex mea sententia a vitreo humore opaco originem ducit, quæ proinde opacitas, glauca, ut vereres docuerunt, profunde in oculo apparet; cum in suffusione corpus opacum pupillæ sive uvæ parti posteriori sit proximum.

Amblyopia sive visus debilis, generatim, vel a spirituum defectu atque non sufficienti per nervum in retinam influxu, ut in senibus aliisque, vel a studiis nimis, vel ab aliis causis valde debilitatis, vel ab humoribus, aut tunica cornea non satis pellucidis, provenit; sive hoc fiat in senibus ob senectutem, sive in junioribus a causis externis sive internis, quibuscumque; ab utroque vero caligo senum originem ducit.

Strabismus, vel a musculorum oculi inæquali tractione sive hæc a spasmo, aut epilepsia, sive a paralyti musculi cuiusdam ortum trahat; vel a puncto axis visoris in tunica retina læso.

OPHTHALMIA in inflammatione atque rubedine tunicarum oculi & cumprimis tunicæ albuginæ consistit.

UNGUIS, *pannus*, & *pterygium* in membrana p. n. exterius corneæ adnata eamque obtegente, consistit.

LEUCOMA sive *albugo*, ut plurimum a spissiori materia intra lamellas corneæ vel in superficie ejus hærente, vel & a cicatrice in cornea proveniunt.

NYCTALOPIA ut plurimum a pupilla nimia dilatatione, ut in die satis constringi nequeat, ortum trahit, quo fit ut organum visus a nimia radiorum copia obruatur, ut sicuti nocturnus, interdum videre nequeat.

Contrarium contingit in **HEMERALOPIA**, ubi vespere vel in loco obscuro pupilla nimis contracta satis dilatari, adeoque recte videre nequit.

MYOPIA vel a cornea, vel ab humore crystallino nimis convexis, vel ab oculis, consuetis aut usitatis juxta majoribus, ut leges optice docent, oriri potest. **PRESBITOPIA**

vero

vero a contraria causa provenit; ad utraque vero vitia etiam totius oculi singularis conformatio, ut v. gr. nimis brevis aut nimis longa, &c. plurimum facere potest. Plura oculi vitia in Chirurgia nostra videri possunt.

IV.

Quod ad *auditum* attinet, tollitur hic vel nervo auditorio omnino obstructo, vel destructo, vel membrana tympani lassa, pertusa vel lacerata ex vulnere vel ulcere, aut ossiculorum auditus & labyrinthi corruptionibus variis, abscessibus, ulceribus, obstructionibus, unde surditas provenit, licet causæ ejus sæpe ob situm absconditum perspicere nequeunt.

*Auditus
læsæ causæ
& vitia
varia.*

DIFFICULTAS vero **AUDITUS** oritur vel a spirituum paucitate, vel a partium auris internarum ac præsertim membranæ tympani vel relaxatione, vel induratione, aut in partium labyrinthi obstructione, ut in senibus, literatis, aliisque debilioribus; vel ab humorum decubitu aut congestione, ut in plethoricis, nervum auditorium, aliasque organi auditus partes lædente; vel a meatus auditorii obstructione a ceramine aliisque corporibus peregrinis: unde pro diversitate læsionis levioris aut gravioris auditus magis etiam minuscule lædi solet.

V.

Speciatim vero *tinnitus*, *sibilus* & *susurrus aurium* oriri videntur vel ab obstructionibus quorundam vasculorum in membranæ tympani, cavi tympani, vel labyrinthi; vel a motu p. n. aeris in cavo tympani contenti; unde & quandoque *fragores* illos, qui a quibusdam & præsertim surdastris in auribus sæpe, quasi sclopetus exploderetur, percipiuntur, provenire verisimile est.

*Speciatim
tinnitus.*

VI.

Gustus læsiones, atque *sapores inusitati* salivæ salibus peregrinis, vel particulis biliosis immixtis debentur; vel si omnino *gustus tollitur*, aut salivæ nimis viscidæ, aut linguæ nervis obstructis vel alia quadam ratione læsis, vitium erit adscribendum.

*Gustus &
olfactus
læsus.*

Ita & *olfactus sublatus* nervorum olfactoriorum obstructionem vel læsionem pro causa agnoscit.

VII.

FŒTOR corporis a sero corrupto & præsertim ejus particulis oleosis aut sulphureis corruptis & quasi putrefactis, dependet: nominatim vero *fætor narium* exulcerationi in narium membrana interna, sed maxime in ossibus nasi spongiosis, ut in *ozæna*, vel *cancro* ipso debetur; fætor oris vero a putrilagine gingivarum aut dentium, ulcere pulmonum, cruditatibus nidorosis in ventriculo hærentibus,

*Fætor corporis
auro
oris.*

tibus, vel a vermibus ventriculi, vel a mercurialium medicamentorum usu & actione ortum trahit, qui sætor peculiaris in ipsa salivatione ægrotum maxime percipitur.

VIII.

Stupor. STUPOR partium & tactus abolitus ab obstructione & paralyfi nervorum cutaneorum, aut ab ipsorum corruptione alia qualicumque provenit; dum sic spiritus eos transire nequeunt, adeoque nec sensus tactus fieri potest.

IX.

Memoria læsa. Sensus quoque interni varias patiuntur læsiones, & quidem primo: vel omnino abolentur, ut in perfecta *apoplexia*, *epilepsia* & *liporhymia* graviore; vel minuantur, ut in hoc morbo levius affligente, vel in *memoria imminuta* aut prorsus abolita; vel depravantur, ut in iudicio læso ac deliriis. Considerabimus hic primo MEMORIÆ DEBILITATEM sive *oblivionem*; quæ a spiritibus vel imminutis aut debilitatis, in sensibus nempe, aut post febrem acutam, aut a venere nimia, aut a studiis nimis, aliave causa simili quacumque oriri solet; vel ab impedito aut confuso eorum motu in cerebro, vel a læsione quadam ipsius cerebri, ut anima suas functiones in eo perficere recte nequeat.

X.

Deliria. Deinde notanda DELIRIA, quæ sensus interni & speciatim iudicii gravissima sunt læsiones, & inordinatum spirituum motum in cerebro indicant, eumque vel nimis auctum, vel nimis imminutum. Nam in *febris* & *mania* vehementius commoti & effertati nimis aut furentes quasi sunt; in *melancholia* vero non satis mobiles, sed quasi nimis fixi & depressi, vel ob humores nimis viscidos, vel propter obstructions in cerebro, aliavæ causas. Ita & *deliria oriuntur* in plerisque ægris a morbo vehemente, aut longo, *vigiliis* præsertim nimis valde debilitatis, utpote, quæ pessimi moris esse *Hippocrates* indicat.

Sed CATALEPSIS a summa eorum fixitate vel motu ad certum tempus impedito dependere videtur, dum ægri hi in eadem per aliquod tempus manent positura, in qua, dum morbo hocprehenduntur, fuerunt.

XI.

Vigilia. VIGILIÆ NIMIÆ motum sive exagitationem nimiam spirituum in cerebro, adeoque organorum sensuum quietem læsam, a quacumque causa, sive a calore nimio, sive exagitatione & tenuitate humorum, sive ab animi affectibus vehementioribus, sive a doloribus inductum consequuntur, dum in somno spiritus quiescunt. Curæ & meditationes severæ ob eandem rationem vigilias concitant; sed *nimia ventriculi repletio* vigilias quoque aut saltem somnum turbulentum & valde interruptum producit.

XII.

SOPOR *contra nimius sive affectus* SOPOROSI, quo & *Morbi sive apoplexia* pertinet, ab impedito libero motu liquidi nervosi *potosi*. sive spirituum per cerebrum & nervos ad organa sensuum proveniunt, sive hoc impedimentum a *sulphure narcotico* in sanguine existente, sicut in opiatīs, aliisque narcoticis continetur, oriatur; sive a *debilitate spirituum* & inde pendente vasculorum cerebri collapsu; sive a *pletora* in corticali cerebri substantia medullarem ejus partem comprimentem; sive a *sero* & sanguine nimis viscido, idem efficiente, vel medullarem cerebri substantiam intrare non potente; sive ab *effusione sanguinis vel seri* intra cranium, a causis externis & internis, casu ab alto, fractura cranii, sive a tumoribus intra cranium obortis dependeat.

SOMNIA sive *insomnia turbulenta* a motu turbato spirituum ob causas quascumque provenire existimo; quando vero ideæ in somno profundo fortius adhuc agitantur, INCUBUS, immo *somnambulatio* sive *noctambulatio* inde oriri solent.

XIII.

In *curatione* horum morborum generatim ad causas serio *Curatio generalis* semper est attendendum, operaque danda, ut in spirituum defectu hi augeantur, in motu peccantes in ordinem redigantur, & ut in organa sensuum spiritus libere fluere & agere possint, atque impedimenta actionis horum, quæcumque illa sint, quantum fieri potest, removeantur, organaque læsa corrigantur, aut debilitata rursus roborentur.

XIV.

Visus debilis & Amaurosis.

Generatim vero in *visus lesionibus* ac speciatim in VISU *Visus debilis & amaurosis* DEBILI, aut GUTTA SERENA sive AMAUROSIS incipiente aut saltem adhuc recenti, a *spirituum debilitate*, aut *paucitate*, vel ab *humoribus viscidis* aut eorum *decubitu* sive congestione in vel juxta nervos opticos provenientibus, *medicamenta*, quæ *spiritus augent*, viscidosque humores partim attenuant, partim revellunt, evacuant atque dissipant, interne sunt adhibenda: uti sunt, (*premissis & interjectis idoneis purgantibus*, immo & subinde si vomitus indicantia adsunt emeticis) omnis generis *cephalica* (a) aromatica, carminativa, attenuantia, & imprimis herb.

N 4

[a] Galenus scite dixit: Qui oculos curare vult, curet prius caput sive cerebrum, & qui hoc vult curare, curet prius corpus reliquum.

herb. euphrasæ, veronicæ, hyssopi, flores rosmarini, salviæ, cyani, sem. anisi, fœniculi, radix valerianæ, fœniculi, lignum sassafras, cinnamomum, millepedes, in forma infusi & pulveris usurpata, ubi & succus millepedum recens expressus, peculiari per aliquot hebdomades ratione, quotidie scilicet in numero eorum ascendendo, assumtus egregie sæpe proficit, immo & *mercurialia*, & ipsa subinde *salvatio*, consideratis probe rebus circumstantibus, causis & subjectis, caute adhibita, sicut aliquoties vidi, valde profunt, observato simul apto victus regimine (a). Si hæc vitia ab hæmorrhagiis consuetis suppressis, præsertim hæmorrhoidibus aut mensibus, vel evacuationibus sanguinis usitatis neglectis, efficiendum ut illæ in ordinem rursus redigantur; vel si hoc fieri facile non possit, missiones sanguinis artificiales eis substituantur. Sed si a neglecta vena sectione vel scarificatione, hæc denuo instituantur.

XV.

Externe profunt revellendi sine fonticuli variis in locis excitati, *vesicatoria*, *setacea*, præsertim in phlegmaticis; vel *cucurbitula* & venæ sectio in plethoricis: speciatim etiam hic sæpe conducunt cauteria vel fonticuli in sutura coronali aut in cervice; vel *setacea* in auribus facta, itemque *pediluvia* tepida frequenter adhibita. Oculis ipsis applicanda *roborantia*, ut aqua fœniculi, flor. cyani, valerianæ, euphrasæ, rosarum, spiritus vini, aqua Reginæ Hungariæ, sal volatile oleosum Sylvii, vel decoctum aut infusum rad. fœniculi in vino: quæ omnia vel per se vel etiam cum sacculis ex herbis roborantibus & semine fœniculi paratis oculis sæpius vel illinenda vel super imponenda. Conducunt etiam ad humores noxios ab oculis abducendos *errhina* naribus attracta, & cumprimis pulvis rad. iridis Flor. vel castan. equinæ, itemque spiritus C. C. aut sal volatile oleosum naribus subinde admotum aut bregmari instillatum. *Invetrata* autem *amaurosis* ut plurimum insanabilis.

XVI.

Suffusio sive Cataracta.

*Cataracta
sive suffusio.*

Atque hæc omnia etiam profunt in SUFFUSIONE sive CATARACTA incipiente aut recenti, quæ ab humoribus crassis, spissis sive viscidis, in humore crystallino hærentibus, oriri solet; quia eos attenuant, resolvunt, fluxiles rursus reddunt ac spiritus augent, ita ut hac ratione quandoque pella-

(a) Vid. dissert. nostræ de Amaurosi salivatione curata.

pellucidus rursus reddatur, visusque restitatur; quod si vero hoc obtineri nequeat, vel *cataracta* jam sit *inveterata* aut *matura* sive perfecta, manu chirurgica per acum est supprimenda. Sed de his omnibus prolixius legi potest curatio cataractæ & amauroseos in tractatione nostra de cataracta prolixè tradita, & speciatim etiam de curatione suffusionis per acum Institutiones nostræ chirurgicæ.

XVII.

De Maculis volantibus.

MACULÆ sive IMAGINES ante oculos VOLANTES, *Imagines oculorum volantes.* quæ ab obstructis nervi optici aut retinæ fibrillis vel a venulis ibidem p. n. nimis dilatatis mihi oriri videntur, difficillime tolluntur, præsertim si jam sunt inveteratæ, & haud raro vel amauroseos vel cataractæ sunt prodromi; interea tamen in principio pleraque ea ad obstructions illas referandas optime hic prosunt, quæ §. XIV. & XV. modo proposuimus & commendavimus, easque tunc sæpe vel tollunt, vel minuunt, vel saltem pejora mala præcavent, præsertim si conveniens vitæ regimen instituitur.

XVIII.

De maculis in Cornea.

Maculæ in cornea, UNGUIS, *pterygium*, *leucoma*, *strabismus*, sive *visus luscus*, alique morbi manuum opem requirentes, qui in oculo occurrunt, quomodo tractandi, ex chirurgia nostra, ubi prolixè de iis actum est, videri potest. *Macula in cornea.*

XIX.

Myopia, & Presbytopia.

MYOPIA non nisi vitris concavis emendatur, vix autem *Myopia* omnino nisi ætate majore subinde curatur. Sed in PRESBYTOPIA, quæ quoque vix sanari potest, perspicilla converga, una cum medicamentis cephalicis & roborantibus, tragæis, essentiis, infusis aquosis & vinosis, decoctis, ut & collyriis confortantibus §. XIV. indicatis, adhibenda sunt, ut visus tanto diutius conservetur. *Myopia & Presbytopia.*

Auditus læsiones, & cum primis tinnitus aurium atque *Auditus* auditus difficilis, quomodo curandi, vid. Cap. X. N. XI. *debilis.* & XII.

XX.

XX.

Gustus, & Olfactus læsus.

Gustus & olfactus plane aboliti, præsertim ubi causa non patet, vix aut difficillime ut plurimum restituntur; inter ea tamen §. XII. modo laudata remedia evacuantia, resolventia, roborantia, cephalica & anticatarrhalia sæpe haud sine successu adhibentur, quia obstructa vasa & nervos egregie aperiunt. Ubi vero *gustus solus depravatus*, & causa non adeo obscura, maxime in morbis cognitis, ut febribus, occurrat, sublato morbo præcipuo tollitur & hoc symptoma. Ita *sapor amarus* in febribus & extra febres, qui bilis copiam in ventriculo indicat, tollitur *febrifugis*, *emeticis*, purgantibus, acidis: *sapor midosus*, qui ab humoribus putridis oritur, fæco citri, aliisque acidis, addito subinde evacuantibus: *sapor salus*, aqueis, & præsertim aquis mineralibus, atque aqua calcis vivæ: *acidus* absorbentibus, terreis salibus alcalicis, magnesia, pulvere absorbente Wedelii, &c. imminuitur.

XXI.

In *fatore corporis*, qui ab humoribus corruptis ortum debet, putrilago humorum est emendanda, balsamicis, antiscorbuticis, purgantibus, sudoriferis, & speciatim decoctis radicum & lignorum, horumque essentiis. Speciatim in *fatore* & *putrilagine gingivatum*, tinctura lacc. Myns. cum tinctura flor. aquileg. maritata, est egregia, si gingivæ eis sæpius fricentur, itemque myrrha & alumen ustum reliquis pulveribus dentifriciis additum. Ita & *sal vulgare* hic egregie prodest, si dentes & gingivæ eo subinde fricentur.

In *Narium* *fatore* ab ozæna, ulcus est curandum, eaque si a lue venerea orta, vel eam comitetur, vix nisi mercurialibus aut ipsa salivatione mercuriali tolli potest. Externe hic profunt aqua viridis Hartmanni, aqua mercurialis, aliaque quæ in nostra Chirurgia Cap. de ozæna videri possunt.

XXII.

In *stupore artuum*, qui ab obstructis nervis cutaneis oriri videtur, præmissis purgantibus, revellentibus, præsertim mercurialibus, nervina ac spirituosâ externe & interne, atque inprimis interne spiritus C. C. liq. C. C. succin. sal volatile oleosum, externe spiritus formicarum, lumbricorum, salis ammoniaci, matricalis, itemque fricationes frequentes partium læsarum, sinapismi, armoraciæ ræzæ aut cantharidum

dum applicatio, fustigationes cum urticis recentibus, & balnea ex nervinis vel thermis naturalibus, sicut in paralyti, conveniunt.

XXIII.

De Delirio acutarum.

In delirio febrium acutarum quid sit faciendum videri potest supra pag. 44. *Delirium febrile.*

XXIV.

In MANIA, quæ delirium est cum furore & audacia, spiritus efferati mitigandi, venæ sectione larga eaque subinde repetita; emeticis & purgantibus præsertim ex helleboro paratis, decoctis aqueis, refrigerantibus & temperantibus, præsertim herbæ anagallidis, quod hic ut specificum valde laudatur; vel aqua simplice pura succo citri vel nitro largiter imprægnata, emulsionibus papaverinis cum camphora roboratis, vel & aliis blandis opiatas cum humectantibus sive decoctis datis; præterea balneis & pediluviiis, immo etiam subinde in nonnullis fustigationibus: quæ ipsa quoque in amore infano & furore uterino haud raro conducunt: quo autem ultimo in malo matrimonium cum juvene vegeto ut plurimum optime prodest.

Mania.

XXV.

De Melancholia.

In MELANCHOLIA spiritus segnes vel depressi (præmissis tamen alvum evacuantibus, & in sanguineis Venæ sectione) sunt excitandi, humores crassi ac difficulter mobiles incidendi & resolvendi: id quod fit moderato usu vini generosi, motu corporis frequenti, infusis herbarum attenuantium, resolventium, aromaticarum aut cephalicarum, ut betonicæ, salviæ, melissæ, rosmarini, additis cort. citri, vel cinnamomi, aliisque similibus, loco Theræ usurpatis, salibus volatil. oleosis, spir. C. C. lig. C. C. fuccinato, essent. cinnamomi, cort. citr. cort. aurant. herbæ & flor. rosmarini, aromatica, spiritu salis ammoniaci vinoso, præsertim oleis gratis cephalicis imprægnato, & inde sic parato balsamo vitæ, ad modum Schræderi vel Hoffmanni, speciebus lætific. diæmargarit. calid. cinnabari, blandis martialibus, aliisque anticaëstheticis; quibus grata spectacula & colloquia, musica, ambulationes in hortis amœnis, peregrinationes, aeris & regionis mutationes jucundæ, alizque men-

Melancholia.

tis recreationes sunt addenda. Nominatim vero in *melancholia hypochondriaca*, primæ viz & imprimis sanguinis congestiones in vasis venæ portæ sunt respiciendæ: hinc sanguinis missiones, moderata dicta, infusa calida plantarum laudarum aliarumque similium attenuantium, pulveres & essentia resolyentes atque antispasmodici, hic sunt egregii, vel & *aque minerales* exque martiales legitime usurpatæ, & præsertim varias ob causas ad fontes ipsos, si fieri potest, addito & motu corporis frequenti, sed moderato, ad humores & spiritus attenuandos, corrigendos atque excitandos, sæpe sunt præstantissimæ.

XXVI.

De Incubo, Noctambulis, & Catalepsi.

Noctambulatio & Catalepsi. Qui somniis turbulentis & incubo laborant, itemque Noctambuli sunt; aut catalepsi correpti, quia ab eadem fere causa oriuntur, eodem etiam fere modo, præmissis pro rerum circumstantium varietate evacuantibus & sanguinis missione, observata probe parca victus ratione, curandi.

XXVII.

De Rabie Canina sive morfu Canis rabidi atque Hydrophobia.

Morsus canis rabiosi & rabies canina. In rabiosi carnis morfu, (qui *hydrophobiam* sæpe cum aliis gravissimis symptomatibus, brevique tunc ut plurimum mortem inducere solet) prægressa immersione in aquam frigidam, si fieri potest, interne diaphoretica, præsertim theriaca cum aceto aut vino, vel essentia scordii cum spiritu vitrioli simplici aut dulci parum acuata apta dosi, subjuncto frequenti potu aqueo calido, cum primis infuso salviæ vel scordii, & regimine sudorifero mature sunt exhibenda, sæpius iteranda, diuque continuanda: quibus etiam *scarabeus majalis* contritus subinde interponi potest, qui ut summum specificum contra hoc malum a multis laudatur. Externe præ omnibus vulnus scalpello mox incidatur atque dilatetur, & vel ore, ad modum Pylorum apud veteres, exsugatur vel cucurbitulæ ad sanguinem infectum atque venenum rabiosi canis in morfu cum vulnere communicatum, extrahendum, applicentur, vel theriaca & aceto calido, vel aqua salsa aut forti muria, probe eluatur; aut, quod præstantissimum a multis habetur, ferro candente aduratur, ac denique ulterius tractetur, sicut in Chirurgia nostra capite de

vulneribus venenatis, docuimus. Ubi *Hydrophobia*, sive aquæ aut potus metus jam adest, raro malum curationem admittit. Interea laudata sunt adhibenda.

XXVIII.

De Vigilis nimis.

In *Vigiliis* involuntariis *nimis* (§. XI.) quæ in multis morbis ægros afficiunt, vel & sine alijs morbis multos misere affligunt, causa nota, si fieri potest, omni modo removenda, & spiritus nimium excitati atque exagitati placandi ac demulcendi, *emulsionibus*, præsertim papaveraceis, aut essentia croci cum vino malvat. parata a gutt. XX. sensim ad plures ascendendo; vel parca dosi laudani liquidi *Sydenhami*, vel theriacæ, vel pilula una aut altera de cynoglossa, vel extracto flor. aut semin. papaveris, non neglectis morbis concomitantibus. *Extra morbos vero cure & meditationes severe*, præsertim vesperi, sunt vitandæ, motus frequens corporis instituendus, nimiaque ventriculi repletio nocturna fugienda. Ubi *dolores in causa* sunt, hi antispasmodicis, temperantibus ac diaphoreticis sunt leniendi, atque causa eorum auferenda, & si hæc non sufficiunt, blanda *opiorum* his adjungenda. In *senum vero vigilis* potissimum curæ & sollicitudines nimis ablegandæ: e contrario tranquillitas animi, roborantia & spirituosa, & cumprimis modicus usus vini generosi, præsertim vesperi plerisque conveniunt, immo & medicamenta *ambrata*, ut spec. diambri, diamoschi, confect. alkerm. completa, theriaca, præsertim cum vino, & similia. *Potus vero aquei calidi*, quicumque, & in prius Coffeæ, a meridie & circa vespem, omnibus iis, qui dormire nequeunt, atque vigilis involuntariis excruciantur, maxime sunt vitandi.

XXIX.

De Memoria debili, & Oblivione.

Memoria debilitati prospici solet victu modico & roborante, medicamentis roborantibus, carminativis, aromaticis, cephalicis, Tragea aromatica Aug. specieb. diacinamom. pulv. stomach. Birckm. aliisque similibus, item spiritu magnanimitatis, sive formicarum compos. Laurenbergii, spir. lavendulæ, rosmarini, balsamo vitæ Schrœd. & Hoffm. sale volatili oleoso, &c. interne & externe usurpatis. Præterea & præsertim in senibus, confect. alkerm. completa vel anacardina, &c. elæosacchar. cinnamomi cum cinnabari nativa, vel antimonii; sive pulvis aureus Zellenis, &c. his in re-

*Vigilia
nimia.*

*Memoria
debilis cu-
ratio.*

regionibus usitatissimus: cavendum tamen, ne in usu horum præsertim ab hominibus calidioribus, copia excedatur, alias hi ægri in febres vel maniam, stultitiam aut fatuitatem haud raro incidunt.

In senibus hoc in morbo aliisque capitis debilitatibus, medicamentis plerisque *ambra*, si eam ferre possunt, utiliter plerumque admiscetur, adeoque & *species diambre* & *di-mosebi* tunc conducunt: ut pulvis, & essentia ambre cum fluidis roborantibus aliis. *Externe* vero aqua apoplect. Regin. Hung. spirit. lavend. balsama cephalica, salia volatilia sicca vel fluida & cucuphæ roborantes adhibenda *visando simul causas*, ut potionem aut venerem nimiam, vigilas voluntarias, meditationes nimias, & quæ alia forte huic malo occasionem dederunt.

XXX.

De Apoplexia.

Apoplexia
quid &
quotuplex.

Ad sensuum læsiones etiam quam maxime pertinet *Apoplexia*, adeoque hic de gravissimo & periculossimo hoc morbo adhuc acturi sumus. Est vero Apoplexia generatim morbus in quo ægri sensibus & motu nunc subito, nunc sensim privantur. Dividenda igitur est apoplexiæ 1. in *levem*, quando prægressa vertigine, aut dolore vel gravitate ac debilitate capitis, vel etiam sine his, quidam sensus & motus, vel in totum vel ex parte, reliquis adhuc integris, pereunt: quo in casu etiam sæpe inotus linguæ & loquela læduntur. Quando autem in alterutra tantum corporis parte motus vel solus, vel simul sensus & motus læduntur, *hemiplegia* vocari solet. 2. In *vehementiorem* sive *fortiorem*; quando correpti vel prægressis modo dictis malis, vel etiam sine his, sensibus & motu amissis, superstitæ tamen respiratione & pulsu, ut plurimum cum stertore subsequente, prosternuntur; & denique 3. in *vehementissimam*, quæ est, quando subito & uno quasi momento ægri, sine sensu & motu superstitæ, mortui, quasi securi percussi, aut fulmine tacti, procidunt. Ex quibus signis & diagnosi ac differentia sunt petenda. Quamvis vero *apoplexiam hæud raro vertigo præcedat*, tamen inde non mox concludendum aut pertimescendum, ut multi faciunt, quasi ex quavis vertigine apoplexia sequeretur: quia multi hac diu laborarunt, ubi tamen nulla apoplexia secuta est; & vice versa multi apoplexia sunt correpti, quam nulla vertigo præcessit.

XXX I.

Causse antecedentes apoplexiæ sunt variz; proxima vero *Causse apoplexia.* *sepiissime est ruptura cujusdam vasis* vel sanguiferi vel serosi aut lymphatici in cerebro, unde humores in calvariam effunduntur, qui cerebrum & nervos comprimunt, eorumque functiones vel lædunt vel omnino tollunt: quemadmodum hoc in dissectis cadaveribus quàmplurimis observatum est. (a). Vel causæ proxima quoque esse potest *obstructio vasorum cerebro* & præsertim corticali ejus substantia, vel a *sanguine nimis crasso & viscido*, sicut præsertim in plethoricis sæpe contingit, ubi facies & oculi ægrorum rubicundi & sanguine quasi distenti esse solent; *sive ab humoribus pituitosis sive serosis viscidis*, prout in ægris plegmaticis sive frigidis, præsertim senibus, qui ejusmodi humorum abundantia, cum in primis viis ex parva dieta, vel læsa ventriculi concoctione, tum in vasis sanguiferis & toto corpore laborant; ex qua diversitate & fundamento Apoplexia ratione causæ in *sanguineam & plegmaticam* vulgo & hæud inepte dividi solet, quæ divisio etiam in curatione suam habet utilitatem. Denique hic morbus etiam a *spirituum & virium defectu*, & inde orto vasorum cerebri ac nervorum collapsu, oriri potest, id quod præcipue in senibus, deinde vero etiam in iis accidere existimo, qui vel studiis nimis vel etiam venere nimia, aliisve de causis spiritus nimis absumserunt. Priori causæ proximæ, apoplexiæ scilicet sanguineæ, occasionem sive causam procatacticam sæpe præbet *crapula* sive potus vini nimius, aut spiritus vini aliorumve inebriantium; hinc multos novi, qui inter vel brevi post convivia apoplexia correpti & mortui sunt; vel *ira* aut *motus quidam vehementior*, &c. quæ omnia ad vasa in cerebro perrumpenda satis idonea sunt, *Apoplexiæ vero plegmaticæ* sive pituitosæ causa antecedens sive occasio esse potest voracitas sive *imbia* ventriculi, præsertim cibis viscidis ac tenacibus repletio, corporis & inprimis capitis refrigeratio, aer frigidus & humidus, & quæcumque humores serosos viscidos adhuc magis cogere possint.

XXX II.

Ex prædictis jam satis patere potest *Morbum hunc omnium acutissimum & periculosissimum esse*, & quidem quo vehementior, eo majus vitæ est periculum; adeoque promptissimum exigit auxilium, quod vero, pro causæ diversitate, varium esse debet. In *gradu tertio sive vehementissimo* nulla est curatio, sed *in primo vel altero*, præ omnibus, ad ægros hos exci-

*Prognosis
& cura.*

[a] Qua de re vidari potest Wapseri liber de Apoplexia & Lancisi aliorumque de Mortibus subitaneis.

excitandos conducit omnis generis remedia *volatilia spirituoſa* & roborantia naribus diligenter admoveſe, qualia ſunt ſpir. ſalis amon. ſimplex vel vinoſus, ſpiritus C. C. vel liquor C. C. ſuccin. vel etiam ſpiritus lavendulæ, roſmarini aut ſimiles; *ſalia præterea volatilia ſimplicia* & oleoſa, ſive ea ſint fluida ſive ſicca, vel aquæ ſpirituofæ, ut aqua Reginæ Hungariæ, analtina, apoplectica, &c. exhibitis ſimul interne aquis cephalicis ſpirituofis, & ſpiritu ſalis ammon. C. C. liquor. C. C. ſuccin. Balf. vitæ Schröderi aut Hoffmanni ac ſimilibus; quibus addendæ ſunt friationes capitis, pedum, manuum, immo in malo graviore, totius corporis commotio & agitatio, præſertim ſi æger a duobus aut pluribus perſonis robuſtis hinc inde per cubiculum diu multumque trahitur atque retrahitur; quo ipſo nonnullos rurus reſtitutos eſſe & ego vidi & alii ſcriptores teſtantur. Inter hæc vero in plethorica apoplexia, quam primum fieri poteſt, *largiter ſanguis*, modo ex brachio, modo ex pede, modo ex jugulo, immo etiam ex ipſa arteria temporum educatur.

Quando his nondum excitantur, *ſcarificationes* cum cucurbitulis etiam in ſincipite & occipite, itemque poſt aures inſtituantur, quibus ipſi ægri ſæpius in altero gradu excitati & a mortis periculo liberati ſunt: quæ omnia vero mature & in principio adhibeantur, quia ſi tarde hoc fiat, nihil plerumque efficiunt.

Clyſteres etiam *acriores* in inteſtina excitandi & revellendi cauſa injiciantur, itemque *veſicatoria* fortia ex cantharidibus vertici, cervici, dorſo ac ſuris eundem in finem ſuperimponantur, iſque quam ſolertiſſime donec excitentur, continuentur. In leviori etiam leniora ex his remedia ſunt adhibenda.

XXXIII.

In *apoplexia phlegmatica*, *frigida* ſive *pituitoſa* aut *ſeroſa*, præſertim ſi convivium, crapula aut repletio præceſſit, atque æger adhuc deglutire poteſt, *emeticum* valens eſt exhibendum, ceteraque omnia hætenus dicta, ſola forte ſanguis detractioe omiſſa, niſi plethora aut evacuatio ſanguinis conſulta ſuppreſſa ſit, tam externe quam interne ſunt facienda. *Uſus plantarum* pedis aut bregmatis a quibuſdam etiam valde hic commendatur, adeoque ſi illa brevi nihil efficiunt, etiam hanc tam in hac quam ſanguinea adhibere conſultum eſt. Vid. Chirurg. noſtr. Tab. XII. Fig. 11.

XXXIV.

Si *apoplexia a ſolo virium defectu oriatur*, (quæ interdum etiam magis pro ſyncope, lipothymia aut animi defectione eſt habenda) tunc neque miſſiones ſanguinis, neque emetica proſunt, ſed ſola excitantia & roborantia §. XXII. optime conducunt.

XXXV.

XXXV.

Æger excitatus roborantibus, postea donec vires pristinas, quantum fieri potest, recuperet, curandus, qua de re vero uberius, ubi de paralyfi acturi sumus, proponemus.

*Quid pest
paroxys-
mum.*

XXXVI.

Quia vero ii, qui semel apoplexia laborarunt, facile de-
nuo ea rursus corripuntur, in plethoricis *optimum præser-
vant est sanguinis missio*, quovis trimestri spatio instituta;
præterea modica & temperans victus ratio, medicamenta
temperantia & blande roborantia, abstinentia a studiis, cu-
ris & meditationibus gravioribus, fonticulus aut setaceum,
& usus aquarum medicatarum legitimus, remedia sunt præ-
stantissima.

*Præserva-
tio.*

XXXVII.

De Paralyfi.

Paralyfis, quia plerumque apoplexiæ soboles est, ejusque
quasi reliquæ, eam hic mox subjungemus. *Est vero Paraly-
fis morbus*, in quo una alterave pars corporis humani &
haud raro dimidia ejus pars omni motu & subinde etiam
sensu tactus privatur. Quando igitur integrum latus para-
lyfi laborat, apoplexia plerumque prægressa est; quando ve-
ro certum quoddam tantum membrum & nominatim bra-
chium vel pes, dolore & catarrhi ut plurimum præcesse-
runt, partesque paralyticæ ut plurimum molles, laxæ & flac-
cidæ tactu percipiuntur. *Linguam* etiam, musculos penis e-
rectores, & sphincteres haud raro quoque paralyticos fieri
sæpius observatur; quo primo casu homines vel difficillime
loquuntur, vel prorsus loqui non possunt; in posterioribus
vero vel penem non erigere, vel urinam aut excrementa re-
tinere nequeunt. *Tremor & stupor partium* paralyticos levio-
ris species mihi esse videntur.

*Paralyfis
quid &
quæ duplex.*

XXXVIII.

Ortum omnia hæc mala, me quidem iudice, vel a ner-
vis partium læsarum obstructis vel nimis quantum relaxatis
tanquam causis proximis obtinent. Quod ad *prognosin* atti-
net, curatu sane semper est perquam difficilis, & præsertim
in senibus, aut quando malum jam inveteratum est; inter-
ea tamen quando adhuc recens est, & æger vel puer vel
juvenis curationem sæpe adhuc admittit; quamvis aliquan-
do adhuc senes sexagenarios, immo septuagenarios, ceterum
robustos ac vegetos post insultus apoplecticos non adeo gra-
ves a paralyfi pedis & brachii rursus curatos viderim.

*Causa &
prognosis.*

XXXIX.

*Curatio
aque x.
interna.*

Igitur quando post appoplexiam primi aut secundi gradus ægri ad se redierunt, verum paralyſis vel alterius lateris vel certarum solum partium, pedis aut brachii, aut linguæ, ſicut ut plurimum fieri ſolet, inde relinquitur, ad nervos læſarum partium adhuc obſtructos, aut nimium relaxatos, aperiendos & roborandos; *interne aperiētia, roborantia & nervina* ſunt ſuadenda: ut infuſum *herbæ ſalviæ* ad modum theæ, aliquoties in die hauſtum, quod admodum egregium hic eſt, vel herbæ betonicæ, roſmarini, chamædryos aut chamæpytyos aliarumve herbarum cephalicarum vel per ſe vel cum herba baſilici, flor. roſmarini, ſalviæ, lavendulæ, vel & cinamomo mixtæ, præſertim ægris frigidiſſimis & phlegmaticis, ubi humores pituiſoſi & viſcidi peccant; cum quibus infuſis etiam *balaſam. vite Schræderi* vel *Hoffmanni*, vel bonum quoddam *ſal. vol. oleoſum Sylvi*, aut aliud ſimile, vel eſſentiæ aut tincturæ quædam aromaticæ, item ligni aloes & ambræ, apta quantitate iis commode exhibentur. Horum loco, præſertim in ægris *calidiſſimis*, ſpiritus C.C. vel liq. C.C. ſuccin. vel mixtura roborans aut tonica, ex ſpir. C.C. & tinct. tart. parata recte dantur. *Aqua ſalviæ*, tam ſimplex, quam inprimis cum vino diſtillata, etiam hic valde ſalutaris eſt, ſi ſubinde vel ſola ad cochl. j. vel ij. exhibetur, aut remedia laudata cum hac aqua loco vehiculi porriguntur. *Eleoſaccharum cinamomi* vel caryophyllorum per ſe, aut cum cinabari, margaritis, & ambra in pulverem reductum, atque roborandi cauſſa, ad ʒſſ. vel ultra ſenibus & frigidiſſimis aliquoties in die datum, egregie prodeſt; quam ob cauſſam *pulvis cephalicus, Zellenſis* dictus, qui pro arcano ibidem venditur, atque ex his conſtare videtur, etiam in Saxonia noſtra valde celebris & frequenti in uſu inter Magnates eſt. *Specificum* quoque *cephalicum Mich.* & *pulvis March.* tanquam diu uſitata ac laudata nervina ſæpe egregie profunt, iſſque etiam ſi ægri ambram ferre poſſunt, aliquot grana ambræ, immo olei quoque cinamomi & caryophyllorum, prout res exigit, cum fructu addi poſſunt. Ita etiam *ſpecies de cinam.* optime roborant & obſtructiones a viſcido ortas reſolvunt atque aperiunt. In quibus vero ægri *calor p.n. percipitur*, iſſ pulveres temperantes cinnabarini, vel antiſpaſmodici & temperandi & reſolvendi ſine profunt. In nonnullis *cauſus mercurialium uſus* ad obſtructiones has pertinaciores tollendas efficaciffimus eſt; immo & *aquarum medicatarum* vel tepidus vel calidus uſus contra hæc mala multis egregie jam profuit. Quibus omnibus vero, prout res exigit, ſubinde

eva-

evacuatio per alvum & in plethoricis Venæ sectio aut cucurbitulæ siccae & cruentæ. interponendæ.

XL.

Externe *litus* & *fricationes spirituosæ* ac nervini adhibendi 2 externa.
ex spirit. lumbric. formicar. C.C. serpilli, rosmarini & lavendulæ, aut ex aqua Regin. Hung. & Anhaltina, vel pro *pauperibus* spirit. vin. aut simplex aut rectificat. aut & juniperin. in quibus frustum saponis veneti vel hispanici ali-
usve boni dissolutum est. Vel partes læsæ fricari apte pos-
sunt *unguento nerv.* oleis destill. nervin. & aromat. impræ-
gnato, ut ol. destil. succini, salv. rosmarin. lavendul. origan.
majoran. & similibus. *Balnea* denique tepida ex ejusmodi
herbis parata, eaque *formicis* injectis roborata, ad nervos
obstructos referandos eosque nimis laxos roborandos valen-
tissima quoque sunt, sicut & *balnea ex sbermis* naturalibus,
vel aquis medicatis martialibus tepesactis & per sat longum
tempus usurpatis, quibus postea fricationes modo laudatæ
adhuc superaddi possunt. *Verberationes* membrorum læsorum
cum *urticis* recentibus ad stimulandum atque alliciendum
spirituum ad partes læsas influxum in quibusdam etiam val-
de conducunt; itemque *cucurbitulæ* siccae & cruentæ, immo
& *vesicatoria* & rubefaciencia iisdem partibus adhibita.

XLI.

Speciatim in *paralyfi lingue*, præter commendata genera-
lia, elæosach. cinam. vel caryophyllorum in lingua detinen-
dum & liquefactum sensim deglutiendum. *Aqua salviæ cum* Paralyfi
linguæ
aut penis
aut sphin-
cteris.
vino destillata & sæpius in ore detenta linguas has egregie
roborat. *Masticatio* frequens cinamomi, caryophyllor. cube-
bar. aut rad. pyrethri ac similium valde quoque hic pro-
dest, & basis linguæ extus sub mento spiritibus & unguen-
tis illis nervinis §. XL. sæpius in die probe fricanda.

In *paralyfi muscutorum penis* indeque nata cœundi & ge-
nerandi impotentia, quia erigi nequit, itemque in *paralyfi*
sphincteris vesicæ aut ani, lateta radice penis, regio pubis
& perinæi, non neglectis internis, iisdem externis sæpius
inungenda: quibus in casibus etiam *balnea* modo laudata
tam artificialia, quam naturalia, valde proficua sunt.

XLII.

De Syncope, Lipothymia, & Animi defectione sive deliquio.

Sub his nominibus omnibus illud malum intelligitur, *Quid sint
hæc mala.*
quando homo vel ex vitium defectu, præsertim ex hæmor-
rhagiis, vel ex subitaneo & vehementi terrore, horrore aut
metu, immo & visu alicujus rei sibi adversæ, ut v. gr.

aspectu sanguinis humani, vulneris, venæ sectionis, aliufve actionis chirurgicæ vel læsionis paulo gravioris, sensibus & motu, vel ex parte vel in totum privatur, cum faciei summo pallore instar mortui, pulsu vel summe debili, vel nullo; (a) ubi vero vel vellicationibus & commotionibus, vel medicamentis volatilibus aut spirituosus aliifve rebus similibus ut plurimum excitantur, & rursus ad se redeunt, quo ipso hæc mala ab Apoplexia potissimum distinguuntur.

XLIII.

Duplex ejus gradus commode statui potest; nimirum vel *levior*, vel *gravior*. *Levior* mihi dicitur, quando cum pallore faciei, visu turbato, vel & aurium tinnitu, immo & quandoque vertigine, vires ita vacillant, ut ægri sensibus magnam partem privati, procidant, nisi vel mature decumbant, vel ab adstantibus sustententur, vel mox roborante remedio vel ori & naribus, vel ambabus simul admotis aut ingestis reficiantur. *Gravior* vero, quando per aliquod tempus sine omni sæpe sensu, immo & sæpe sine omni motu decumbunt, respiratione etiam & pulsu valde debilibus, ubi tamen remediis spirituosus naribus admotis facilius quam in apoplexia, perceptionis sensum manifestant.

XLIV.

Causæ pleræque jam §. 42. indicatæ sunt: quibus adhuc *Causæ*. addi possunt morbi hysterici; dum scæminæ multæ hoc morbo laborantes sæpissime animo, sine alia causâ manifesta, linquuntur; id quod a spasms provenire videtur. Nonnullæ vero tantum vel plerumque tunc, quando rerum fragrantium suaveolentium odores naribus hauriunt, ut rosarum, liliorum, tuberosarum, florum aurantiorum, ambræ, moschi, zibethi, benzoës accensæ, vel styracis, aliorumque similium: atque hæc *lipothymia hysterica* vocari solent. Nonnulli vel nimis studiis vel nimia venere delassati, vel inedia quoque exhausti hisce malis corripiuntur.

XLV.

Diagnosis ex §. XLII. & seqq. peti potest. Quod vero ad *Diagnosis prognosin* attinet, ut plurimum ea plus terroris quam periculi habet, nisi forte ex nimis sanguinis profusionibus, præsertim vulnerum, aut viribus jam ab alio morbo profus consumptis, aut vehementissimo terrore ortum ducat; dum plerique ægri circa instantem mortis horam, si forte ad lectum emendandum, vel aliam ob causam elevantur & in

(a) Quidam Stahliani mira de animæ habitu in his morbis sibi agunt, nunquam probanda.

in fellam collocantur, animo liquuntur, ubi sæpe mortem instantem indicant. Reliquæ & præsertim leviores animi defectiones minus sovent periculi, & solo plerumque remedio quodam roborante, ore assumpto, vel naribus quoque tantum admo-^{to}, resuscitantur.

XLVI.

Itaque si cui lipothymia incidit, quando vena ipsi inciditur, aut ab aspectu sanguinis, vulneris, ulceris, fracturæ; aliussve morbi cujuscumque, vel in conspectu operationis chirurgicæ, præsertim gravioris & horrificæ, ut amputationis mammæ, brachii, femoris, calculi sectionis, &c. quæ species lipothymia ab horrore & metu, immo sola imaginatione haud raro provenire solent, dum nonnulli venæ sectionem sine lipothymia aspicere nequeunt; sæpe sola & matura mutatio cubiculi vel loci clausi cum aere libero, dum quis lipothymiam accedere sentit; remedio est. Illi vero qui jam gravius affecti, ut ambulare adeoque & locum mutare non amplius possint, solo odore aquæ Reginæ Hungar. aliussve similis aquæ vel spiritus; vel & vini aut aceti fortioris, immo & sola conspersione aquæ frigide in faciem, vel & haustulo vini generosi plerumque reficiuntur; vel & aquæ cinnamomi vel cedronellæ (a) cum vino paratæ; aliussve cardiacæ similis; quarum plurimæ sunt in officinis; & præservari, si ante venæ sectionem aliquid assumunt, & curari ab ejusmodi malis horrificis ut plurimum possunt; præsertim si homo, cui vena secanda, antequam sectio instituat, super lectulum deponitur, vel mox, si ex pallore inusitato faciei & sudore faciei animi defectionem instare intelligimus, super lectulum vel scamnum, aliussve locum aptum promovetur.

Curatio
levioris.

XLVII.

In gravioribus animi deliquiis, ubi modo laudata leniora cardiacæ sæpe parum sunt; valentiora adhibere convenit; ut sunt spiritus salis ammoniaci aquosus vel vinosus, quinaribus, tempolibus & pulsibus extus & cum fricatione sunt admovendi; vel sal volat. oleos. Sylvii eadem ratione usurpatum; immo & intus hæc remedia ad gutt. XL. vel L. per intervalla exhibenda, ut spiritus iis excitentur, augeantur, ac roborentur. Jungendæ his sunt aquæ spirituosæ, ut cinnamomi aut flori aurant. aut cedronellæ, aut cheiri cum vino, vel & haustulus vini generosi; itemque vellicationes

Curatio
gravioris.

(a) Multi hanc herbam melissam Turcicam, alii Moldavicam appellant, unde aqua cardiacæ fragrantissima & efficacissima parari potest.

& fricationes extremitatum, nasi, aurium, capitis, pilorum, &c. donec exsuscitentur & ad se redeant. Spiritus quoque C. C. & liquor C. C. succinat. eadem, ut modo de aliis spiritibus diximus, ratione, cum fructu adhiberi possunt; immo & elæosaccharum cinamomi, vel inde cum cinnabari paratus pulvis cardiacus tellensis ori ingestus, cum vel sine vehiculo spirituoso, multos ab animi deliquiis resuscitat & vires reddit; id quod & *Bals. vitæ Schræderi* vel *Hoffmanni* aliaque similia præstare solent.

VLVIII.

*Curatio
hysterica
lipochy-
mia.*

Si scæminæ & præsertim ex, quæ alias jam *hystericis passionibus* obnoxia fuerunt, lipothymiis corripuntur, quæ tunc *hysterica* vel *uterine* dici solent, vitanda omnia suaveolentia, & potius omnis generis fœtida naribus sunt admovenda, & cumprimis castoreum, assa fœtida, pennæ perdicum accensæ, corium, cornu vel pestem accensum, vel & spirituosæ fœtida, præsertim in malo graviori, ut spir. C. C. liq. C. C. succin. spir. castor. comp. Pharmacop. Londinensis, Essentia Castorei vel assæ fœtidæ, quæ ultima etiam gutt. XXX. ad L. vel LX. intus in his malis danda, non ommissis velticationibus & fricationibus partium prædictarum, §. XLVII. qua de re etiam jam actum supra p. 132.

XLIX.

*Si a san-
guinis fluxu
zibus.*

Si a sanguinis fluxibus nimis, sive vulnere sive aliarum partium, hi ex chirurgia sunt compescendi, ægrisque talia exhibenda, quæ cito ad vasa nimis evacuata transire eaque mature rursus replere possunt: ut iuscula, lac, emulsiones, gelatinæ, quibus aquæ spirituosæ & hastulus vini generosi ad spiritus augendos subinde interponenda, donec hæc mala præterierunt. Quæ remedia etiam optima sunt, quando animi deliquia in morbis quibuscumque, ubi vires valde detritæ, a spirituum & humorum bonorum defectu ortum trahunt.

L.

De Epilepsia.

*Epilepsia
quid
ejus sym-
ptomata.*

EPILEPSIA, Romanis *morbus comitialis*, est sensuum externorum internorumque subitanea plerumque abolitio, cum prostratione corporis & motibus musculorum, partiumque his nexarum, totius fere corporis, violentis & invitis, alternatim facta contractione & remissione, a causa quadam cerebrum aliasve partes nervosas vehementer pungente vel irritante. Accedunt his malis, dum ægri corripuntur, ut

ut plurimum pollicum intra manum & digitos contractio arctissima, terribilis sæpe vociferatio sive clamor inconditus, spuma, immo quandoque simul sanguis ex ore prorumpit, oculi & artus mirifice quandoque convertuntur aut inflectuntur, caput & brachia sæpe terræ vehementer allidunt, pedibus calcitrant, ventrem & pectus arcus in modum vel alia sæpe ratione, more quasi gesticulorum, convertunt, linguam sæpe mordendo perrumpunt & anxie atque profunde respirant; quæ mala tamen omnia in quibusdam, immo in eodem ægro, sæpe nunc sunt leniora nunc graviora, atque etiam in aliis, pro causæ sive irritationis forte natura aut vehementia, fortiora aut leviora. Neque etiam semper adsunt, sed per accessiones, post incerta temporis interval- la, nunc breviora, nunc longiora, affligunt ac redeunt: immo ipsæ illæ accessiones quoque nunc breviores, nunc lon- giores sunt. In pueris quoque ut plur. omnia sunt mitiora, quam in adultis. Quando ejusmodi paroxysmus remittit, ægri iis fere sunt similes, qui ex profundo somno, post gravem præsertim crapulam, evigilant, caput ipsis dolet, quasi somnolentum, grave ac turbulentum est, ita ut reminisci, recte cogitare aut judicare mox nequeant, & vix aut diffi- culter sciunt, ubi sint, aut quid factum sit; totum corpus summe delassatum plerumque ita est, ut mox post paroxys- mum surgere & ambulare haud valeant, quia motibus il- lis violentis quasi contracti, & vires consumptæ sunt. Qui- dam horum ægrorum brevi ante accessionem novum venturum paroxysmum præsentiant, atque tunc, si sapiunt, vel super lectum, vel alium locum securum caute se demittunt, ne a lapsu improvise se lædant, & speciatim caput durius ad lapides allidant, vel omnino lapsu per præcipitia se inter- ficiant; plerique autem subito & sine ejusmodi perceptione, ubicumque sunt, prosternuntur, atque vehementer sæpe ca- put sibi lædunt, vel lapsu prorsus enecantur: atque ex his etiam hujus morbi *diagnosis* haud obscura erit.

L I.

Epilepsia varias habet differentias, est enim vel *idiopa- thica*, vel *sympathica*; recens vel *inveterata*; a causa vel ex- terna vel interna producta; modo in *infantibus*, modo in *adultis*; modo ex vitio *cerebri*, modo *dentium*, modo *ven- triculi* aut *intestinelorum*, modo *uteri*. Causa proxima, ut mi- hi videtur, est semper causa quedam irritans, pungens, vel- licans, sicut id vel sola festuca ossis acuta cerebrum pun- gens, evincit, vel in infantibus dens gingivas urgens; vel in intestinis aut ventriculo vermes nervos vellicantes. *Stab- liani* quidem ad animam confugere, ejusque prudenti actioni

Differen-
tiæ epila-
ptice &
causæ.

& directioni truculentissimos omnes illos effectus (§. L.) adscribere volunt; verum præterquam quod illi motus omnes, nescia immo & invita anima, contingunt, (nam omnes illi motus sunt involuntarii) stultissima esset illa anima, quæ motus adeo horrendos, enormes, perniciosos & sæpe funestòs institueret, dum leniori sæpius modo se expedire posset.

Idiopathica sive essentialis rarior est sympathica, & vel ab humoribus vitiosis aut a scabie retropulsa, aut ab ulceribus intempestive clausis ad cerebrum delatis atque in certa quadam ejus parte hærentibus ac pungentibus; vel ab ossiculis aliisve partibus p. n. intra cranium excrecentibus; vel & quandoque ab animi quibusdam affectibus, ita scilicet vehementi, aut terrore, quibus in cerebro gravis aliqua læsio concitari & ejusmodi mala produci possunt. *Sympathica*, vel cum aliis morbis complicata, quæ & *symptomática* dicitur, ab irritatione quoque, sed alia in parte, quam capite hærente, provenit; adeoque ad causam illam irritantem removendam in curatione est cogitandum.

LII.

Idiopathica, morbus plerumque est diuturnus, & difficilior plerumque curatur; sympathica quia illius causas speciales in cranio hærentes, tam facile perspicere & eruere, quam hujus, immo sæpe prorsus detegere non possumus. Et si fortè etiam quandoque causam sciremus veram, ut v. gr. ossicula aut alia corpora p. n. in cerebro præonata, tamen ea tollere non valemus; quo fit, ut epilepsia sæpe nullis cedat remediis, licet nonnulla pro certissimis *specificis* decantentur, sed *prorsus insanabilis* sit, immo nullum tale dari existimo, nisi ad causam simul respiciatur. Ita *quo magis est inveterata*, eo difficilior curationem admittit; *quo vero recentior*, eo major adhuc spes est.

LIII.

In curatione igitur *idiopathica* & præsertim recentioris, respiciendum ad causam prægressam: quæ si forte *abundantia sanguinis*, ut in juvenibus, vel *consuetas sanguinis hæmorrhagias suppressa*, sanguinis *missio*, immo & *purgatio* sæpe conducit, & postea ille consuetus sanguinis fluxus suis remediis est restituendus, interpositis & subjanctis pulveribus & spiritibus illis cephalicis ac nervinis, mox indicandis. Sed si epilepsia *ab ulcere* quodam intempestive clauso, vel *a scabie* præsertim capitis aut faciei, aliisve impuris humoribus retropulsis, ortum traxerit, hi a capite rursus sunt revellendi per cucurbitulas, vesicatoria, fonticulos purgantia, præsertim ea, quibus mercur. dulc. admixtus, diaphoretica & sudorifera sunt avellendi; & per alia loca evacuan-

*Curatio
idiopathi-
ca.*

di, eisque epilepsia sæpe curatur. Si a febre intermittente *intempestive suppressa*, eadem revellentia & evacuantia ad materiam vitiosam a capite avocandam, conveniunt; quibus postea si febris redit, ea, quæ feбри rite curandæ supra proposuimus, aliaque roborantia cephalica sunt subjungenda. Si ab ira producta est, sanguinis detractio, & quæ vehementiorem ejus motum bilisque acrimoniam temperant, ut salia temperata roedea, nitrum & tinnabaris, pulvis antispasmodicus celebris, specif. cephal. Michael. cum nitro, pulvis epilept. Matchion. vel solus vel cum prædictis mixtus, aliaque nervina, observata simul animi tranquillitate, conducunt, *Spiritus vitrioli philosophicus*, spiritus nitri vel vitrioli dulcis, itemque liq. anodyn. Hoffmanni, hic quoque egregie profunt. Denique & tam in hac specie, quam etiam in alijs, ubi humores biliosi aliive noxii in ventriculo hærent, *Vomitorium* sæpe est admodum salutare. Si a terrore ortum duxit, quo humores condensari & ad stasim disponi solent, præter venæ sectionem, blande dissolventia, ut sunt pulveres antispasmodici, spir. C.C. liq. C.C. succinat. cum infuso theæ aut aliarum herbarum cephalicarum, vel aquis diaphoreticis, ut fl. tiliæ, sambuci, acaciar. ceras. nigr. cinnamomi, hirundinum præsertim cum castoreo præparata, &c. danda. Quando a *festuca spina*, aliave re externa pungente oritur, extractio harum primarium est remedium.

LIV.

Si hæc omnia parum sunt, omnis generis pro specificis habita medicamenta, in quibus nihil noxii deprehendimus, exhibita. (quia semper cavendum, ne, quando prodesse non possumus, ægro noceamus) empirica etiam dicta, quorum quam plurima laudantur, adhiberi possunt: ad quæ referuntur lumbrici terrestres, ungulæ alcis, radix pæoniæ, cranium humanum, violenta præsertim morte peremptum, cor & cerebrum hirundinum, cor, talpæ, hepar lupi, ossa in ventriculo vel intestinis lupi reperta. Essentia dulcis Hallensium, *specificum Stablii*, oleum animale Dippelii & alia, quamvis & hæc & alia sæpius frustra adhibita esse sciam. Sunt quædam epilepsiæ, a leviori sorte causa ortæ, verb. grat. terrore vel ira leviori, vel scabie, modica productæ, aut quæ a dentitione aut variolis concitantur, quæ sæpe, ut subito & facile ortæ sunt, ita etiam facile rursus cessant, & naturæ vi subiguntur: si jam contra ejusmodi epilepsiam unum ex similibus specificis dictis fuit exhibitum, & epilepsia postea cessat, huic causa sublata epilepsia nimis credulis & imperitis adscribi solet, quæ sponte cessavit, vel sola natura sublata est. *Funiculus suturæ coronæ*.

si inustus a quibusdam etiam huc refertur, de quo Chirurg. nostra videri potest. Quidam *stercus pavonis* aliaque *stercora* contra hunc morbum etiam commendant, ego vero hæc cum tota pharmacopœia stercorea auctoribus suis relinquo.

LV.

Curatio
sympathi-
ca.

In *sympathicis* & *symptomaticis* major plerumque ac prom-
prior curandi spes est: nam quæ *initio variolarum* oritur, ex-
hibitis remediis temperantibus, cessare solet; quæ remedia,
non omissa cinnabari, etiam in *epilepsia febrium aliarum* a-
cutarum curanda optime profunt. Quæ a *vermibus*, medica-
mentis mercurialibus, & quæ ceterum vermibus sunt con-
traria, plerumque superatur. Erat viri cujusdam honorati fi-
lia novem annos nata, diu vermibus & simul epilepsia mi-
sere confictata, quam, (multis remediis antea a quamplu-
rimis frustra adhibitis) pulveris chin. ʒi. & merc. viv. ʒʒ.
cum conserva & sirupo in electuarium redactis, ac per stata
tempora, ut in febre exhibitis, ita ut numquam redierit,
feliciter profligavi. Quando *epilepsia a dentitione* provenit,
& remedia, quæ ad hanc promovendam alias maxime ido-
nea, frustra adhibita sunt, immo & spir. C. C. dosis gutt.
IV. vel V. aliquoties data, nihil proficiat, vel *vena sectio*
in brachio ex Sydenhami observatione, vel *incisio transversa*
super dentibus exitum molientibus instituta morbum hunc
sepe tollit.

Si a *lacte* in ventriculo corrupto & acido facto in infanti-
bus lactantibus oritur *epilepsia*, hoc partim purgantibus ido-
neis est evacuandum, partim terreis absorbentibus est destrue-
dum: quo factum esse existimo, ut dum terrea in hoc casu
sæpius contingente, egregie proficiunt, postea tam multa ex
terreorum familia etiam in aliis speciebus, ab aliis scilicet
caussis ortis, pro specificis declarata sunt, quando forte ali-
quoties ejusmodi infantes ab epilepsia liberarunt; id quod
tamen in aliis plerumque non faciunt.

Quoties *epilepsia a mensibus suppressis*, hi sunt restituendi,
aut si cum *hysterica passione* complicata, hac curata, etiam
eius epilepsia symptomata iisdem antihystericis, vel & haud
raro matrimonio tolli solet.

LVI.

Quid in
paroxys-
mo.

In *paroxysmo* & speciatim *hystericæ epilepsiæ*, spiritus vo-
latiles cephalici ac nervini & cumprimis spir. C. C. vel liq.
C. C. succin. naribus admoveri, immo & præsertim in in-
fantibus, vertici instillari ac temporibus & pulsibus illini,
vel & cum spleniolis imponi possunt, donec ad se redeant.
Multi manus & pollices ægrorum fortiter constrictos vi di-
ducendos esse volunt ac jubent; meo autem judicio præstat
hoc intermittere, eosque ita relinquere, donec paroxysmus præ-

præterit, ne natura in hoc actu turbetur : quia alias nova accessio citius plerumque & sæpe adhuc vehementius, quam antea, redire solet. Superato paroxysmo, æger quiescat, donec vires sibi satis restitutas sentiat.

De ceteris morbis, *convulsivis* dictis, in sequenti capite plura proponentur.

C A P U T XV.

De Motus lisionibus.

I.

Motus in corpore humano diversimode lædi possunt: modo enim *aucti* sunt, modo *imminuti*, modo prorsus aboliti, vel *depravati* aut *inviti*, vitiumque sive causa vel in humoribus sive fluidis, id est, in sanguine & spiritibus, vel in partibus solidis, sive movendis hærebit.

*Motus la-
si quom-
plices.*

II.

Causæ motus præter naturam aucti, ut convulsionis, epilepsiz, &c. non a prudenti animæ directione proveniunt, ut *Stabliani* volunt, dum anima, quod hoc faciat, ignorat, immo dum non facit, etiam, quod faciat, scire nequit; verum sunt res irritantes quæcumque materiales, ut *sanguis & humores quantitatē vel qualitate noxia peccantes*, salia peregrina diversa, vermes, dentes prorumpentes, festucæ ossium pungentes, &c. a quibus omnibus, si fibræ aut partes nervæ corporis humani rarius afficiuntur & irritantur, spiritus quoque vehementius exagitantur, partesque solidæ inde inordinate moventur: qui tamen motus inordinati, pro partis & causæ diversitate, valde variant, & inde modo leniores sunt, modo vehementiores. Ita *spiritus cum impetu* ob quamcumque causam in musculosas partes lati, *spasmos, convulsiones, epilepsiam*, vomitum, diarrhœam, priapismum, sive satyriasmum, &c. inducunt.

*Causæ
motus au-
cti.*

III.

A quantitate vero sanguinis nimia, vel ab ejus spissitudine oritur sæpe palpitatio cordis, *syncope*, *difficilis respiratio*, *suffocatio*, & præsertim etiam suffocatio uterina, aliique ita dicti affectus hysterici. Ab *irritatione & cumprimis per acria*, pro partium diversitate, ubi irritatio fit, sequuntur *sternutatio*, *russis*, *singultus*, *ructus*, *vomitus*, *nausea*, *spasmus*, *convulsio*, *epilepsia*, *fames immodica*, sive *canina*, aliaque mala.

IV.

Causæ motus imminuti vel deficientis sunt & humorum & spirituum vel defectus, vel paucitas, vel turbatio, vel ob-

*Causæ
motus im-
minuti.*

fructiones nervorum; ut in *virium defectu*, *animi deliquiit*, *apoplexia*, *paralyfi*, *universali & particulari*, *tremore*, *impotentia virili*, *aphonia*, *lingue paralyfi*; vel *laesiones organorum*, ut in *fracturis*, *luxationibus*, *vulneribus & dissectionibus musculorum*, *tendinum*, *nervorum*. Ita & *anorexia* a motu ventriculi imminuto, quando cibos vel prorsus non, vel non satis exagitare, comminuere, atterere, digerere, vel expellere potest, ortum sæpe trahit: A *turbato* sive depravato *motu spirituum*, *vertigo*, *vomitibus*, *spasmi*, *convulsiones*, *epilepsia* & *deliria* proveniunt.

V.

*Curatio
generalis.*

In *CURATIONE* horum morborum generatim attendendum ad *causas & partem laesam*, ne neglecto foco ad symptomata tantum respiciamus: idcirco *studendum*, ut *prius causa* rite investigetur ac tollatur, & postea simul ad symptomata, præsertim si urgeant, respiciendum: De variis *motus laesionibus*, præsertim *ubi sensus simul læsi*; ut *apoplexia*, *epilepsia*, *animi defectionibus*, &c. jam capite XIV. egimus; nunc vero de aliis adhuc *motuum laesionibus*, quæ superfunt, & ubi sensus plerumque integri persistunt, exponemus. Ut primo

VI.

De Spasmo & Convulsionibus.

*Quid sint
& ejus
species.*

Inter hos primò considerabimus *motus spasmodicos*, qui *spasmi*, *nervorum distensiones*, sive *convulsiones* etiam appellantur. *Spasmi* dici solent, quando pars quædam corporis humani, vi musculorum præter voluntatem contractorum, vel constringitur, vel extenditur & plerumque cum dolore riget, vel & singulari eaque mirabili sæpius ratione intorquetur. Hujus species sunt Græcis vocabulis insignitæ, *Emprosthotonus*, *Opisthotonus* & *Tetanus*; quibus *spasmus cynicus* sive *Risus Sardonicus*, immo & *Priapismus* sive *Satyriasis*, tamquam *spasmi* particulares, addi possunt. *Convulsio* vero propriè vocatur, quando partes, ut in *epilepsia*, alternim contra animæ voluntatem eaque prorsus invita, modo contrahuntur, modo extenduntur.

*Causæ
horum.*

In *caussis spasmodorum & convulsionum* assignandis *Stahliani* rursus ad *animam*, tamquam ad commune ipsorum *asylum*, confugiunt, eique omnes illos motus, sæpe horrendos ac periculosos, sicuti in *epilepsia*, tamquam *causæ* adscribunt, quæ magna deliberatione corpori suo tantas & sæpe valde ridiculas, nunc vero perhorrescendas *deformitates*, in bonum ac salutarem ejus finem concitaret. Verum hoc

hoc a vero æque alienum in epilepsia mihi esse videtur, sicut id, ubi de hac supra Cap. XIV. multisque aliis occasionibus jam innuimus; sed potius certos humores vel quantitate vel qualitate peccantes, vel etiam sæpe res solidas peregrinas, vel p. n. in iis genitas, motus hosce anomalos & perniciosos plerumque producere existimamus: qui, si *vehementes*, tantum abest, ut commoda, sed potius gravissima sæpe mala ac damna, immo & ipsam haud raro mortem corpori inducant.

VIII.

Si *spasmi aut convulsiones leves*, & vel in digitis vel suris tantum, ut sæpius fit, incidunt, sæpe vel solis & simplicibus frictionibus hærens forte viscidum aut acre morbosum, quodcumque illud sit, in parte illa, rursus promovetur ac propellitur, atque sic simul spasmus curatur. Alias sæpe juvat, si saliva, præsertim hominis jejuni, vel spiritu vini, vel lavendulæ, vel aqua Reginæ Hungariæ aliave simili pars affecta probe fricatur.

*Curatio
spasmile-
verioris.*

IX.

Quando autem spasmi sunt vehementiores atque his haud cedunt, inquirendum, an non nimia sanguinis abundantia in culpa, aut menses, hæmorrhoides, varium hæmorrhagia aliæve consuetæ sanguinis vel naturales, vel artificiales evacuationes sint suppressæ, aut neglectæ. His enim perspectis, vel sanguinis detractiones artificiales, convenienti loco & tempore sunt instituendæ, atque menses vel hæmorrhoides obstructi in ordinem, sicut Cap. IX. docuimus, redigendi; ita sæpe his restitutis, omnes spasmi & convulsiones abiguntur.

Sed si his vinci nequeunt, verum vehementiores adhuc & pertinaciores sunt, ad remedia nervina & epileptica valentiora, quæ capite præcedenti §. 53. ad 56. ad epilepsiam, secundum causarum diversitatem, curandam commendata sunt, confugiendum, cum epilepsiæ atque spasmorum ob causarum similitudinem eadem fere sit curatio. Externe adhibentur sæpe feliciter spiritus nervini, ut fornicarum lumbricorum, C. C. aqua Reginæ Hungariæ, Anhaltina, cum & sine sapone veneto, si cervici, spinæ dorsii, naribus, partibus affectis fricando sæpius adhibeantur. Si partes nimis rigide sunt, fricationes per emollientia subinde melius profunt: ut unguentum nervinum, dialtheæ, martiatum, vel pinguedo caponum, leporina, humana, taxi, castorei, pedum bubulorum, vel per se, vel oleis penetrantibus naturalibus aut distillatis nervinis, qualia sunt petroleum, oleum destillatum succini, rutæ, rosmarini, salviæ, vel similia alia, imprægnata, quibus partes læsæ diligenter fricandæ. Aquarum salutarium usus legitimus, una cum balneis tempe-

temperatis, observato simul convenienti victus regimine, vitatisque *affectibus animi gravioribus*, ira præsertim, mœrore ac tristitia, in morbis spasmodicis longe quoque valentissimus est; sicut de horum genuino usu mox infra uberius proponemus. Quid in *spasms vulnerum* sit faciendum; e Chirurgia nostra p. 85. peti potest.

X.

De Maxillæ spasm.

*Spasmi
particula-
ris in ma-
xilla.*

In *spasms particularibus*, specialia quædam adhuc sunt observanda. Ut, si *spasmus est in maxilla inferiori*, ut ægri os aperire adeoque & cibos manducare nequeant, sicuti sæpe in vulneratis, ubi peregrina in vulneribus, aut ubi nervi læsi sunt, aut ubi acria, ut vitriolum, aliave similia ad sanguinem cohibendum vulnere immissa fuerunt, contingit, pro caussarum diversitate diverso modo ad eas auferendas est procedendum; qua vero de re, quia jam in chirurg. nostris operat. Cap. LXXVII. præcepimus, ne eadem hic nobis sint repetenda, L. B. ad hunc locum ablegamus. Quod si sponte, sive a causa interna *maxilla spasmus in infantibus*; ut sæpe vidi, contingit, ut plurimum moriuntur, & vix ullum servatum vidi, licet laudatissima remedia, & antispasmodica interne atque externe quam solertissime adhibita fuerint.

XI.

De Spasmo cynico.

*Spasmi
cynici.*

In *spasmo cynico*, quæ & *Risus sardonius* dicitur, si forte, ut sæpe fit, a venenis assumptis, præsertim cicutæ, aut ænanthes venenata specie proveniat, hæc quamprimum fieri potest, emetico e corpore expellantur, & postea ad reliquias in ventriculo destruendas; atque ventriculum vi sua summe refrigerante inde læsum roborandum, vinum generosum, ex veterum jam observatione, idque cum primis calidum vel per se, vel cum pipere vel Zingibere subinde potum, remedio est. Si ab aliis *spasmodorum causis*, alia antispasmodica & nervina, tam interna quam externa Cap. præced. §. 53. ad 56. laudata, sunt adhibenda; & inprimis etiam emplastrum ex empl. de betonic. & bacc. lauri cum oleo succini paratum, circa aures & tempora applicatum, egregie etiam hic prodest.

XII.

XII.

De Sternutatione nimia.

In *sternutatione nimia*, quæ ab acribus in naribus hærentibus & membranarum harum nervearum vellicantibus, oritur, ea *lacte calido*, naribus sæpius hausto, eluenda, temperanda atque demulcenda, donec remittat & denique omnino cesset. Si forte lac deficiat, aqua tepida ei substitui ejusque etiam vapor ad nares cum emolumento admitti potest. *Sternutatio nimia.*

XIII.

De Tussi convulsiva.

In *Tussi convulsiva*, præter infusa & decocta ex speciebus pectoralibus ac nervinis parata, & ad modum Thez aliquoties in die hausta, liq. C. C. succin. pulveresque ex nervinis & cinnabari compositi, ut specif. cephalic. Michael. pulvis epilept. Marchionis, & pulvis antispasmodicus, cum lenibus anodynis, ac præcipue massæ pilular. de styrace vel cynoglossa gr. j. vel altero, egregie conducunt, haud neglecta sanguinis missione & alvi expurgatione, si causæ prægressæ aut mala præsentia ea indicent. *Tussis convulsiva.*

XIV.

De Cordis palpitatione.

Hoc malum, quia etiam in motu cordis aucto, attamen invito, & spasmodice quasi vehementius contracto consistit, de eo hoc in loco quoque acturus sum. Motus hic sæpe tam vehemens est, ut *e longinquo audiri*, & ab adstantibus quoque aspectu thoracis sæpe videri queat. Quandoque hoc vitium *a motu corporis paullo fortiori*, præsertim quando homines loca acclivia ascendunt, & potissimum in *plethoricis* & *hypochondriacis* oritur; quandoque a *terrore*, quo sanguis a partibus externis subito versus cor repellitur, ita ut hoc, sanguine quasi obrutum, per multiplicatos ictus & constrictiones illud nimium sanguinis, quod ei molestum, ipsumque irritat, rursus a se removere cogatur, quo sensim in ordinem redacto, palpitatio plerumque cessare rursus solet. (a) Quando autem *vel motu vel terrore* vehementiori, vel causis his ob quamcumque ratione sæpius redeun-

(a) Stahlioni hunc morbum etiam *anima directioni* adscribens; verum quia consistit in motu, qui anima fit invita, ab hac, ut causa efficiente ac dirigente prevenire nequit.

redeuntibus, præsertim in plethoricis vel etiam ab aliis occasionibus pars sanguinis in cordis ventriculis vel vasis ejus majoribus, in *speciem polypi* coit, immo cum cordis ventriculis conglutinator vel concrefcit, sicuti quam sæpissime in horum cadaverum sectione inventum est, qui vivi palpitatione cordis diu confictati fuerunt, *palpitatio inde oritur fere continua*, eaque vel levior vel vehementior, prout polypus ille minor vel major est, adeoque vel minus vel majus sanguini transeunti obstaculum facit. Quandoque & mala cordis aut huic vicinorum vasorum majorum conformatio, ut v.g. *aneurisma arterie aortæ*, vel *osseæ aut lapideæ quedam partes*, aliæve res p. n. in corde aut vasis vicinis natæ, palpitationis sive motus hujus læsi causæ sunt; quibus vero in casibus morbus hic, quia causas hæc tollere haud valemus, ut plurimum insanabilis existit. Interea tamen etiam *sæpe a sola fere nimia sanguinis copia ortum trahit*; id quod inde evinci potest, quia in nonnullis sola sanguinis per venas detractione morbus hic, ut sæpius observavi, tolli solet.

XV.

Curatio
1. per san-
guinis
missio-
nem.

Igitur *initium curationis*, præsertim in plethoricis, aut iis, ubi consuetæ sanguinis excretiones, ut menses, hæmorrhagia narium vel hæmorrhoides suppressæ, aut usitatæ sanguinis detractiones neglectæ sunt, *faciendum a venæ sectione*; quæ vero, quo in loco vel parte corporis instituenda, ex eis intelligi potest, quæ Cap. I. de *Plethora morbis*, itemque Cap. IX. de *hæmorrhagiis suppressis* restituendis hac de re proposuimus; quæ etiam, si malum sorte redeat, præservandi causâ vere, & autumnis, immo & haud raro sæpius in anno repetenda; & ubi fluxus mensium vel hæmorrhoidum obstructus, hi idoneis suis remediis, ex eodem capite petendis, sunt restituendi.

XVI.

2. Per alia
remedia.

Præter hanc *remedia temperantia salina nitrosa & cinabarina*, ac speciatim pulveres temperantes atque antispasmodici, dum motum nimium cordis temperant, atque sanguinem crassum ac spissum incidunt, fluidioremque reddunt, egregie hic proficiunt, præsertim quando hi ægri etiam calore p. n. urgentur: atque hanc ob rationem *Wedelius* quoque pulverem suum absorbentem sæpius in hoc malo exhibitum, multis in locis & præsertim in Opiologia magnopere prædicat. *Infusa aquæ herbe theæ, melissæ, veronicæ, flor. primule veris*, vel pounorum citri, dum humores spissos & justo fervidiores diluunt ac temperant, multum quoque hic profunt, præsertim si essentia scordii, cardui benedicti, cort. citri vel aurant. cum pauxillo spiritus nitri dulcis, vel & liq.

liq. terræ foliatæ tartari, apta copia, mane & circa vesperam eundem in finem simul assumantur. *Pediluvia* denique temperata, *motus corporis* moderatus, sed frequens, *vestio*, *equitatio*, *victus modicus*, *potus tenuis* & sufficiens, cura seri lactis, immo & *aquæ medicatæ*, præsertim *maritiales*, curandi & præservandi scopo, cum primis hypochondriacis, quam utilissima sunt.

Atque hæc ipsa etiam in *polypo recenti* vel dissolvendo, & curando aut metuendo avertendo, si quid hic Medicina vallet, primaria esse remedia existimo.

XVII.

De Singultu.

Singultus est affectus spasmodicus *ventriculi*, & simul septi transversi, a re quadam irritante in eo hærente tuni- *Singultus*
caussa. camque ejus nervosam vellicante, ortus, qui vero quandoque *levem tantum in victu errorem* pro causa agnoscit, adeoque vel sponte sua brevi sæpissime desinit, vel assumpto potus haustu, ad materiam acrem temperandam & diluendam, cessat. Interdum vero est longe gravior, & causam habet vel gravio rem quandam *ventriculi lesionem*, vel *venenum* assumptum, vel *vulnus* aut *inflammationem* ventriculi, intestinorum, vesicæ, septi transversi, aut alius cujusdam visceris in abdomine; immo ex inflammationibus etiam externis & inde nata *gangrena* ac *sphacelo pedis singultum* quoque aliquoties *vidi gravissimum*, qui plerumque tunc mortem instantem, vel saltem appropinquantem indicare, quin & *in febribus acutis*, & præsertim malignis, *frequens singultus*, sed sæpissime *funestus* esse solet.

XVIII.

Pro causarum igitur diversitate vario etiam modo instituenda est *curatio*: ut si *senes*, vel alii *debiliores* post pastum largiorem, præsertim quando *durioribus* aut *flatulentis* *cibis* *usi sunt*, vel cibos avidius deglutiverunt, singultu corripuntur, *haustulus vini generosi*, vel *spiritus vini*, vel *aquæ spirituosæ*, anisi, fœniculi, menthæ, vel cort. aurant. aliarumque stomachicarum, eum ut plurimum sanat. Ita & *pulvis stomachicus Birck.* & *Tragea aromatica Augustan.*, aliive ejusmodi pulveres stomachales, admixto cortice peruviano, cum vino generoso sumpti, egregie hic prosunt. Eadem remedia, si *singultus a refrigeratione* quacumque corporis, vel potu aut cibo nimis frigido, incessu per pavimenta lapidea nudis pedibus, ortum ducit, benefaciunt, ubi simul *olea stomachica destillata* ventriculo illini, & *sac-*
Curatio si a diæta erroribus.
culus

culus ex stomachicis herbis, vel emplastrum aut cataplasma stomachicum ei superimponi apte possunt.

XIX.

Quando ab aliis causis & speciatim ab acidis humoribus *Si ab a.* In ventriculo hospitantibus provenit, medicamenta acidum *liis causis.* absorbentia, terrea, itemque oleum tartari per deliquium dare convenit. Si febris acuta, vel inflammationi ventriculi aut alterius cujusdam visceris supervenit, malum est peticulosissimum. Interea tamen pulveres nitrosi, camphorati, itemque spiritus nitri dulcis, cum essentia quadam alexipharmaca sæpe dati, quandoque juvant; ubi tamen etiam diascordii ʒj. ad ʒij. circa vespertam cum fructu exhibetur. Si a gangrena & sphacelo provenit, plerumque, ut §. 17. jam dictum, insanabilis est; interea tamen præter ea, quæ sphacelo speciatim contraria sunt, ut cumprimis est cort. peruvianus, & quæ modo contra inflammationes internas commendavimus, primaria remedia mihi esse videntur. Idem & judicandum & faciendum est, si singultus vulneribus partium internarum, vel & calculi aut herniæ sectioni incidat; licet plerumque mors brevi sequatur. Quando a venenis assumptis oritur, acrimonia veneni aqueis multis & lacte est eluenda ac temperanda, oleosis demulcenda, & ceteroquin ita procedendum, sicuti capite de venenis infra docuimus.

XX.

De Priapismo.

In priapismo sive satyriasi, (qui etiam in fortiori spasmus. modica musculorum erectorum penis contractione, ab acrimonia. præsertim venereo, ut plurimum inducta provenire solet, idque ut plurimum in juvenibus robustis, vegetis, sanguineis) conveniunt contra hoc malum large sanguinis missiones, & præsertim etiam ex ipsa vena penis, purgationes fortiores ex non calefacientibus nec resinosis paratæ; pulveres temperantes nitrosi, cum camphora & tantillo sacchari saturni, sæpius ex aqua simplici vel lactucæ aut menthæ dati. Potus sit aqueus, acidulus, refrigerans, servata simul diætâ tenui, refrigerantæ, vitandoque omnia calefacientia, stimulantia & bene nutritia.

Si infectio venerea concurrat, specificis huic malo oppositis, cum pristinis mercurialibus, hæc expugnanda.

XXI.

De Tremore.

Tremor est motus tremulus sive depravatus & invitus, *Quid ex unde.* manuum potissimum & capitis, interdum etiam pedum, immo & quandoque linguæ atque ipsius cordis. Malum est, quod *senibus frequentius* accidit, quam pueris & juvenibus; atque in illis potissimum a defectu spirituum provenire videtur. Interdum tamen & in his observatur, cum primis ex *terrore*, atque hinc nato inæquali aut non sufficienti in muscularos spirituum influxu, & interdum etiam ex *plethora*. Potius etiam nimius *Coffeæ* ad tremorem inducendum in multis perquam idoneus observatur; in quibusdam a *potu nimio* & frequenti *crapula*, in aliis a *nimia venere*, in nonnullis ab his simul ortus est; a quacumque vero harum causarum proveniat, curatu sæpe perquam difficilis, immo si jam inveteratus, ut plurimum impossibilis est.

XXII.

Interea tamen qui a tremore liberari, vel saltem levius inde affligi desiderant, *largiorem potum Coffeæ, crapulam & venerem nimiam* vitare debent. E contrario ad nervos debilitatos roborandos utantur quotidie *herba melissæ aut salviæ*, loco infusi theæ, vel & eadem cum china in cerevisia aut vino infundantur, & in pastu, vel circa illum bibantur. Cum infuso illo melissæ aut salviæ assumere etiam possunt *essentiam rosmarini*, & cort. peruviani, vel liquorem C. C. succinatum, bis vel ter in die, & vespere pulvis quoque antispasmodicus usurpandus, præsertim ab iis, qui calorem p. n. sentiunt, aut vino multo usi sunt.

Curatio.

Externe cervix & spina dorſi sequenti vel simili linimento roborante fricandæ.

℞. spir. formicar.

lumbricor. ℞ ℥ij.

salis ammon.

Cornu Cervi ℞ ℥℞.

vel 2℞. Aqu. Anhalrin. ℥vj.

sapon. venet. ℥j. M.

pro eodem scopo.

In *plethoricis* sæpe *Venæ sectio* prodest, in *senibus* haustus vini simplicis generosi vel roborantibus illis exaltati in pastu; & in *mulieribus* ad mensium negotium est respiciendum. *Pediluvia* frequentia, itemque *thermæ* & aquæ aliæ medicatæ rite usurpatæ, cum sobria victus ratione contra hoc malum etiam valde sunt proficua.

XXIII.

De Motibus imminutis aut abolitis generatim.

Motus imminuti vel aboliti. Motus imminuuntur vel omnino abolentur sæpe vel in toto fere corpore, vel in certis tantum ejus partibus. In toto corpore eos aboleri in *apoplexia* & *animi deliquiis*, jam præcedenti capite diximus, & quæ remedia tunc profunt, proposuimus; igitur jam de quibusdam aliis adhuc morbis tractabimus, ubi motus corporis imminuti vel depravati sunt, & speciatim de *languore*, *marasmo* ac *vertigine senili*, *paralyfi linguæ*, *aphonia*, sive loquendi difficultate & *impotentia virili*.

XXIV.

De Languore & Marasmo itemque Vertigine senili.

Languor, marasmus & vertigo senilis. Cum hic languor & motus impedimentum a spirituum ac virium decremento ortum ducant, hi omni modo sunt augendi atque excitandi, analeptics, stomachicis, cardiacis, cephalicis, nervinis, & quidem interne, vino moto generoso in pastu, hoc enim propterea *lac senum* appellari solet; eoque vel simplici, vel gratis aromatibus imprægnato; vel aquis spirituosiss, ut aqua cinamomi vinosa, cort. aurant. vel citri; vel aqua melissæ, florum cheiri, vel lilior. convall. vinosa, aut naphæ, cum vel sine *confectione alkermes*, eaque in vitris, qui *ambram* ferre possunt, completa; item *succolada*, emulsionibus cum aquis cardiacis paratis, *gelatinis* analepticis, *ovis* sorbilibus, vel vitellis ovorum in jussulis aut cerevisia calida solutis; præterea speciebus, *pulveribus & trageis*, ut tragea aromat. Angust. speciebus diacynamomi, diagalangæ, diambraz & diamoschi, immo & ipsa china chinæ; præterea *essentiis aromaticis*, cinamomi, caryophyll. cardamomi, cubebæ. cort. aurant. ligni aloes, ambræ, balsamo vitæ Hoffmanni, *eleosacch. cinamomi ambrato*, vel pulvere cephalico Zellenfi, cum margaritis & ambra roborato.

Externa naribus, cordi & pulsibus adhiberi apte sæpius possunt aquæ spirituosæ, ut aqua Regin. Hung. Anhaltina, vel apoplectica, aut spiritus lavendulæ, aut spir. salis ammon. vinosus, uno alterove oleo distillato suavi cephalico, pro habitu imprægnatus, vel & *sul volatile oleosum Sylvii* aliudve simile. Nonnullos *balsama cephalica* quoque roborare solent, ut apoplecticus vel cephalicus usitatus, bals. cinamomi, caryophyll. ligni rhodii, lavendulæ, succini, majore

majoranz aliave similia. Atque hæc omnia etiam in *vertigine senum*, a defectu spirituum dependente, benefaciunt, sed non in *sanguinea*, vitando simul curas, meditationes ac studia se-
 veriora, animusque ad tranquillitatem sit dispositus.

XXV.

De Lingua paralyti, Loquela lesione & Aphonia.

Quia hæc mala plerumque ab apoplexia oriuntur, præmissa *Curatio*. jam ut plurimum sunt ea, quæ in illa utilia aut necessaria esse solent, & imprimis *excitantia volatilia interna & externa*, itemque *sanguinis detractiones*. Quod si vero hæc non-
 dum instituta, aut hæc vitia sine prægressa apoplexia orta sint, *venæ sectio*, præsertim in plethoricis, in brachio, pede, vel & ipsa vena jugulari, aut raninis recte instituitur. Deinde vero ad spiritus ad linguam alliciendos atque advo-
 candos prodest *masficatio omnis generis acrium* aut aromatico-
 rum, ut cardamomi, cubebarum, amumi, piperis, rad. py-
 rethri, nicotianæ, vel seminis staphidis agræ; vel elæosac-
 charum cinamomi, caryophyllorum aut cardamomi, vel *pulvis aureus Zellepsi*, aliave istiusmodi stimulantia linguæ applicata, ore diu detenta, atque tandem deglutita. Cort.
 peruv. & succus nasturt. aquat. etiam hic prosunt. Pro po-
 tu ad modum herbæ theæ egregie quoque confert *infusum herbæ salviæ* vel *rosmarini*, bis terve in die cum liq. C. C. sufficienti copia sumptum. *Aqua salviæ cum visco destillata* in faucibus sæpe detenta, & loco gargarismatis simul usur-
 pata, valde etiam linguam debilem roborant. *Acetum scilli-
 scum*, si ut gargarisma hic adhibetur, & externe etiam sub mento radix linguæ eo aliquoties in die probe fricatur, valens quoque contra hoc malum est remedium: ubi tamen etiam *spiritus nervini* in paralyti commendati adhiberi cum fructu possunt.

XXVI.

De Impotentia virili.

Impotentia virilis est vel perfecta vel imperfecta, atque denotat generandi potentiam vel magis vel minus læsam, consistens præcipue & ut plurimum in *destructa penem eri-
 gendi facultate*, siue *stacciditate* aut *paralyti musculorum po-
 nis ereclorum*, quæ plerumque nimium & cumprimis præ-
 maturum veneris abulum pro causa agnoscit, quo spiritus ac vires juventutis nimis consumuntur, atque muscu-
 la *Impoten-
 tia & ejus
 causa.*

li prædicti sic nimis debilitantur. Interea tamen etiam ab aliis causis impotentia induci potest: ut si cui vel ab ictu aut conqussatione externa testiculi destruuntur, vel ab inflammatione, præsertim venerea, in scirrhum corrumpuntur, vel abscessu aut tabe dissolvuntur, vel in celotomia exciduntur, vel ictu sclopeti per glandes plumbeas aliove vulnere testiculi aut penis omnino auferuntur, vel etiam si qui *mentulam* non in *glande apertam habent*; quo fit ut semen cum debito vigore ad iterum & ovula mulierum projici nequeat. Denique qui nimis *phlegmaticum sive frigidum* habent sanguinem, vel *tristitie & mœrori*, vel *studiis*, curis atque solitudinibus nimis indulgent, vi generandi sæpe vel omnino, vel saltem magna ex parte privantur, præsertim si jam per se debilis & frigida sunt intemperiei, unde & hi impotentes jam a veteribus *frigidi* appellati sunt.

XXVII.

Quædam
curatio-
nem non
admis-
sunt.

In curatione, ubi partes ad generationem necessariae deperditæ sunt, quia hæ restitui nequeunt, nulla quoque est curatio; interea tamen, qui uno adhuc sano testiculo instructi sunt, atque erectio & genitura iis non deficit, ceterumque sani ac vegeti sunt, sæpe, ut aliquot novi exempla, æque fecundi ac proliferi existunt, quam qui vel maxime duobus instruuntur. Ita e contrario illi, quibus testiculi abscessu vel scirrhis indissolubilibus corrupti sunt, ut plurimum quoque sunt insanabiles.

XXVIII.

Quædam
vero ad-
mittunt.

Quibus vero erectio deficit, & malum nondum inveteratum est, idque vel mœrore diuturno, vel studiis, curis & solitudinibus nimis, victu nimis refrigerante, vel & hujusmodi medicamentis, aut veneris excessu, vel aliis in victus regimine erroribus, immo vel & morbis longis, quibus vires nimis detritæ sunt, inductum est, requiritur primo, ut ille cause, mœror scilicet, tristitia, studia & curæ nimis vitentur, morbi quibus inducta est, tollantur, atque ab erroribus illis abstinenceatur, alias omnia medicamenta sunt frustranea.

XXIX.

Curatio in
emaciat.
tia.

Deinde in nimis emaciatiss, & iis, qui vires per nimia studia, mœrorem, nimiam venerem aliasve causas exhausserunt, conducunt bona nutrientia, ut omnis generis juncula roborantia præsertim cum vitello ovi, ova mollia, gelatinæ, frequens usus lactis, cum pauxillo aquæ cinnamomi, vel ipso cinnamomo imprægnati, ipsa cura ac digesta lactea, potus succulade bonæ & leniter aromaticæ, ut & nutriat, & simul musculos languidos blande stimulet vimque erectionis restituat, ex quo fundamento etiam hic laudantur radices orchidis sive satyrii, & electuaria inde cum aliis roborantibus

com-

composita, ac præsertim zingibere, rad. pimpinellæ, nux moschata conditis aliisque similibus cum conf. alkerm. completa; vel & *electuarium diasatyræ*, quod jam dudum hunc in finem a veteribus commendatum fuit, aliis adhuc idoneis remediis pro lubitu roborandum. Vel & *aque medicatæ cum lacte* haustæ. Ubi etiam in pasto & aliis horis medicis haustus vini generosi vel simplicis vel gratis aromatibus ac roborantibus exaltati, inter quæ & cortex *cascarille* atque *peruvianus* merito pertinent, egregie conducit.

XXX.

Qui vero non emaciati sunt, sed contra *pingues, cachectici*. In *cacheci* aut *frigidi* temperamenti, & potissimum si nimia *laxitas* sit. *In toto corpore* ac speciatim in musculis erectores peccat, *stimulusque ad erectionem deficit*, his stimulantia spirituosæ, acria & aromatica ad spiritus ac vires suscitandas maxime conveniunt, quæ specifico nomine *aphrodisiaca* vulgo appellari solent; ad quæ præ ceteris pertinet vinum generosum; piper, sinapi, nux moschata condita, zingiber & rad. pimpinellæ albæ condita. Borax & stincus marinus, sub varia forma assumpta; inprimis vero *sinapi* vel *piperis* ctasso modo contusi ℥℥. aut ℥j. cum haustu vini generosi, hora ante decubitus tempus sumpta, egregie stimulant. Prosumt his præterea *essentia aphrodisiaca Wedelii*, vel *essentia aromatica bona*, *essentia ambræ*, immo & *essentia cantharidum* exaltata; vel *spiritus* ita dictus *magnanimitatis*, vel solus, vel cum modo laudatis essentiis mixtus; quin & caustus usus ipsius *pulveris cantharidum* in frigidis; ubi erectio vel nulla, vel valde languida, in pulveribus vel electuariis roborantibus, ad gr. ij. iij. & tandem plura, non est omnino rejiciendus. *Vinum generosum martiale* cum aromaticis corticeque *peruviano* compositum & bis vel ter in die ad aliquot uncias haustum, magnæ quoque hic est virtutis.

XXXI.

Externæ musculi penis, scrotum & perinæum spiritu fermi- *Externæ*
partum, lumbricorum, lavendulæ, rosmarini, aqua anhalti- *& diata.*
na, sale volatili oleoso Sylvii roboratis; vel & unguentis
nervinis oleis destillatis nervinis impregnatis, aliquoties in
die probe sunt fricandi. Immo & balnea atque infusus ex
herbis aromaticis parata; vel & ipsæ thermæ aut aquæ me-
dicatæ martiales hoc modo usurpatæ multum hic prosunt.
Dieta in macilentis aut hæcticis sit nutrens, facile digerenda, lactea, ubi & ostrearum & limacum frequens usus valde commendatur. *In frigidis cachecticis & obesis vero se*
magis aromatica & salsa, quibus & ostreæ cum pipere aliisque gratis aromatibus sæpe comestæ optime conveniunt.

Motus frequens corporis & præsertim vestitus & equitatio his ægris quoque egregie conducit.

XXXII.

De Articulorum rigore.

Rigoris
caussa.

Quoties junctura ossium alias mobilis *riget*, sive motum amittit, quod vitium Græci *Anchylosin* vocant, motus hic, si fieri adhuc potest, est restituendus. Oritur vero hoc vitium sæpe a *fractis*, *contusis* vel *vulneratis ossibus*, præsertim circa extrema, ubi ad ea rursus glutinanda quiete diuturna articulorum opus est, sub qua vel a liquore articulorum naturali sensum spissescente ac tandem inspissato, motus articuli imminuitur, vel prorsus aboletur; vel a succo osseo, ex ossibus diffractis in juncturam se insinuante extrema ossium plane conservent.

XXXIII.

Curatio.

Si motus difficultas solum ex longiori quiete & humore articulorum, ob motus defectum sensum aliquatenus concreto oritur, *emollientibus*, ac *resolventibus fomentis*, *unguentis*, oleis & axongis animalium calidis junctura rigida ac dura frequenter est fucanda, & a medico vel ministro flectendo hinc inde probe commovenda, donec motus sensum sensumque restituatur. Quod si hæc parum sunt, *balnea* quoque, tam artificialia ex emollientibus & dirigentibus, quam naturalia, sive *therma*, inter quæ *Wisbadenses*, *Aquisgranenses* & *Caroline* fere eminent, satis diu sunt adhibenda, ita sæpe inspissatus in articulo humor rursus dissolvitur & mobilitas ejus naturalis, si non in totum ac perfecte, tamen magna ex parte restituitur. Sed si ex ossium diffractorum succo, in articulum sensum effuso ibidemque firmiter concreto ossium extrema conferbuerint, vel rigor nimis vehemens, aut malum, a quacumque etiam causa ortum, jam valde sit inveteratum, vel & ex *podagra nodosa* productum, ut plorimum insanabile est, vel saltem perquam difficulter & non nisi iisdem modo commendatis remediis curatur, aut solum aliqua tantum ratione emendatur.

XXXIV.

Motus le-
sus a vul-
nere, fra-
ctura.

Si denique motus latus a *vulneribus*, *fracturis*, *luxationibus*, *tumoribus*, *inflammationibus*, aliisque similibus morbis ortum traxit, hæc mala omnia ut in chirurgia nostra docemus, rite sunt curanda; ita his, tanquam causis motus latus restitutis, motus etiam plerumque redit.

CAPUT XVI.

De ventriculi & intestinorum morbis.

I.

DE variis quidem ventriculi & intestinorum morbis jam hinc inde in antecedentibus egimus, ut de *ventriculi inflammatione* p. 120. de *vomitu simplici* Cap. XIII. §. XI. & *cruento* pag. 134. de *singultu* Cap. XV. §. 17. &c. verum cum quidam adhuc hand levioris momenti, de quibus hactenus nondum egimus, supersint, atque ab actione integra vel læsa ventriculi magna pars & sanitatis & morborum dependeat, operæ pretium erit, ut de præcipuis reliquis hoc in capite etiam adhuc agamus, & quidem primo

II.

De Anorexia sive cibi desiderio ablato.

Anorexia est ille morbus, quando homines cibos non appetunt, vel nullo ejus desiderio afficiuntur; hinc a latinis *cibi desiderium imminutum* aut *ablutum* vel *appetentia cibi læsa*, vulgo *appetitus prostratus*, *imminutus* vel *destructus* appellari solet.

Anorexia
quid? &
differen-
tia.

Est vero ea morbus vel *per se existens* sive *essentialis*, a ventriculi actione læsa aut ablata proveniens, & sine aliis morbis ortus; vel cum aliis morbis, iisque quamplurimis, ut symptoma, combinatus. Quando *anorexia per se morbus* est, ut plurimum a *prava dieta*, *nimia voracitate*, & inde *visceris crudis* atque *indigestis humoribus* in ventriculo hærentibus, coctionemque ciborum impredientibus provenit; qui se sæpe vel ponderis ac pressionis sensu in ventriculo produnt; vel flatibus multis, vel ructibus copiosis, nidorosis, aut amaris, vel pituitosis & acidis, vel nausea & conatu vomendi vel variis horum malis simul, immo vomitu sæpe ipso spontaneo se manifestant. Ita etiam *in senibus*, qui languorem in toto fere corpore perferunt, cibi appetentia, vel ob spirituum defectum, vel ob humores effictos, vel ob vim contractilem & motum ventriculi nimis debilitatum, aut prorsus destructum, sæpe ita decrescit, ut nihil quicquam appetant; unde sensim sentimque vires ita minuantur, ut fere sine alio morbo pereant, præsertim si *vigilie involuntariæ* accedunt, id quod *mori sine morbo* appellari potest.

Anorexia
essentialis.

III.

Anorexia
sympto-
matica.

Longe vero sæpius, ut symptoma, in quamplurimis morbis incidit, & nominatim in febribus acutis, inflammationibus gravioribus, asthma, hydrops, hypochondriacis, & melancholicis morbis, arthritide, podagra, vomitu, dysenteria, aliisque quamplurimis; ubi vel humores ita corrupti, vel spiritus ita suppressi, sicut in malignis, ut ad cibi desiderium excitandum vel ad ciborum concoctionem perficiendam prius inopri sint; vel natura forte alibi in morbo aliquo gravi superando & expellendo ita occupata est, ut omnes suas vires illuc dirigat, easque interea ventriculo, donec hostem superavit, subtrahat. Hæc anorexia symptomatice ut plurimum non curatur, nisi morbo primario prius subacto ac superato; attamen hoc victo, cibi desiderium sponte plerumque redire solet. Igitur de anorexia idiopathica sive essentiali curanda præcipue hic acturus sum.

IV.

Cura
1. per e-
vacuan-
tia.

Quando igitur ventriculus cruditatibus replètur, atque materia turget, sive conatus vomendi adest, non raro unico medicamento vomitorio hic morbus tollitur; vel solum aliquod remedium stomachicum ad malum penitus profligandum illi subiungendum. Si vero ejusmodi conatus abest, primo ad humores illos crudos incidendos & digerendos salia amara, ut vel salia plantarum amararum, tartarus vitriolatus, arcum duplicatum, sal digestivum Sylvii, aut similia in forma pulveris per unum alterumve diem aliquoties in die a ℥i. ad ℥ss. exhibenda; vel sub forma fluida, liq. terræ foliatæ tartari, ad guttas LX. & plures; hisque postea idoneum purgans vel ex pilulis amaris, vel ex sale amaro anglicano aut bohémico aliove simili superaddendum.

V.

2. per ro-
borantia.

Ventriculo atque intestinis expurgatis, essentia vel elixirum amara & aromatica stomachica, ad tonum ventriculi roborandum ejusque vim contractilem restituendam, aliquoties in die ad guttas 30. 60. & plures agro exhiberi, hisque pulveres stomachici, ut tragea aromatica August. pulv. stomach. Burchmanni, spec. pro morsulis Imperat. vel species diagalangæ, diacynamomi, vel de tribus piperibus ad ℥i. pro dosi, vel per se, vel cum vehiculo vinoso interponi debent. Calamus aromaticus conditus, itemque Zingiber conditum, essentia piperis, itemque essentia piperis hispanici sive capsici, vel & elixirum vitrioli Myrsinchi, aliave similia, præsertim ubi alcali vel biliosum peccat, ad cibi desiderium excitandum, ut & infusa radicum & herbarum aromaticarum & aromatizarum cum vino, sub specie vini absinthii parata, egregie quoque hic valent, præsertim si jus

vini

vini generosi usus in pastu accedat, vel & post pastum haustus cuiusdam *aquæ spirituosæ stomachicæ*, quæ vulgo *aquæ vitæ* vocari solent, subiungatur.

VI.

Ubi cruditates acide in ventriculo peccant, medicamenta ³ *Ubi acidum peccat.* *acidum absorbentia*, ut conchæ præparatæ, lapides cancerum, mater perlarum aut corallia præparata per aliquot dies sunt exhibenda, & postea idoneo *purgante*, vel ex pilulis aloeticis aut amaris aliis, vel ex rhabarbaro, vel ex sale amaro cathartico e corpore eliminentur. Utrique scopo & acidum absorbendi & evacuandi, *magnesia* etiam valde apta est, si per aliquot dies mane iusta copia usurpatur. Cruditatibus evacuatis, ad *tônum relaxatum instaurandum* remedia amara & aromatica, præcedenti numero V. commendata, prodesse apte possunt; verum remedia quoque *martialia* & cumprimis tinctura vitrioli martis Ludovici, vel tinctura martis cydoniata, aliquoties in die usurpata, vel & *croci martis* cumprimis aperitivus Stahliani, aut *limatura martis* subtilissime trita, cum elæosaccharo cinnamom. data egregie etiam hic benefaciunt. Usus legitimus *aquarum medicatarum martialium* utrique scopo & evacuandi & roborandi sæpe quam optime etiam satisfacit, præsertim si *motus frequens* corporis accedat: quibus plerumque ciborum desiderium quam valentissime excitari videmus, non neglecto haustu vini generosi in pastu, vel *aquæ vitæ* cuiusdam ante vel post pastum. *Vitandus* hic est *fumus tabaci* præsertim copiosus, *usus spiritus vini nimis frequens* & copiosus, præsertim matutinus; diætâ iridem inordinata, alimenta dura ac difficultè digerenda, pingua, flatulenta, studia & lucubrationes nimis quoque vitanda.

VII.

De Nausea.

Nausea est ille morbus, quo ægris non solum nullum est *Nausea* desiderium cibi, sed potius *fastidium* ejus: quare idem fere quid? est morbus ac præcedens, atque ex iisdem etiam causis oriri videtur, attamen gradu illum superat. Est quoque *morbus vel per se, vel symptoma* multorum aliorum morborum, atque in curatione quoque parum a præcedenti differt.

VIII.

Quando per se morbum constituit, studendum, *ut vitiosi humores* e ventriculo *ejiciantur*; id quod, præsertim si conatus ^{*Curatio essentialis.*} vomendi simul adest, *vomitum excitato*, si nihil vetat, optime ac brevissima via fieri solet. Sed si quid vomitum impedit, similia *purgantia* adhibenda, qualia §. IV. & VI. commenda-

mendata sunt. His eadem subjungenda *stomachum roborantia*, cum vino generoso, quæ §. V. & VI. proposuimus. *Externæ* ventriculo applicata, & inprimis *balsama stomachica* ex oleo Nucis moschatæ & oleis destillatis parata; vel *emplastra*, ut de crusta panis, de tacamahaca, vel stomach. Galeni sæpe etiam aliquid boni hic præstant.

IX.

Symptomatica.

Si in febribus acutis, præsertim malignis, epidemicis, petechialibus vel petechizantibus, nausea eaque cumprimis cum vomendi conatu adest, saluberrimo consilio atque optimo cum successu vomitoria & cumprimis ex radice hypocistidis exhiberi, supra jam Cap. V. de Febribus stomachicis acutis prolixè ostendimus. Ita etiam in principio multorum aliorum morborum & speciatim ab ira prægressa ortorum, ubi nausea cum conatu vomendi adest, itenique in dysenteria, præsertim epidemica & castrensi, vomitoria & utilia ac necessaria esse, multis in locis hæcenus asseveravimus, subjunctis postea illis remediis, quæ natura illorum morborum eorumque symptomata, resque circumstantes aliæ indicabunt, servata simul dicta tenui.

X.

De Bulimo sive Fame canina.

Bulimus quid?

Bulimus est morbus mox præcedentibus contrarius, quo ægri fame fere insatiabili & perpetua vorandi cupiditate afficiuntur, atque nisi cibis potiq. possint, sæpe animi deliquis corripuntur. Vocatur etiam *orexis* sive *fames canina*, *lupina* vel *bubula*.

Ejus causa.

Oriri solet vel a vi contractili musculose tunice ventriculi nimis elastica sive aucta, qua cibi iusto celerius expelluntur, atque sic tunice nerveæ patietum ventriculi fortius inter se atteruntur, unde sensus famis excitatur, vel oritur ab humoribus nimis acerbis in ventriculo hærentibus quibus eadem tunica iusto vehementius stimuletur, atque perpetuè fere famis sensus inducitur. In quibusdam ejusmodi ægrotum os dextrum ventriculi post mortem nimis amplum repertum est, quo factum, ut cibi iusto celerius expulsi, vel & sponte quasi elapsi sint.

XI.

Causa si a fibra nimis elastica.

Si hic morbus a fibra ventriculi nimium elasticis sive motu ejus contractili nimis aucto oritur, illæ relaxandæ ac debilitandæ: id quod fieri potest usu pinguium & oleosorum copioso, ut carnum pinguium lardi, pinguedinis porcine, oleosorum, pane calido, butyro, pinguedine porcina vel oleo lar-

Jargiter imprægnato & sæpius comello; præterea usu lactis & lacticinorum; præsertim pultium: ex farina & lacte, oryza, milio, hordeo, sagopyro, fabis, pis, lentibus, amygdalis aliisque similibus farinosis & oleosis cum jusculis pinguibus vel lacte paratis. Ita & *succulade* cum lacte confectæ potus frequens, additis farinosis & saccharatis, ut pane triticeo cum saccharo cocto, hic multum valet.

His denique, si parum sine, *opiata* addenda & speciatim theriacæ ʒj. vel altera singulo vesperi assumpta, egregie etiam huic malo mederi solent.

XII.

Quando ab humoribus acribus oritur, præter pingua, oleosa & opiata, speciatim hic prodest *largus usus absorbentium*, terreorum, & sigillatim, si *acidum* peccat, egregium remedium hic est *oleum tartari* per deliquium, a guttis XXX. ad LX. aliquoties in die vehiculo aqueo aut jusculo assumptum, *tinctura tartari* aliave similia alcalica, & præsertim etiam *limatura martis* larga satis copia sæpius assumpta. In nonnullis *spiritus vini potus*, cum primis matutinus, famem nimiam egregie temperat, ita ut sæpe iam multis anorexiam induxerit. *Fumus tabaci* frequens ad famem imminuendam multum quoque facit. Ubi vero *os dextrum ventriculi nimis amplum*, ut cibos retinere nequeat, malum ut plurimum est insanabile.

Si ab humoribus acribus.

XIII.

De Siti nimia.

Fami nimie mox subjungemus *sitim nimiam*, quæ quandoque etiam per se morbum constituit, nunc & plerumque est comes aliorum morborum. Quando est morbus per se, vel ab *acribus alcalicis*, vel *salis* aut *biliosis* cruditatibus in primis viis, aut ab iisdem in saliva & sanguine existentibus, oritur, qui status *intemperies biliosa sive calida* appellari solet, atque ægri calorem & siccitatem p. n. sentire solent; vel & ab *humoribus nimis spissis* iisque forte simul salis, ut in ore & œsophago pro his humectandis satis discerni nequeant, provenit.

Sitis nimia causata.

XIV.

Sive autem ab humoribus alcalicis & salis tenuibus, si ve simul viscidis sitis nimia oriatur, conducit primo *potus sufficiens aqueus*, nitro præsertim, vel succo citri vel tinctura florum bellidis, aliisque similis, aut spiritu quodam acido imprægnatus & sufficienti copia sacchari gratior redditus, ex quibus variæ potus species facile parari possunt. Ita & ex aquæ lb. ij. aceti vini vel destillati ʒj. vel ij. cum

Curatio.

culus ex stomachicis herbis, vel emplastrum aut cataplasma stomachicum ei superimponi apte possunt.

XIX.

Quando ab aliis causis & speciatim ab acidis humoribus *Si ab aliis causis.* In ventriculo hospitantibus provenit, medicamenta acidum absorbentia, terrea, itemque oleum tartari per deliquium dare convenit. Si febris acuta, vel inflammationi ventriculi aut alterius cujusdam visceris supervenit, malum est peticulosissimum. Interea tamen pulveres nitrosi, camphorati, itemque spiritus nitri dulcis, cum essentia quadam alexipharmaca sæpe dati, quandoque juvant; ubi tamen etiam diascordii ℥i. ad ℥ij. circa vespertam cum fructu exhibetur. Si a gangrana & sphacelo provenit, plerumque, ut §. 17. jam dictum, insanabilis est; interea tamen præter ea, quæ sphacelo speciatim contraria sunt, ut cumprimis est cort. peruvianus, & quæ modo contra inflammationes internas commendavimus, primaria remedia mihi esse videntur. Idem & judicandum & faciendum est, si singultus vulneribus partium internarum, vel & calculi aut herniæ sectioni incidat; licet plerumque mors brevi sequatur. Quando a venenis assumptis oritur, acrimonia veneni aqueis multis & lacte est eluenda ac temperanda, oleosis demulcenda, & ceteroquin ita procedendum, sicuti capite de venenis infra docuimus.

XX.

De Priapismo.

In priapismo sive satyriasi, (qui etiam in fortiori spasm. Priapif. modica musculorum erectorum penis contractione, ab acri, præsertim venereo, ut plurimum inducta provenire solet, idque ut plurimum in juvenibus robustis, vegetis, sanguineis) conveniunt contra hoc malum large sanguinis missiones, & præsertim etiam ex ipsa vena penis, purgationes fortiores ex non calefacientibus nec resinosis paratæ; pulveres temperantes nitrosi, cum camphora & tantillo sacchari saturni, sæpius ex aqua simplici vel lactucæ aut menthæ dati. Potus sit aqueus, acidulus, refrigerans, servata simul dieta tenui, refrigerante, vitandoque omnia calefacientia, stimulantia & bene nutrientia.

Si infectio venerea concurrat, specificis huic malo oppositis, cum primis mercurialibus, hæc expugnanda.

XXI.

De Tremore.

Tremor est motus tremulus sive depravatus & invitus, *Quid ex*
manuum potissimum & capitis, interdum etiam pedum, *unde.*
immo & quandoque linguæ atque ipsius cordis. Malum est,
quod senibus frequentius accidit, quam pueris & juvenibus;
atque in illis potissimum a defectu spirituum provenire vide-
tur. Interdum tamen & in his observatur, cum primis ex
errore, atque hinc nato inæquali aut non sufficienti in mu-
sculos spirituum influxu, & interdum etiam ex plethora. Po-
tus etiam nimius Cœffæ ad tremorem inducendum in multis
perquam idoneus observatur; in quibusdam a potu nimio &
frequenti crapula, in aliis a nimia venere, in nonnullis ab
his simul ortus est; & quacumque vero harum causarum pro-
veniat, curatu sæpe perquam difficilis, immo si jam invete-
ratus, ut plurimum impossibilis est.

XXII.

Interea tamen qui a tremore liberari, vel saltem levius
inde affligi desiderant, largiorem posum Cœffæ, crapulam &
venerem nimiam vitare debent. E contrario ad nervos debi-
litos roborandos utantur quotidie herba melissæ aut salviæ,
loco infusi theæ, vel & eadem cum china in cerevisia aut
vino infundantur, & in pastu, vel circa illum bibantur.
Cum infuso illo melissæ aut salviæ assumere etiam possunt
essentiam rosmarini, & cort. peruviani, vel liquorem C. C.
succinatum, bis vel ter in die, & vespere pulvis quoque
antispasmodicus usurpandus, præsertim ab iis, qui calorem
p. n. sentiunt, aut vino multo usi sunt.

Curatio.

Externe cervix & spina dorsi sequenti vel simili linimento
roborante fricandæ.

℥℥. spir. formicar.

lumbricor. ℥ ℥ij.

salis atrimon.

Cornu Cervi a ℥℥.

vel 2℥. Aqu. Anhaltin. ℥vj.

sapon. venet. ℥j. M.

pro eodem scopo.

In plethoricis sæpe Vena sectio prodest, in senibus haustus
vini simplicis generosi vel roborantibus illis exaltati in pa-
stu; & in mulieribus ad mensium negotium est respicien-
dum. Pediluvia frequentia; itemque therma & aquæ aliæ
medicatæ rite usurpatæ, cum sobria victus ratione contra
hoc malum etiam valde sunt proficua.

XXIII.

De Motibus imminutis aut abolitis generatim.

Motus imminuti vel aboliti. Motus imminuuntur vel omnino abolentur sæpe vel in toto fere corpore, vel in certis tantum ejus partibus. In toto corpore eos aboleri in *apoplexia* & *animi deliquitiis*, jam præcedenti capite diximus, & quæ remedia tunc profunt, proposuimus; igitur jam de quibusdam aliis adhuc morbis tractabimus, ubi motus corporis imminuti vel depravati sunt, & speciatim de *languore*, *marasmo* ac *vertigine senili*, *paralyfi linguæ*, *aphonia*, sive loquendi difficultate & *impotentia virili*.

XXIV.

De Languore & Marasmo itemque Vertigine senili.

Languor, marasmus & versigo senilis. Cum hic *languor* & motus impedimentum a spirituum ac virium decremento ortum ducant, hi omni modo sunt augendi atque excitandi, analepticiis, stomachicis, cardiacis, cephalicis, nervinis, & quidem interne, *vino mero generoso* in pastu, hoc enim propterea *lac senum* appellari solet; eoque vel simplici, vel gratis aromatibus imprægnato; vel *aquis spirituosis*, ut aqua cinamomi vinosa, cort. aurant. vel citri; vel aqua melissæ, florum cheiri, vel lilior. convall. vinosa, aut naphæ, cum vel sine *confectione alkermes*, eaque in viris, qui *ambram* ferre possunt, completa; item *succolada*, emulsionibus cum aquis cardiacis paratis, *gelatinis* analepticis, *ovis* forbilibus, vel vitellis ovorum in jussulis aut cerevisia calida solutis; præterea *speciebus*, *pulveribus* & *trageis*, ut tragea aromat. August. speciebus diacynamomi, diagalangæ, diambraz & diamoschi, immo & ipsa china chinæ; præterea *essentiis aromaticis*, cinamomi, caryophyll. cardamomi, cubebæ. cort. aurant. ligni aloes, ambræ, balsamo vitæ Hoffmanni, *oleosacch. cinamomi ambrato*, vel pulvere cephalico Zellenfi, cum margaritis & ambra roborato.

Externe naribus, cordi & pulsibus adhiberi apte sæpius possunt aquæ spirituosæ, ut aqua Regin. Hung. Anhaltina, vel apoplectica, aut spiritus lavendulæ, aut spir. salis ammon. vinosus, uno alterove oleo distillato suavi cephalico, pro libitu imprægnatus, vel & *sul volatile oleosum Syll. vii* aliudve simile. Nonnullos *balsama cephalica* quoque roborare solent, ut apoplecticus vel cephalicus usitatus, bals. cinamomi, caryophyll. ligni rhodii, lavendulæ, succini, majore

majoranz aliave similia. Atque hæc omnia etiam in *vertigine senum*, a defectu spirituum dependente, benefaciunt, sed non in *sanguinea*, vitando simul curas, meditationes ac studia superiora, animusque ad tranquillitatem sit dispositus.

XXV.

De Lingua paralyti, Loquela lesione & Aponia.

Quia hæc mala plerumque ab apoplexia oriuntur, præmissa Curatio. jam ut plurimum sunt ea, quæ in illa utilia aut necessaria esse solent, & imprimis *excitantia volatilia interna & externa*, itemque *sanguinis detractiones*. Quod si vero hæc nondum instituta, aut hæc vitia sine prægressa apoplexia orta sint, *vene sectio*, præsertim in plethoricis, in brachio, pede, vel & ipsa vena jugulari, aut raninis recte instituitur. Deinde vero ad spiritus ad linguam alliciendos atque advocandos prodest *masticatio omnis generis acrium* aut aromaticorum, ut cardamomi, cubearum, amumi, piperis, rad. pyrethri, nicotianæ, vel seminis staphidis agræ; vel elæosaccharum cinamomi, caryophyllorum aut cardamomi, vel *pulvis aureus Zellepsis*, aliave istiusmodi stimulantia linguæ applicata, ore diu detenta, atque tandem deglutita. Cort. peruv. & succus nasturt. aquat. etiam hic profunt. Pro potu ad modum herbæ theæ egregie quoque confert *infusum herbæ salviæ* vel *rosmarini*, bis terve in die cum liq. C. G. sufficienti copia sumptum. *Aqua salviæ cum vino destillata* in faucibus sæpe detenta, & loco gargarismatis simul usurpata, valde etiam linguam debilem roborant. *Acetum scilliticum*, si ut gargarisma hic adhibetur, & externe etiam sub mento radix linguæ eo aliquoties in die probe fricatur, valens quoque contra hoc malum est remedium: ubi tamen etiam *spiritus nervini* in paralyti commendati adhiberi cum fructu possunt.

XXVI.

De Impotentia virili.

Impotentia virilis est vel perfecta vel imperfecta, atque denotat generandi potentiam vel magis vel minus laesam, consistens præcipue & ut plurimum in *destructa penem erigendi facultate*, sive *flacciditate* aut *paralyti musculorum penis erectionum*, quæ plerumque nimium & cumprimis præmaturum *veneris abulum* pro causa agnoscit, quo spiritus ac vires juventutis nimis consumuntur, atque muscu-

Impotentia & eius causa.

li prædicti sic nimis debilitantur. Interea tamen etiam ab aliis causis impotentia induci potest: ut si cui vel ab ictu aut conquassatione externa testiculi destruantur, vel ab inflammatione, præsertim venerea, in scirrbum corumpuntur, vel abscessu aut tabe dissolvuntur, vel in celotomia exciduntur, vel ictu sclopeti per glandes plumbeas aliove vulnere testiculi aut penis omnino auferuntur, vel etiam si qui mentulam non in glande apertam habent; quo fit ut semen cum debito vigore ad uterum & ovula mulierum projici nequeat. Denique qui nimis pblegmaticum sive frigidum habent sanguinem, vel tristitiæ & mærori, vel studiis, curis atque solitudinibus nimis indulgent, vi generandi sæpe vel omnino, vel saltem magna ex parte privantur, præsertim si jam per se debilis & frigida sint intemperiei, unde & hi impotentes jam a veteribus frigidi appellati sunt.

XXVII.

Quædam
curatio-
nem non
admit-
tunt.

In curatione, ubi parter ad generationem necessariæ deperditæ sunt, quia hæ restitui nequeunt, nulla quoque est curatio; interea tamen, qui uno adhuc sano testiculo instructi sunt, atque erectio & genitura iis non deficit, ceterumque sani ac vegeti sunt, sæpe, ut aliquot novi exempla, æque sæcundi ac proliferi existunt, quam qui vel maxime duobus instruantur. Ita e contrariio illi, quibus testiculi abscessu vel scirrhis indissolubilibus corrupti sunt, ut plurimum quoque sunt insanabiles.

XXVIII.

Quædam
vero ad-
mittunt.

Quibus vero erectio deficit, & malum nondum inveteratum est, idque vel mærore diuturno, vel studiis, curis & solitudinibus nimis, victu nimis refrigerante, vel & hujusmodi medicamentis, aut veneris excessu, vel aliis in victus regimine erroribus, immo vel & morbis longis, quibus vires nimis detrita sunt, inductum est, requiritur primo, ut illæ causæ, mæror scilicet, tristitia, studia & curæ nimia vitentur, morbi quibus inducta est, tollantur, atque ab erroribus illis abstinenceatur, alias omnia medicamenta sunt frustranea.

XXIX.

Curatio in
emacia-
tione.

Deinde in nimis emaciatis, & iis, qui vires per nimia studia, mærorem, nimiam venerem aliasve causas exhaurerunt, conducunt bona nutrientia, ut omnis generis juscula roborantia præsertim cum vitello ovi, ova mollia, gelatinæ, frequens usus lactis, cum pauxillo aquæ cinnamomi, vel ipso cinnamomo imprægnati, ipsa cura ac diæta lactea, potus succuladæ bonæ & leniter aromaticæ, ut & nutrit, & simul musculos languidos blandè stimulet vimque erectionis restituat, ex quo fundamento etiam hic laudantur radices orchidis sive satyrii, & electuaria inde cum aliis roborantibus com-

composita, ac præsertim zingibere, rad. pimpinellæ, nunc moschata conditis aliisque similibus cum conf. alkerm. completa; vel & *electuarium diasatyræ*, quod jam dudum hunc in finem a veteribus commendatum fuit, aliis adhuc idoneis remediis pro lubitu roborandum. Vel & *aque medicatæ cum lacte* haustæ. Ubi etiam in passu & aliis horis medicis haustus vini generosi vel simplicis vel gratis aromatibus ac roborantibus exaltati, inter quæ & cortex *cascarillæ* atque *peruvianus* merito pertinent, egregie conducit.

XXX.

Qui vero non emaciati sunt, sed contra *pingues, cachectici* aut *frigidi* temperamenti, & potissimum si nimia *laxitas* sit. In toto corpore ac speciatim in musculis erectoribus peccat, *stimulusque ad erectionem deficit*, his stimulantia spirituosæ, acrida & aromatica ad spiritus ac vires suscitandas maxime conveniunt, quæ specifico nomine *aphrodisiaca* vulgo appellari solent; ad quæ præ ceteris pertinet vinum generosum; piper, sinapi, nux moschata condita, zingiber & rad. pimpinellæ albæ condita. Borax & stincus marinus, sub varia forma assumpta; inprimis vero *sinapi* vel *piperis* ctasso modo contusi ℥ss. aut ʒi. cum haustu vini generosi, hora ante decubitus tempus sumpta, egregie stimulant. Prosumt his præterea *essentia aphrodisiaca Wodelii*, vel *essentia aromatica bona*, *essentia ambre*, immo & *essentia cantharidum* exaltata; vel *spiritus* ita dictus *magnanimitatis*, vel solus, vel cum modo laudatis essentiis mixtus; quin & castus usus ipsius *pulveris cantharidum* in frigidis; ubi erectio vel nulla, vel valde languida, in pulveribus vel electuariis roborantibus, ad gr. ij. iij. & tandem plura, non est omnino rejiciendus. *Vinum generosum martiale* cum aromaticis corticeque *peruviano* compositum & bis vel ter in die ad aliquot uncias haustum, magnæ quoque hic est virtutis.

XXXI.

Externæ musculi penis, scrotum & perinæum *spiritu formicarum*, lumbricorum, lavendulæ, rosmarini, aqua anhaltina, sale volatili oleoso Sylvii roboratis; vel & *unguentis* nervinis oleis destillatis nervinis imprægnatis, aliquoties in die probe sunt fricandi. Immo & *balnea* atque *infectus* ex herbis aromaticis parata; vel & ipsæ *thermæ* aut aquæ *medicatæ martiales* hoc modo usurpatæ multum hic prosunt. *Dieta in macilentis* aut hecicis sit nutrens, scilicet digerenda, lactea, ubi & ostrearum & limacum frequens usus valde commendatur. In *frigide cachecticis* & *obesis* vero sit *magis aromatica & salsa*, quibus & ostrea cum pipere aliisve gratis aromatibus sæpe comestæ optime conveniunt.

Motus frequens corporis & præsertim vestio & equitatio his ægris quoque egregie conducit.

XXXII.

De Articulorum rigore.

Rigoris
caussa.

Quoties junctura ossium alias mobilis *riget*, sive motum amisit, quod vitium Græci *Anchylosin* vocant, motus hic, si fieri adhuc potest, est restituendus. Oritur vero hoc vitium sæpe a *fractis*, *contusis* vel *vulneratis ossibus*, præsertim circa extrema, ubi ad ea rursus glutinanda quiete diuturna articulorum opus est, sub qua vel a liquore articulorum naturali sensum spissescente ac tandem inspissato, motus articuli imminuitur, vel prorsus aboletur; vel a succo osseo, ex ossibus diffractis in juncturam se insinuante extrema ossium plane confervent.

XXXIII.

Curatio.

Si motus difficultas solum ex longiori quiete & humore articulorum, ob motus defectum sensum aliquatenus concreto oritur, *emollientibus* ac *resolventibus fomentis*, *unguentis*, oleis & axungiis animalium calidis junctura rigida ac dura frequenter est scienda, & a medico vel ministro flectendo hinc inde probe commovenda, donec motus sensum sensumque restituatur. Quod si hæc parum sunt, *balnea* quoque, tam artificialia ex emollientibus & dirigentibus, quam naturalia, sive *hermæ*, inter quæ *Wibadenfes*, *Aquisgranenses* & *Caroline* fere eminent, satis diu sunt adhibenda, ita sæpe inspissatus in articulo humor rursus dissolvitur & mobilitas ejus naturalis, si non in totum ac perfecte, tamen magna ex parte restituatur. Sed si ex ossium diffractorum succo, in articulum sensum effuso ibidemque firmiter concreto ossium extrema confervuerint, vel rigor nimis vehemens, aut malum, a quacumque etiam causa ortum, jam valde sit inveteratum, vel & ex *podagra mædosa* productum, ut plerimum insanabile est, vel saltem perquam difficulter & non nisi iisdem modo commendatis remediis curatur, aut solum aliqua tantum ratione emendatur.

XXXIV.

Motus le-
sus a vul-
nere, fra-
ctura.

Si denique motus læso a *vulneribus*, *fracturis*, *luxationibus*, *tumoribus*, *inflammationibus*, aliisque similibus morbis ortum traxit, hæc mala omnia ut in chirurgia nostra docemur, rite sunt curanda; ita his, tanquam causis motus læsi restitutis, motus etiam plerumque redit.

CAPUT XVI.

De ventriculi & intestinorum morbis.

I.

DE variis quidem ventriculi & intestinorum morbis jam hinc inde in antecedentibus egimus, ut de *ventriculi inflammatione* p. 120. de *vomitu simplici* Cap. XIII. §. XI. & *cruento* pag. 134. de *singultu* Cap. XV. §. 17. &c. verum cum quidam adhuc haud levioris momenti, de quibus haecenus nondum egimus, supersint, atque ab actione integra vel laesa ventriculi magna pars & sanitatis & morborum dependeat, operæ pretium erit, ut de præcipuis reliquis hoc in capite etiam adhuc agamus, & quidem primo

II.

De Anorexia sive cibi desiderio ablato.

Anorexia est ille morbus, quando homines cibos non appetunt, vel nullo ejus desiderio afficiuntur; hinc a latinis *cibi desiderium imminutum* aut *ablatum* vel *appetentia cibi laesa*, vulgo *appetitus prostratus*, *imminutus* vel *destructus* appellari solet.

Est vero ea morbus vel *per se existens* sive *essentialis*, a ventriculi actione laesa aut ablata proveniens, & sine aliis morbis oritur; vel cum aliis morbis, iisque quamplurimis, ut symptoma, combinatus. Quando *anorexia per se morbus est*, ut plurimum a *prava dieta*, *nimia voracitate*, & inde natis crudis atque indigestis humoribus in ventriculo hærentibus, coctionemque ciborum impredientibus provenit; qui se sæpe vel ponderis ac pressionis sensu in ventriculo produnt; vel flatibus multis, vel ructibus copiosis, nidorosis, aut amaris, vel pituitosis & acidis, vel nausea & conatu vomendi vel variis horum malis simul, immo vomitu sæpe ipso spontaneo se manifestant. Ita etiam in *senibus*, qui languorem in toto fere corpore perferunt, cibi appetentia, vel ob spirituum defectum, vel ob humores effluos, vel ob vim contractilem & motum ventriculi nimis debilitatum, aut prorsus destructum, sæpe ita decrescit, ut nihil quicquam appetant; unde sensim sentimque vires ita minuantur, ut fere sine alio morbo pereant, præsertim si *vigilia involuntariæ* accedunt, id quod *mors sine morbo* appellari potest.

III.

*Anorexia
sympto-
matica.*

Longe vero sæpius, ut symptoma, in quamplurimis morbis incidit, & nominatim in febribus acutis, inflammationibus gravioribus, *asphmate*, *hydropse*, *hypochondriacis*, & *melancholicis morbis*, *arthritis*, *podagra*, *vomitu*, *dysenteria*, aliisque quamplurimis; ubi vel humores ita corrupti, vel spiritus ita suppressi, sicut in malignis, ut ad cibi desiderium excitandum vel ad ciborum concoctionem perficiendam prorsus inepti sint; vel natura forte alibi in morbo aliquo gravi sapendo & expellendo ita occupata est, ut omnes suas vires illuc dirigat, easque interea ventriculo, donec hostem superavit, subtrahat. Hac *anorexia symptomatica* ut plurimum non curatur, nisi morbo primario prius subacto ac superato; attamen hoc victo, cibi desiderium sponte plerumque redire solet. Igitur de *anorexia idiopathica* sive *essentiali* curanda præcipue hic acturus sum.

IV.

*Cura
1. per e-
vacuan-
tia.*

Quando igitur ventriculus creditatibus replètur, atque materia turget, sive *conatus vomendi* adest, non raro unico medicamento vomitorio hic morbus tollitur; vel solum aliquod remedium stomachicum ad malum penitus profligandum illi subjungendum. Si vero ejusmodi conatus abest, primo ad humores illos crudos incidendos & digerendos *salia amara*, ut vel *salia plantarum amararum*, *tartarus vitriolatus*, *arcantum duplicatum*, *sal digestivum Sylvii*, aut similia in forma pulveris per unum alterumve diem aliquoties in die a \mathfrak{zj} . ad \mathfrak{zss} . exhibenda; vel sub forma fluida, liq. terræ foliatæ tartari, ad guttas LX. & plures; hisque postea *idoneum purgans*, vel ex *pilulis amaris*, vel ex *sale amaro* anglicano aut bohemico aliove simili superaddendum.

V.

*2. per ro-
borantia.*

Ventriculo atque intestinis expurgatis, *essentia* vel *elixirum amara & aromatica stomachica*, ad tonum ventriculi roborandum ejusque vim contractilem restituendam; aliquoties in die ad guttas 30. 60. & plures agro exhiberi, hisque pulveres stomachici, ut *traga aromatica August. pulv. stomach. Birckmanni*, spec. pro *morfulis Imperat.* vel species *diagalangæ*, *diacynamomi*, vel de tribus *piperibus* ad \mathfrak{zj} . pro dosi, vel per se, vel cum vehiculo vinoso interponi debent. *Calamus aromaticus* conditus, itemque *Zingiber* conditum, *essentia piperis*, itemque *essentia piperis hispanici* sive capsici, vel & *elixirum vitrioli Nynicki*, aliave similia, præsertim ubi alcali vel biliosum peccat, ad cibi desiderium excitandum, ut & *infusa radicum & herbarum aromaticarum* & *agomaticarum cum vino*, sub specie vini absinthitis parata, egregie quoque hic valent, præsertim si jus

vinis

vini generosi usus in pastu accedat, vel & post pastum haustulus cuiusdam aquae spirituosae stomachicae, quae vulgo aqua vitae vocari solent, subjungatur.

VI.

Ubi cruditates acidae in ventriculo peccant, medicamenta acidum absorbentia, ut conchae preparatae, lapides cancerum, mater perlarum aut corallia preparata per aliquot dies sunt exhibenda, & postea idoneo purgante, vel ex pilulis aloeticis aut amaris aliis, vel ex rhubarbaro, vel ex sale amaro cathartico e corpore eliminantur. Utrique scopo & acidum absorbendi & evacuandi, magnesia etiam valde apta est, si per aliquot dies mane iusta copia usurpatur. Cruditatibus evacuatis, ad tonum relaxatum instaurantur remedia amara & aromatica, praecedenti numero V. commendata, prodesse apte possunt; verum remedia quoque martialia & cumprimis tinctura vitrioli martis Ludovici, vel tinctura martis cydoniata, aliquoties in die usurpata, vel & croci martis cumprimis aperitivus Stahliani, aut limatura martis subtilissime trita, cum elzosaetharo cinnamom. data egregie etiam hic benefaciunt. Usus legitimus aquarum medicatarum martialium utrique scopo & evacuandi & roborandi saepe quam optime etiam satisfacit, praesertim si motus frequens corporis accedat: quibus plerumque ciborum desiderium quam valentissime excitari videmus, non neglecto haustu vini generosi in pastu, vel aqua vitae cuiusdam ante vel post pastum. Vitandus hic est fumus tabaci praesertim copiosus, usus spiritus vini nimis frequens & copiosus, praesertim matutinus; diæta itidem inordinata, alimenta dura ac difficulter digerenda, pingua, flatulenta, studia & lucubrationes nimiae quoque vitanda.

VII.

De Nausea.

Nausea est ille morbus, quo aëgris non solum nullum est desiderium cibi, sed potius fastidium eius: quare idem fere quid est morbus ac praecedens, atque ex iisdem etiam causis oriri videtur, attamen gradu illum superat. Est quoque morbus vel per se, vel symptoma multorum aliorum morborum, atque in curatione quoque parum a praecedenti differt.

VIII.

Quando per se morbum constituit, studendum, ut vitiati humores e ventriculo ejiciantur; id quod, praesertim si conatus vomendi simul adest, vomitu excitato, si nihil vetat, optime ac brevissima via fieri solet. Sed si quid vomitum impedit, similia purgantia adhibenda, qualia §. IV. & VI. commenda-

Jargiter imprægnato & sæpius comello; præterea usu lactis & lacticinorum; præsertim pultium: ex farina & lacte, oryza, milio, hordeo, sagopyro, fabis, pis, lentibus, amygdalis aliisque similibus farinosis & oleosis cum jusculis pinguibus vel lacte paratis. Ita & *succulade* cum lacte confectæ potus frequens, additis farinosis & saccharatis, ut pane triticeo cum saccharo cocto, hic multum valet.

His denique, si parum sint, *opiata* addenda & speciatim theriacæ ʒj. vel altera singulo vesperi assumpta, egregie etiam huic malo mederi solent.

XII.

Quando ab humoribus acribus oritur, præter pingua, oleosa & opiata, speciatim hic prodest *largus usus absorbentium*, terreorum, & sigillatim, si *acidum* peccat, egregium remedium hic est *oleum tartari* per deliquium, a guttis XXX. ad LX. aliquoties in die vehiculo aqueo aut jusculo assumptum, *tinctura tartari* aliave similia alcalica, & præsertim etiam *limatura martis* larga satis copia sæpius assumpta. In nonnullis *spiritus vini potus*, cum primis matutinus, famem nimiam egregie temperat, ita ut sæpe iam multis anorexiam induxerit. *Fumus tabaci* frequens ad famem imminuendam multum quoque facit. Ubi vero *os dextrum ventriculi nimis amplum*, ut cibos retinere nequeat, malum ut plurimum est insanabile.

Si ab humoribus acribus.

XIII.

De Siti nimia.

Fami nimie mox subjungemus *sitim nimiam*, quæ quandoque etiam per se morbum constituit, nunc & plerumque est comes aliorum morborum. Quando est morbus per se, vel ab *acribus alcalicis*, vel *salis* aut *biliosis* cruditatibus in primis viis, aut ab iisdem in saliva & sanguine existentibus, oritur, qui status *intemperies biliosa sive calida* appellari solet, atque ægri calorem & siccitatem p. n. sentire solent; vel & ab humoribus nimis spissis iisque forte simul salis, ut in ore & œsophago pro his humectandis satis discerni nequeant, provenit.

Sitis nimia causa.

XIV.

Sive autem ab humoribus alcalicis & salis tenuibus, siue simul viscidis sitis nimia oriatur, conducit primo *potus sufficiens aqueus*, nitro præsertim, vel succo citri vel tinctura florum bellidis, aliisque similis, aut spiritu quodam acido imprægnatus & sufficienti copia sacchari gratior redditus, ex quibus variz potus species facile parari possunt. Ita & ex aquæ lb. ij. aceti vini vel destillati ʒj. vel ij. cum

Curatio.

cum saccharo ad gratiam addito aptus potus fieri potest, itemque si loco aceti, cremor tartari vel nitrum sumitur, & pro sitis ratione satis bibitur. Aliquando virginem nobilem usu feri lactis copiosi, mane & vespere, cum cremore tartari, herbæ acetosæ & acetosellæ parati, a molestissima siti, ardore & siccitate faucium inveterata liberavi. Si a febribus acutis, aut inflammatoriis, vel & tertianis vehemens sitis ægrum affligat, potus modo laudati aciduli & nitrosi larga satis copia sæpiusque hausti, itemque gelatinæ & julepi aciduli optime profunt; qui fere etiam in aliis morbis quibuscunque hinc scopo optime conveniunt.

XV.

De Apepsia, & Dyspepsia.

Quid sint
eorum ve-
ra causæ.

Apepsia & *Dyspepsia* sunt morbi ubi quidem ciborum desiderium non deficit, verum cibi vix, vel parum, vel difficulter admodum in ventriculo digeruntur, unde doloris & ponderis sensus cum ructibus & flatibus copiosis, ut inde necessario cruditates & humores corrupti in ventriculo generentur, qui aliorum quamplurimum morborum ac symptomatum causa fieri possunt. Oriri solent hæc mala ut plurimum a prava dieta, atque speciatim nimia eihorum, præsertim pinguium & oleosorum *ingluvie*, cum primis si vita sedentaria aut otium nimium accedant; quibus non solum liquor gastricus corrumpitur, ac nimis viscidus redditur, verum & vis elastica ac motus tonicus fibrarum ventriculi vehementer relaxantur ac debilitantur, ita ut hac ratione ventriculus quamplurimorum morborum secunda fiat mater; præsertim ubi studia severa continua & lucubrationes multæ accedant.

XVI.

Ad hos vero morbos curandos, primo corrupti bi humores, *Curatio*. (præmissis præsertim, si opus, per aliquot dies salibus digerentibus) vel vomitu sunt expellendi, vel si quid vomitum prohibeat, purgantibus §. VI. indicatis. Postea, servato moderato victus regimine, vitatisque alimentis difficulter digerendis, omnis generis *stomachica* & *roborantia* (§. V.) ad anorexiam commendata & hic diligentet adhibenda. Motus quoque institatur frequens, ambulando, vehendo & equitando, abstinendumque a nimia quiete, nimisque studiis & cumprimis lucubrationibus, aut mox ante vel post pastum institutis. Usus aquarum medicatarum martialium legitimus cum apta victus ratione in his malis quoque quam efficacissimus est.

XVII.

XVII.

De Ventriculi ardore.

Ardor ventriculi, quem barbari *sodam* quoque appellant, *Quid*, est molesta ardoris cujusdam circa cordis scrobiculum, sive finistrum ventriculi os perceptio, qui ardor inde per œsophagum ad os usque se extendere solet, cum pressionis aut spasmodicæ constrictionis sensu, modo per brevius, modo longius temporis spatium durans, & per intervalla plerumque, modo breviora modo longiora sediens. *Causas* huic malo in nonnullis præbent *cibi pingues*, præsertim vervecinæ, ac speciatim, si mox aut brevi saltem post, potus frigidus & cumprimis cerevisia superingeritur; in aliis ab *assumptis acidis*, vel saltem acefcentibus producitur. In quibusdam ab *aromaticis* aut spirituosis, in aliis denique ab *humoribus biliosis*, ac sigillatim in hominibus cholericis concitatur. Malum hoc in multis admodum leve est, atque plerumque brevi tempore sponte transit, ita ut vix Medicina egeat; in aliis vero longe pertinacius est, & tam sæpe redit, ut ægris fiat quam molestissimum, iique propterea auxilium a Medicis efflagitare cogantur.

XVIII.

Adeoque in curatione ad causam semper probe respiciendum, & si ab acido ipsum induci intelligimus, absorbentia & nominatim lap. Cancror. præp. mater perlarum aut conchæ præparatæ, C. C. præp. Crystall. montan. præp. aliaque similia, admixta quarta vel quinta quasi parte pulveris nucis moschatæ, ad ʒʒ. pro dosi vel per se assumpta, vel ex aquis destillatis, vel theæ aut coffeæ aliove calido vehiculo data, egregie prosunt. Valgus etiam creta vel sola, vel cum nuce moschata mixta, contra hoc malum cum fructu nititur: sed cavendus usus ejus nimis, quia ob vim stypticam ventriculo & intestinis averfatur, interea tamen species diacretæ *Mynsichti* magnum nomen, ob promptum auxilium, quod hic sæpe præstant, adeptæ sunt. Oleum tartari per deliquium ad guttas XX. vel XXV. ex thea, coffeæ vel jusculo aut cerevisia calida sumptum in momento etiam plerumque ardorem illum extinguit, id quod & tinctura tartari & spiritus C. C. vel utraque commixta ut plurimum egregie præstant. Sin a biliosis humoribus ortum ducat, spirit. nitri dulcis a guttis XXX. ad L. ardorem & dolorem tollit, si cum thea vel aqua, præsertim vero, si cum thea vel coffeæ assumitur. Quando a cibis pinguius & hau-

Curatio.

hau-

hauitū frigidū superingesto provenit, *baſtulus ſpiritus vini boni*, vel aquæ ſtomachicæ vinoſæ eum ut plurimū compoſcit. *Vitanda ſimul ſunt cauſa*, quæ eum in quolibet producere ſolent, & *purgantia* ſubinde interpoſita ad humores vitioſos e ventriculo educendos hic quoque multum, cum præſervandi tum curandi ſcopo, proſunt. In *ſanguineis*, quia congeſtio ſanguinis circa ventriculū ſæpe ad ardorem hunc excitandum facit, *miſſio ſanguinis* circa æquinoctia cum moderata victus ratione impulſum ad eum avertendum facit.

XIX.

De Cardialgia.

Cardialgia eſt dolor minus vel magis vehemens circa ſcrobiculum cordis, cum anxietate, naſea & ſæpe conatu vomendi, immo vomitu ipſo combinatus. *Cauſæ* ejus ſunt vel *humores viſioſi* in ventriculo hærentes, ventriculū ſic ſigillatim os ejus ſiniſtrum; quod *cardia* appellari ſolet, vellicantes ac rodentes, tam extra febres intermittentes, quam & ſæpe in eis, quibus ventriculus ad eos ejiciendos, ſequæ ab illis liberandum ad ſpaſmodicas contractions, plus minus violentas, adigitur, unde non ſolum hic dolores, verum & naſea atque hæud raro vomitus valde moleſtus atque anxius concitantur; ſæpius tamen: *cardialgia* quoque eſt ſine vomitu. Vel oritur, etiam *cardialgia* quandoque a *flatibus* atque humoribus noxiis ab alimentis non ſatis concoctis oriundis; vel ſubinde quoque a *vermibus* in ventriculo provenit: vidique ſceminam, quæ ex hac *cardialgia*, quæ vehementiſſima & cum convulſionibus ſtipata erat, brevi periit, in cujus ventriculo magnum lumbricorum acervum & *cardiam* valde intus arroſam inveni. Frequenter etiam a *congeſtionibus ſanguinis circa ventriculū*, in ramis venæ portæ apud ſanguineos, & ſpecialim hypochondriacos atque hyſtericas, producit; ubi ſubinde vomitum cruentum eumque hæud raro periculolum poſt ſe trahit. Quandoque & in *febris acutis* & præſertim malignis ac *ſtomachicis* nobis dictis (vid. ſupra cap. V.) incidit ejuſmodi *cardialgia*, & quidem ſæpius cum vomitu aut ſaltem conatu vomendi moleſtiſſimo, quo natura a pernicioſis humoribus in ventriculo hærentibus ſe liberare ſtudet.

XX.

Curatio. Curatio igitur pro cauſarum diverſitate varia eſt, & modo facilior, modo difficilior, immo quandoque difficultiſſima aut proſus impoſſibilis. Si a *ciborum reliquiis* paullo acrioribus,

ribus, aut non satis bene digestis, indeque oriundis flatibus, oritur, horis præsertim matutinis, & jejuno adhuc ventriculo, sæpe potus calido theæ vel coffeæ solo, vel decocto flor. chamomillæ, aut guttulis aliquot essentiz corticis aurantiorum vel alius ejusdem stomachicæ simul assumptis cedit; vel etiam si aquæ ejusdem stomachicæ spirituosæ, ut anisi, fœniculi, corticis aurantiorum, cinamomi, carminativæ aut vitæ Matthioli cochlear unum vel alterum assumitur. Ita & pulvis corticis aurantiorum ℥i. vel horum chamomillæ, cum paucis croco in vini ℥j. vel ℥ij. calefacti & adjecto pauxillo sacchari assumptus hic valde prodest. (a)

Quando vero nimiam ventriculi repletionem & cum primis alimentis difficulter digerendis, aut pinguibus factam pro causa habet; vel ubi ira pastum vel præcessit, vel mox secuta est, ad hæc e ventriculo per viam brevissima ejicienda, lenè emeticum dari debet, præsertim ubi jam nausea & conatus vomendi adsunt; cui post temporis aliquod intervallum potus frequens ac largus aquæ tepidæ subjungendus, ut acris hæcce noxia non solum hac temperentur, verum & viscida ac tenacia, fluida atque mobilia reddantur, ventriculus melius ea eluatur, atque vomitus hoc ipso commodius promoveatur. Quando autem ager jam vomit, vomitorium, ne nimius vomitus, qui hyperemesis vocatur, hic inducatu, omitto, & solum frequentem ac largum potum aquæ tepidæ, ad ventriculum eo melius purgandum vomitumque ægris facilitandum, assumendum impero; qui adhuc magis promovetur, si folia quædam cardui benedicti in illa aqua tepida per breve tempus macerantur, vel drachma dimidia salis ejusdem digestivi, amaricantis, ut tart. vitriolati arcan. duplic. salis absinthii, aliussve similis, in vomitu præsertim inani, ubi materia vitiosa ob tenacitatem a ventriculo avelli, adeoque expelli nequit, semel iterumve exhibetur. His postea ventriculum roborantia, quæ §. V. & VI. laudavimus, una cum motu frequenti & modica dicta subjungenda.

XXI.

Si vero *cardialgia a congestionibus sanguinis* & inde natis spasticis ac valde dolorificis ventriculi constrictionibus, sicut haud raro in hypochondriacis ac hystericis hominibus fieri solet, ortum habet, Vomitoria, quia sæpe nihil quicquam mali in ventriculo hæret, non conducunt; sed iis potius hi spasmi

*Cursio
vehementioris.*

Q

[a] In ejusmodi *cardialgia utilissimam* impe deprehendi seq. potum-
culam. ℥i. aq. card. bea. vel melissæ liij. aq. vitæ Matthioli ℥j. e-
lmos. macis val cort. aurant. ℥i. D. cochl. j. vel ij. aliquoties dosec-
tæst.

ui ac dolores in ventriculo, jam per se atrocissimi, ita interdum exacerbantur, ut simul motus convulsivos ac tremores horrendos per totum corpus concitent, atque sic cardialgiā omnium vehementissimā, qua ægri haud raro interficiuntur, inducant. Hinc præstat primo *ad sanguinem hic congestum* revocandum & abducendum largam satis ejus copiam *per venas extrahere*, mox vero simul ægro *medicamenta antispasmodica* & cumprimis pulveres antispasmodicos, resolventes ac temperantes, ex tart. vitriol. nitro, cinnabari, lapid. cancrorum citratis aut similibus, vel cum potu aqueo calido, vel cum aqua sceniculi, melissæ, menthæ sæpius porrigere, quibus etiam spir. C.C. cum tinctura tartari remixta, ad guttas L. LX. & ultra subinde aptissime interponitur. His si *enema emolliens & anodynus* intestinis injectum & *visca lacte* vel aqua calida, (in quibus florum chamomillæ manipuli duo incocti sunt) repleta ventriculo calide imposita adiunguntur, sapissime hæc cardialgiæ species optime mitigatur ac tandem tollitur, relicta tamen ut plurimum ingenti virium debilitate, a qua sæpe non nisi longo temporis spatio liberari possunt. *Equitatio* tamen multum hic prodest.

XXII.

Curatio si in febribus vel a vermibus. In cardialgia, quæ in febribus acutis *stomachicis*, Capitis quinti, affligit, cumprimis, si eam nausea comitetur, vel lene *evacuans ex rhabarbato*, aliove blande laxante dandum, vel & ipsa *rad. hypecacoanne* modica dosi exhibenda, hisque deinde remedia temperantia, febribus acutis apta, sunt subjungenda. Quando *cardialgia a vermibus* in ventriculo inducitur, difficulter quidem ea cognoscitur; attamen si vermes hic adesse per signa quædam cognovimus, curatio contra hos potissimum erit instituenda, sicut suo loco mox docebimus.

XXIII.

De Flatuum & Ructuum molestiis.

Flatuum causa 1.

Flatuum & ructuum copia multistatim molesta est, ut medicam opem implorare cogantur. Ut plurimum pro causa agnoscunt *debilem ventriculum* non bene concoquentem, & *& cibos crudos*, ac *flatulentos*, nominatim fabas, pisa, lentesc, brassicam, rapas, raphanos, carnes duras aut pingues, atque in universum *nimiam ventriculi* cibis quibuscumque *repletionem*, quos ventriculus digerere satis nequit, hinc hi in cruditates ac pituitam, hæc vero in flatu degenerant, præsertim dum tonus ventriculi & intestinorum illa pituita ita debilitatur, ut aer vi sua elastica majus spatium affectet, atque

que sic sæpe non sine magno incomodo per os superius & inferius prorumpat; vel, si prorumpere non possit, *agris magnas anxietates*, spirandi difficultatem, aliaque mala inducat.

XXIV.

Altera flatuum causa sunt *congestionibus sanguinis in vasis causa* & *venae portae* & praesertim ventriculi atque intestinorum; in sanguineis, hypochondriacis atque hystericis, quibus intestina, dum sanguis venae portae hepat commodè transire nequit, ad motus spasticos irritantur, a spasmis tandem diuturnis debilitantur, tonus eorum relaxatur, ita ut aer contentus vim suam elasticam exerceat, ventriculum & intestina valde distendat, diaphragma & pulmones urgeat, unde si ob causam quamcumque expelli nequeant, *angustiae atque anxietates praecordiorum*, *spiritus difficilis*, *dolores colici*, *cardialgia*; & per consensum ventriculi cum capite, *dolores capitis*, *vertigo*, *vigilia*, aliaque mala inducuntur.

XXV.

In curatione autem *hae duae flatuum causae ac species pro-Curatio* be a se invicem distinguende, quia ut plurimum id, quod in *prima* hac prodest, in altera nocet. Igitur in specie §. XXIII. *que a cruditatibus ventriculi oritur*, evacuatio primarum viarum per idonea purgantia §. IV. & VI. praer omnibus requiritur; sordibus vero evacuatis, *stomachica roborantia*, aromatica, amara & carminativa §. V. exhibenda, in forma guttarum, pulveris vel infusi, praesertim vinosi. Speciatim vero hices-*sentia carminativa Wedelii*, spiritus nitri dulcis, spiritus carminat. de tribus sem. anisi fœniculi, carvi, saccharo obducta, pulv. flaved. cortic. aurant. cum vino calido, vel & post passum aquae spirituosae anisi, carvi, fœniculi, corticis aurantiorum, menthae, vel vitæ Matthioli cochlear. j. vel ij. deglutiri cum fructu possunt. Si praeterea *modicam servant dietam*, flatulentos, & nimios cibos, una cum *vita sedentaria* vitant, & contra corpus *sæpe exercent*, a flatuum incommodis liberantur, seque etiam eodem regimine ab illis quam efficacissime praeservare poterunt.

XXVI.

Quod si vero a *congestionibus sanguinis in vasis venae portae* Curatio in §. 24. & inde nata laxitate ventriculi atque intestinorum flatuum incommoda *oriantur*, quam molestiam hodie *flatulentiam hypochondriacam* appellare solent; & vel consuetæ sanguinis evacuationes naturales suppressæ vel artificiales neglectæ fuerint, illæ, si fieri potest, restituendæ; vel sanguinis missio instituenda: atque si *alvus obstructa*, *clystere* emolliente, vel blando laxante est aperienda, postea medicamenta antispasmodica, in *cardialgia* §. XXI. commendata, diligenter usurpanda. Quæ si parum sunt, ad *manusialia remedia* se-

cura, tam ad fluxus suppressos restituendos, quam ad tonum intestinorum ac ventriculi instantandum, tanquam ad sacram anchoram, est confugiendum: inter quæ primaria sunt *infusura vitrioli martis Ludovici*, tinctura martis helleb. Wedel., præcipue vero *limatura Martis subtilissime trita*, ad gr. VI. VIII. X. vel cum elæosacch. cinam. vel cum extract. plantarum amararum sumpta, vel & crocus martis antimon. Stahlî cum pulveribus stontachicis, aromaticis vel elæosaccharo diu satis usurpata; vel & *aque martiales medicatae*, cum victu conveniente & frequentis corporis motu, quæ in utroque casu fere præstantissimæ, sunt usurpandæ.

XXVII.

De Colico dolore.

Quid colicus dolor.

Post cardialgiam & flatos nunc etiam de *colico dolore* speciatim adhuc acturus sum, qui est dolor plus minus vehemens, partim in ventriculo, partim in intestinis, atque interdum adeo atrox, ut ægri non solum vehementer clamare cogantur, sed & sicut in cardialgia §. XXI. diximus, motibus convulsivis subinde corripiantur, ac doloris atrocitatem vix perferre valeant, atque iis ipsis quam vehementissime intra breve tempus ita sæpe debilitentur, ut se vix commovere aut erigere valeant, atque diurnus languor iis inde inducitur, qui paralyfin quandoque post se trahit, & ejusmodi vehemens dolor a Riverio, Sydenhamo, aliisque colica Pictonum appellari solet. Quoniam vero sæpe *males sedes est in intestino colo*, doloris colici vel colicæ nomen obtinuit.

XXVIII.

Ejus causæ.

Causæ ejus sunt 1. *cruditates pituitosæ una cum flatibus a prava diætâ*, sicut de his modo diximus, ortæ. 2. *humores biliosi acres*, in cholericis, vel iis, qui ira vehementer perciti fuerunt, geniti. 3. *congestionès sanguinis in plethoricis, hypochondriacis & iis, qui hæmorrhoidalibus morbis obnoxii* sunt, atque ille sanguis per venam portæ commode transire, vel per hæmorrhoides exitum sibi facere nequit, unde hæc colica hæmorrhoidalis vocari solet, hincque spasmi & dolores illi concitantur. 4. *inflammatio ventriculi & intestinorum* dolores quoque colicos atrocissimos in abdomine producere solet. Occasionem sæpe his doloribus præbet *potus frigidus*, corpore præteritum calente assumptus; incessus per pavimenta frigida, lapidea ac humida, *pedibus nudis*, fructus boræi frigidi copiosius comesti, *sanguinis excretionès consuetæ suppressæ*.

ſæ, vel non rite ſuccedentes; hinc ſæminæ menſibus inſtan-
tibus vel ſuppreſſis, vel non rite fluentibus, ſæpe dolores co-
licos modo leviores modo atrociores perſentire ſolent.

XXIX.

In curatione igitur ad cauſarum diverſitatem probe eſt re-
ſpiciendum: ſi enim a *cruditatibus* §. 28. ex *diætæ erroribus*
natis, aut bilioſis vitiatis humoribus orta eſt, atque alvus
obſtructa, *clyſma* ex ſpeciebus emollientibus & carminativis,
addito ol. chamomillæ, nitro & melle *injiciendum*, quo ipſo
ſæpiſſime præſentaneum animadvertitur auxilium; poſtea vel
etiam ubi æger clyſma admittere nolit, *purgans ex rhabar-*
baro, vel *ſale amaro* cathartico, ad noxios illos humores e-
liminandos, dari debet. *Quando autem ægri bi vomitu ſimul*,
ut ſæpe fit, laborant, ut, quicquid detur vel aſſumant, ſur-
ſum rurfus ejiciant, *clyſmata* tunc ſunt *iteranda*, & natura in
expellendis humoribus vitioſis potu frequenti aquæ tepidæ,
vel infuſi foliorum cardui benediſti, aut *ſtorum chamomillæ*
eſt juvanda, quod ultimum ſimul egregium anodynũ eſt.
Opiata vero, præſertim in principio, ſunt vitanda; *sacculi*
contra *pæregorici* ex floribus chamomillæ & ſemin. 4. carmi-
nat. vel *veſtea aqua* vel *lacte calido* repleta, in quibus ſor-
res chamomillæ vel matricariæ cocti ſunt, ventri calide ſunt
imponendi. Interne poſtquam prægreſſo purgante, vel vomitu
ſpontaneo primæ viæ purgatæ ſunt, *aque carminative* &
ſpiritus ejusdem naturæ §. 25. indicati, ſæpius, donec dolo-
res remittant, ſunt porrigendi, ubi etiam ſequens mixtura
valde utilis eſt.

24. aqu. ſæniculi

chamomil. ʒ ʒ iij.

eſſent. cort. aurant.

ſpirit. nitri dulcis ʒ j.

ſirup. cort. aurant. ʒʒ. M.

de qua detur, quavis hora, & dolore paululum remittente,
quovis bihorio cochl. j. vel ij. *ſpiritus ſalis ammoniaci ani-*
ſati, vel *eſſentia millefolii* cum eſſentia alexipharmaca ad gut-
tas L. vel LX. data, hic etiam ſæpe egregie proſunt: ita
infuſum quoque *ſtorum chamomillæ* & *millefolii* loco theæ ſæ-
pius hauſtum in doloribus hiſce leniendis valentiſſimum eſt.
Corpus ſimul a frigore, quia pernicioſiſſimum hic eſt, ſemper
probe defendatur.

XXX.

Quando dolores colici ab humoribus bilioſis concitati ſunt, *Curatio*
ut plurimum perquam atroces eſſe ſolent: quo igitur in ca-
ſu, præter remedia *evacuantia*, præſertim ex *rhabarbato pa-*
rata, & *clyſmata* ſæpius injecta, *vena ſecanda*, ac *pulvis*
antiſpaſmodicus ex aquis aut infuſis modo §. 29. laudatis,

Q 3

cum

cum fructu sæpius exhibetur, atque spiritus etiam *niri dulcis*, spiritus *anticolicus de tribus*, aut liquor anodynus mineralis Fr. Hoffmanni subinde dati, hic egregie benefaciunt. *Oleum amygdalarum dulcium* recens fibras valde irritatas ac spasmis contractas potenter quoque demulcet, si ad ℥j. vel ℥ij. cum vehiculo calido aliquoties per intervalla datur.

XXXI.

*Ejus, quæ
a congestio-
nibus.*

Sed si a congestionibus sanguinis oritur, & vel mensium vel hæmorrhoidum negotium turbatum est, studendum ut hoc suis remediis in ordinem redigatur. Qua de re videatur Cap. IX. Ut vero interea, dum restitutio illorum fluxuum, (nisi forte insent) non tam facilis est, ægris dolores leniantur, atque malum tolerabilius reddatur, opiata atque narcotica ad hos dolores tollendos hic minime adhibenda; quia hæc obstructions illorum fluxuum adhuc peiores ac pertinaciores reddunt, atque ægros vel in gravissimos alios morbos, vel in ipsum vitæ periculum conjiciunt; neque carminativa calidiora, ut spiritus vini, aquæ carminativæ inde paratæ, essentia calidiores, olea destillata carminativa aut aromatica, danda sunt; quia stimulante & calefaciente virtute dolores manifesto augent, atque intestinis inflammationes facile inducunt; verum potius *vena sectio* est instituenda, *clysmata* §. 29. sunt injicienda, & *pulveres antispasmodici* vel per se, vel in potiunculis sæpius sunt ingerendi, atque externe ea quoque quæ §. 29. commendavimus, ventri applicanda. *Preservandi gratia* iis, qui sæpius jam his malis conflictati fuerunt, sanguinis distractiones postea bis vel sæpius in anno sunt instituendæ, sæpe *equitandum*, & ut menses vel hæmorrhoides rite succedant, studendum.

XXXII.

*Curatio
inflam-
mationis.*

Colicus dolor, qui ab inflammatione ventriculi aut intestinorum inducitur, & ex ardoris sensu in abdomine, calore p. n. pulsu febrili celeri, & siti cognosci solet, longe peior est illo, qui a simplici congestione ortum trahit, atque omnium fere atrocissimus atque periculosissimus, minusque adhuc opiata aut carminativa calidiora fert; sed potius requirit *vena sectionem largam*, ut pleræque graviores inflammationes internæ, eamque haud raro semel iterumque repetitam; quia viscera affecta, hac omissa, facile alias in gangrænam & sphacelum mortiferum abeunt; & deinde eadem remedia, quæ pag. 120. ad inflammationes internas curandas proposuimus, sunt adhibenda.

Olei amygdalarum dulcium vel *olei lini* usus (§. 30.) ad dolores huius atrocissimos leniendos ab ℥j. ad ℥ij. subinde exhibitorum, quamplurimis etiam quam maxime prodest. Miroc
hanc

hanc speciem satis frequentem a multis auctoribus Medicis
silenzio prorsus esse prætermittam.

XXXIII.

De Vermibus sive Lumbricis.

Vermes sive lumbrici ventriculi quoque & intestinorum morbum peculiarem faciunt, quo sæpe gravissima inducuntur symptomata, dolores scilicet ac rosiones ventriculi atque intestinorum atroces, convulsiones, epilepsia, atrophia, & haud raro mors: atque frequentius in infantibus ac pueris observantur, quam in adultis, quamvis & in his sæpe negotium facessunt,

*Vermium
sympto-
mata.*

XXXIV.

Eos adesse dijudicamus ex frequenti dolore rodente & pun-
gente in abdomine, ægri plerumque pallidum aut livescen-
tem faciei habent colorem, (quamvis & hic in quibusdam
sit sanis simillimus) infantes in somno sæpe terrentur atque
expavescunt, plerumque sunt voraces & pane delectantur,
spiritus male olet atque peculiarem prorsus eumque adver-
sissimum obtinet fœtorem; adest sæpe nausea, quasi vomend-
um ipsis esset, atque os multo phlegmate subinde repletur;
haud raro vertigine etiam afficiuntur, atque in naribus di-
gitis sæpe scalpunt: venter in infantibus plerumque tumidus
est, & per alvum multum pituitæ tenacis albicantis inter-
dum rejiciunt; quidam epilepsia, alii febricula, quam *ver-
minosam* appellant, corripiuntur; certissime vero omnium,
quando homines ægri vermes vel per os, vel per alvum se-
mel aut sæpius jam rejecerunt, eorum præsentia dignosci-
tur.

*Signa
verminum*

XXXV.

Tres precipue dantur eorum species: quarum prima illa
est, quæ lumbricorum terrestrium similitudinem obtinet, &
quæ hinc proprie *lumbrici*, vel & *vermes teretes* appellan-
tur: alteram *vermes plani* sive *lati*, qui ex multis quasi
juncturis sive partibus planis constant, seminibus cucurbitæ
aliquo modo similibus, constituunt, quos propterea *lumbrici
lati* sive *planos* itemque *cucurbitinos* appellant, atque
decem & plurimum ulnarum quandoque longitudinem habent;
(*) tertia species *vermiculis in caseo obviis* haud absimilis
est,

*Vermium
Species.*

Q 4

(*) Vid. *Spigelius* de lumbrico lato, *Andry* de la Generation des
Vers, & *Cleyeri* Hist. Lumbricorum, ubi eorum figuræ & longitudo vi-
deri possunt.

est, & ut plurimum tantum in intestino recto deprehenditur, ubi ægris molestissimum pruritus ac tenesmus sæpe concitare solent. Interdum & *aliæ adhuc insectorum aut vermium species* in corpore humano observatæ sunt, quæ per os & anum excretæ fuerunt; quos vero Medici ad peculiaria vermium genera, qui usum forte nullum præstant, nondum, quod sciam, retulerunt, sed tantum ut insolita & rara insecta corporis nostri annotarunt. Ita & nos *de modo*, quo *generentur*, & qua ratione in corpus humanum perveniant, non hic disputabimus; sed potius modum, quo interficiendi atque ex eo ejiciendi sint, in usum ægrorum iis afflictorum, considerabimus.

XXXVI.

Curatio Utrumque præstant primo omnis generis *amara*, vermibus
1. *per a.* plerumque adversa: ut *absinthium* & cumprimis ejus atque
mata. *centaurii minoris* summitates, præterea herba *scordii* & flores *tanacetii*, iteinque semen *cine* five *santonicum*; *cortex peruvianus* & *cascarilla*, quæ cerevisiæ aut vino, præsertim malvatico vel canariensi infundi, & aliquoties in die aliquot cochlearia, vel ab adultis aliquot haustuli sumidebent. Eodem modo & radic. *filicis* & *filipendule* cum successu usurpari possunt. *Aloe*, *myrrha*, semen *cine* & *corallina* valentissima quoque adversus omnis generis vermes corporis humani sunt remedia, quæ vel in pulvere ex aqua graminis, fumarizæ, scordii vel absinthii, vel si ægri pulveres averfantur, cum melle in forma boli aut electuarii bis vel ter in die sumenda. *Succus nasturt. aquat.* rec. matutino tempore per aliquot dies, larga satis copia sumptus, vermibus quibuscumque & speciatim *planis* maxime adversatur.

XXXVII.

2. Per Præterea *martialia* & sigillatim *limatura martis* lumbricos
m. martialia & ascarides exturbant, si larga satis copia ægris per aliquod
& acida. tempus exhibentur. Ipsæ etiam *aquæ martiales*, & speciatim Pyrmontanæ, vermes quoscumque expellere solent. *Acida* quoque *remedia*, ut spiritus vitrioli, vel sulphuris, Elixir. vitrioli Mynsichti, Elixir. propriet. Paracelsi & similia vermibus etiam valde sunt inimica, si per aliquod tempus apta quantitas ægris ex aquis laudatis exhibeantur: immo & ipsum *vinum* matum ægrishis, tam adultis, quam pueris, in passu datum, vel etiam cum laudatis vegetabilibus infusum, & horis medicis haustum ad vermes destruendos conducit.

XXXVIII.

3. Per Denique & remedia ex *hydrargyro* parata vermibus sunt
mercurium. insensissima, & cumprimis commode adhiberi potest, postquam

quam uncia dimidia vel integra in aquæ graminis, abſinthii, ſuntariæ, aut ſcordii, vel etiam vulgaris, libra una, in vaſe vitreato per horam quaſi dimidiam coquitur; agitando interea ſæpius hoc hydrargyrum bacillo ligneo, quæ aqua poſtea in vitro ſervanda; & infanti vel puero aliquoties in die cochleare unum, adultis vero duo vel tria danda, quod decoctum adhuc valentiùs redditur, ſi ei ſirupi de cichor. cum thabarb. ʒj. vel ij. adduntur. Eandem etiam virtutem obtinet *hydrargyrum*, ſi eadem ratione bis vel ter in die cum lacte decoquitur, atque infantibus ac pueris, qui lacte delectantur, mane a meridie & circa vesp̄eram, adjecto pauxillo ſacchari, aliquot unciaſ calide devorandæ exhibeantur. Præterea ſupra jam Cap. XIV. monui, me *eleſuario* ex cortice peruviano; *mercurio vivo*, conſerva quadam & ſirupo parato, puellam a vermibus & epileſia ſatis jam inveterata, & ubi multa fruſtra priùs adhibita fuerunt, liberaviſſe. Denique & *æthiops mineralis* ad aliquot grana ſæpe datus, & qui hoc adhuc præſtat, *mercurius dulcis* præſantiſſima ſunt anthelmintica, cujus ultimi granulum dimidium vel unicum infantibus, adultis vero granum unum vel duo, cum pulveribus ſupra laudatis, vel etiam cum extractis amaris in forma pilulæ unius vel plurium, bis in die dari commode poſſunt; atque ſic ſæpe fit, ut ab omnibus illis laudatis remediis vermes & retetes & lati non ſolum interficiantur, verum etiam quandoque integri vel deſtructi expellantur: ad quod igitur in uſu horum attendere debent ægri adulti; in infantibus vero & pueris eorum parentes vel ancillæ.

XXXIX.

Si vero nulli vermes ab his remediis expelli obſervantur, ^{4 Per purgans.} opus eſt, ut tertio vel quarto quovis die purgans quoddam illis interponatur: pro quo aurem talia eligenda ſunt purgantia, quæ ſimul vermibus ſunt adverſa. Huic igitur ſcopo *mercurius dulcis cum aloë*, vel *ſcammonio* aut *diagrydio*, aut *reſina jalapæ*, aut *trochiſcis albandali*, vel in pulveris vel pilularum forma, aptiſſimus eſt, obſervando; ut cuilibet ægro, pro ætatis & virium ratione, apta horum quantitas exhibeatur. Ita etiam aliquoties obſervavi; quod, dum ægris, tam pueris, quam adultis, de quibus, an vermibus laborent, ignoraveram, ob alias cauſas & morbos pilulas ex mercurio dolci, reſina jalapæ & extracto panchymagog. Crolli paratas, per aliquot dies continuos exhibuerim, magna copia lumbricorum, inſano integri eorum hidi expulſi & reſecti fuerint.

5. Per remedia interna.

Externa quædam remedia quoque his in malis non prorsus rejicienda sunt, præsertim quia infantes & pueri occurrunt, qui nulla remedia interna assumere volunt. Huicigitur icopo inserviunt fel bubulum, quod ventri bis terve in die calide probe inungendum, vel hujus loco oleum colocynthid. vel unguent. de arthanita sive de cyclamine, vel ol. absinth. coct. cum ol. destillat. absinthii & tanaceti roboratum, vel & succus recens radicis cyclaminis, qui a veteribus valde hic commendatur: quibus interne decoctum mercurii cum lacte commode addi potest, quia hoc non ut medicamentum, sed ut alimentum assumunt.

XLI.

De Ascaridibus.

Ascaridum causa.

Si ascarides in intestino recto nidulantur, id quod ex molestissimo pruritu circa anum & in intestino recto, ut & ex tenesmo sive frequenti desidendi stimulo, quam maxime vero ex observatis & visis ejusmodi bestiis, vermiculis in caseo generatis similibus, in ægrorum excrementis dignoscitur, ad eas interficiendas & expellendas conducunt primo laudata martialia §. 37. & purgantia mercurialia §. 39. ac deinde clysmata injecta ex anthelminthicis, ut decocto ex herb. absinth. sem. cinz, myrrhæ, & hydrargyro in aqua parato, cui olei absinthii cocti vel alterius olei ʒiſſ. vel ʒij. addi & in anum tepide injici potest. Vel & clyster ex solo oleo olivarum vel lini, vel amygdalarum, aliove simili paratus aliquoties injiciendus, qui omnes ascarides interficit, dum nulla ejusmodi infecta olea perferre aut in iis vivere possunt, sed ab iis cito interficiuntur.

XLII.

De Tenesmo.

Tenesmus quid & causa.

Tenesmus est molestus ac sæpe dolorificus desidendi stimulus in intestino recto, quo tamen parum vel nihil per anum excernitur. Excitatur sæpe ab ascaridibus in hoc intestino habitantibus; vel ab acri urina in dysuria aut stranguria, vesicam & intestinum rectum, ob arctum nexum vehementer stimulante; vel & a calcula in vesica; vel ab acrimateria quæ in dysenteria intestinum rectum irritat ac rodit, & denique in hæmorrhoidum negotio, quando sanguis noxius vel abundans in hoc intestino congeritur, vasa ibidem valde distendit atque exitum ibi molitur, quo, præter dolorem, tenesmus sæpe inducitur molestissimus.

XLIII.

XLIII.

Quando *tenesmus ab ascaridibus* oritur, tunc sublati & e- *Ejus cu-*
 necatis iis, ut §. 40. docuimus, & hic tollitur. *Si ab acri* *ratio.*
urina, hujus acrimonia, ut Cap. XII. §. 19. dictum, est
 temperanda. *Si a calculo in vesica*, non curatur nisi hoc ab-
 lato; mitigatur tamen externe clysmatibus emollientibus &
 lenientibus cum lacte paratis, vel supposito ex butyro
 non salito, in anum sæpius demisso. Interne simul ea sunt
 exhibenda quæ ad calculi vesicæ dolores mitigandos supra
 pag. 125. commendavimus. *Si ab hæmorrhoidibus cecis* vel
instantibus, eadem enemata & suppositoria, quæ modo lau-
 davimus, conveniunt, vel & oleum amygdalarum dulc. aut
 liliorum alborum, aut verbasci, vel unguentum de liparia
 aut nutritum, quæ dolentibus partibus illinenda; vel *forsus*
emolliens & leniens ex foliis hyoscyami vel flor. verbasci
 cum lacte coctus ano imponendus. *Si in dysenteria* incidat,
 calor eum optime lenit; hinc quoties alvus exoneranda, aut
 tenesmus urget, *vas aqua calida* impletum iis supponatur;
 vel *clyσμα emolliens* cum lacte paratum, adjecto oleo oliva-
 rum, lini, papaveris albi, verbasci, hyperici vel liliorum
 alborum cum vel sine theriaca, subinde applicetur; vel &
 splenium decocto herbæ hyoscyami vel altheæ, aut florum
 verbasci & chamomillæ cum lacte imbutum, ano superim-
 ponatur, & pro doloris modo sæpius reiteretur.

CAPUT XVII.

De Morbis sexus fæminini præcipuis.

I.

Sunt, præter morbos hætenus propositos, sexui utrique *Morbi hi*
 plerumque communes, quidam adhuc *morbi sexui fæmi-* *quotupli-*
nino, & quidem 1. virginibus, aut fæminis non gravidis; *ces.*
 vel 2. gravidis; vel 3. parturientibus; vel denique 4. puer-
 peris *propriis*: quorum quidem nonnullos jam supra variis in
 locis exposuimus; verum sunt adhuc quidam mulierum mor-
 bi, de quibus hætenus nondum egimus, & qui seorsim ad-
 huc hic considerari merentur.

II.

In virginibus, viduis, & mulieribus non gravidis sæpe *Menstrua-*
menstrua deficiunt, aut *obstruuntur*, sive *supprimuntur*, vel *rum vitia.*
 non satis, & tunc sæpe cum dolore excernuntur, vel non
 debito tempore & tardius veniunt; vel *nimum fluunt*, aut
 etiam justo citius redeunt; unde omnis generis mala, eaque
 sæpe

sæpe gravia symptomata oriuntur : quæ si *ab obstructione* aut non satis largo ipsorum fluxu proveniant, ut capite IX. p. 101. docuimus, emmenagogis, venæ sectione in pedē, pediluviis, balneis, fricationibus pedum frequentibus, ac motu, &c. curanda; *sin vero nimis fluunt*, fluxus temperantibus aliisque idoneis remediis est moderandus; quemadmodum hæc de se capite VIII. pag. 97. jam actum est: sicut & de *hystrico malo* p. 120. de *chlorosi* pag. 137. & *fluore albo* pag. 157.

III.

De Sterilitate mulierum.

*Sterilitas
vis fœmi-
narum
causæ.*

Sterilitas fœminarum, quandoque non harum, sed virorum subinde culpa contingit, quando ejusmodi vitia in his observantur, de quibus supra, Cap. XV. §. 26. diximus; sed si talia absunt, ut plurimum causa est in mulieribus, & *depende vel a mensibus*, ob causam quamcumque non rite succedentibus; vel ab iisdem *nimium* & perpetuo fere *fluentibus*; vel a *cachexia*, *fluore albo*, aliave corporis aut uteri prava constitutione; vel a *vaginae vitio*, quando hæc vel nimis arcta, aut concreta, vel tumore, membrana morbosa, aliave malo obstita vel clausa est. Potest etiam oriri ex *ore uteri interno coalito*, aut *tubarum Fallopii*, vel *ovariorum vitio*, aliave uteri malo interno, atque in sensus non incurrente; quæ propterea ut plurimum nec cognosci, nec curari queunt.

IV.

*Curatio
ejus.*

In curatione igitur ad causas probe respiciendum: nam si a *mensium anomalis*, hi secundum methodum Cap. VIII. & IX. propositam, in ordinem sunt redigendi; *sin a fluore albo* aliave malo corporis habitu, hæc vitia sunt curanda, ut Cap. VIII. proposuimus: ubi imprimis pilularum Bacherian. diuturnus usus, una cum decocto ligni sassafras aut guajaci, cum ess. succini ac scordii, vel & *aque minerales* ac *therme*, interne & externe adhibitz, multum sæpe præstare solent, si legitime usurpantur.

Quando vitium adest in uteri vagina male constructa, sive ea sit nimis arcta, sive concreta, aut carunculis vel tumore obstita, arte chirurgica hæc vitia sunt tollenda.

Si *vitium simile in ipso utero, ovario aut tubis Fallopianis*, quia nec visui nec manibus accessus datur, plerumque est immedicabile. *Aque medicatae* tamen, tam frigida, quam potissimum *therme*, sæpe tam in mensium anomalis, quam fluore albo, & malo corporis habitu, quam & in malis nobis prorsus occultis corrigendis, ut modo dictum est, multum haud raro boni præstant, & mulieres paultz,

ut

ut experientia sæpe docuit, post earum usum conceperunt, quæ diu antea fuerunt steriles.

V.

De Gravidarum noxiis.

In gravidis vero multis quam plurima quoque occurrunt symptomata; quorum pleraque, primis potissimum mensibus, ex sanguine menstruuo retento, atque sic inde nata plethora, mihi oriri videntur: ut cibi appetentia laesa aut imminuta, vulgo appetitus prostratus, aut depravatus, quem picam & malaciam vocant, itemque nausea & vomitus frequens, in aliis animi deliquia, dyspnœa, hæmorrhoides, hæmorrhagia uteri, & abortus, &c. Alia vero ultimis mensibus, a mole sive magnitudine fœtus, secundarum, & aquarum, quibus fœtus innatat, sensim incrementum, varietque corporis actiones lædentium, proveniunt: inter quæ, præter enarrata, tumores pedum, varices, tensiones abdominis, spirandi difficultas, obstructio alvi, flatuum molestia ac tormina, hæmorrhoides dolentes aut fluentes, difficultas urinae & alvi ferme præcipua sunt: quæ omnia e mechanicis rationibus deduci, atque ex eis satis commode explicari possunt.

Gravidarum malis quæ, & eorum causæ.

VI.

In curatione igitur symptomatum primorum mensium, & cumprimis nausea, vomitus, anorexia, vitandus victus inordinatus ac nimius; & e contrario, conducunt diæta modica, potus tenuis, motus moderatus, at frequens, blanda roborantia, stomachica, carminativa & cardiaca, cum blandis acidis, ut essentia cortic. aurant. & gentianæ cum spiritu nitri dulcis, elix. viscerale Hoffmanni, vel etiam in calidioribus & biliosis, spir. nitri dulcis solus, vel elixir. vitrioli Mynsichti. Contra in paullo frigidioribus, aqu. embryon. aqu. cinamomii, cinam. cydon. aliave cordialis, & in pastu haustus vini generosi confert.

Curatio eorum, quæ primis mensibus.

In animi deliquiis, dyspnœa, hæmorrhagia uteri, &c. missio sanguinis in brachio instituta, hæc symptomata minuire solet; quæ vero in valde plethoricis, si res exigit, post aliquod tempus semel iterumque interdum repetenda. Nonnullis etiam in primis mensibus, præsertim si victus inordinatus præcessit, aliave signa adsint crudis in ventriculo, lene medicamentum alvum ducent, immo & si vomitus indicia adsunt, emeticum etiam blandum conducit, & roborantia postea his subjungenda. In appetitu depravato, si terrea appetunt, hoc acidum peccare in ventriculo indicat: hinc terrea, attenuata securiora sive blandiora, ipsis sunt danda; contra si acida, alcali aut calor peccat, adeoque acida ipsis etiam modice sunt

sunt concedenda & suadenda. Denique si falsis aut aromaticis delectantur, pituitam in ventriculo abundare hæc significant; hinc præmissis lenibus & aptis purgantibus, qualia sunt pilulæ Beccherianæ alizque similes, vel rhabarbarina, vel aque aut salia amara laxantia, &c. vel etiam pro indicantium ratione, blando emetico, salia media, medicamenta amara & aromatica, ad cruditates has viscidas destruendas, ipsis sunt exhibenda, observata simul apta victus ratione.

VII.

Quæ morbis & ultimis.

In symptomatibus, quæ mediis & ultimis mensibus, a mole & magnitudine fœtus atque uteri & sæpe simul adhuc a plethora proveniunt, ac speciatim in tumore pedum ac varicibus, ut & dyspnœa ac palpitatio cordis, in sanguineis conducit maxime missio sanguinis in brachio, deinde blanda diaphoretica & diuretica, quotidianæ fricationes pedum, motus moderatus, sed frequens corporis, diæta modica, atque antea §. VI. indicata remedia roborantia, vitando simul otium, necessaria sunt; in pituitosis vero venæ sectio omittenda.

VIII.

De Alvo obstructa Gravidarum.

Alvi obstructio.

Speciatim propter alvum obstructam, præ omnibus potus sufficiens, aqueus vel tenuis, ut theæ, coffeæ, cerevisiæ tenuis, vel aquæ cum paucò vino est commendandus, ac præterea victus mollis, humidus, leniens, vitando siccum, adstringentem, durum, flatulentum, necessarius est; & si hæc ex fonte diætetico desumpta forte non sufficiunt, clysmæ emolliens subinde adhibendum, aut lenissimum remedium alvum ducens, vulgo laxans dictum, ut Potinacula ex tamarindis, foliis fennæ & manna, vel magnesia, vel pilulæ blande aperientes, ut Beccherianæ alizque similes, vel sal quoque amarum purgans modica, attamen sufficienti copia his exhibendum.

IX.

De Flatuum molestiis.

Flatus.

In flatuum molestiis, & inde sæpe natis torminibus, anxietatibus aut dyspnœa, præter victum modicum, & evitationem alimentorum flatu inducentium, modoque §. VIII. dicta aperientia ac laxantia, stomachica & carminativa antea §. VI. laudata atque imprimis essentia cortic. aurantiorum,

tum, essentia carminativa Wedellii, spiritus vitri dulcis, vel carminat. de tribus, aqua embryonum, cort. aurant. vel carminativa quantitat. modica subinde sumta, egregie conveniunt.

X.

De Urina difficultate.

In *urina difficultate*, elevatione ventris gravidæ, quia uter- Urina dif-
 rus cervicem vesicæ comprimit, plerumque succurri satis pot- est.
 est; ut &, præsertim si hæc non sufficit, *cataplasmata* ex *chere-*
folio & *cepis assatis* pubi imposito, itemque liq. terræ folia-
 tæ tartari, vel tincturæ tartari, vel & subinde solus aquæ
 petroselinii aut chæresfolii, vel *emulsionis* ex nucleis persico-
 rum vel amygd. amar. cum aquis his paratæ, potu prædesse
 possumus; *diuretica vero fortiora*, quia facile sanguinem ni-
 mis exagitant ac fœtum pellunt, sæpe nocent. In malo
 contra graviore, *cathetere* potius urinam e vesica emoliri
 præstat.

XI.

De ventris tensione.

In *tensione & dolore cutis atque musculorum abdominis*, a Dolor ab-
 fœtu & utero vehementer extensorum inductis atque hinc dominis.
 multis perquam molestis, externe ad *has partes emolliendas*
ac leniendas, pingui, oleosa & emollientia, ut unguent.
 dialth. vel ol. amygdal. dulc. aut liliorum alborum, butyrum
 recens, aut *pinguedines variae* blandiores, ut caponum, an-
 serum, medulla pedum vitulinorum aut bubulorum, abdo-
 mini sæpius calide illita, optime profunt.

XII.

De Hemorrhoidibus dolentibus.

Hæmorrhoidum cecarum dolores & tumores pulveribus tem- Hæmor-
 perantibus aut antispasmodicis & potui tenui, aquoso inter- rhoidum
 ne; sed *externæ sanguinis missioni*, applicatisque eis, quæ vitiæ.
 pag. 128. ad hæmorrhoides inflammatas aut dolentes com-
 mendavimus, ac speciatim etiam *decocto foliorum hyoscyami* vel
semlini cum lacte aliquoties applicato, egregie cedere solent.
 Sed si *hæmorrhoidum adest fluxus*, hic similiter moderandus
 laudatis pulveribus temperantibus, venter sectione in bra-
 chio,

chio, usq. moderato infusi herbæ & flor. *millefolii* ac quiete corporis: qua de re uberius consilium ex pag. 96. peti potest.

XIII.

De Uteri hæmorrhagiâ, & Abortus metu.

Uteri hæ-
morrhagia, &
abortus.

Hæmorrhagia uteri, & inde metueadus *abortus*, periculossimus gravidarum affectus, vel a *plethora* & orgasmo sanguinis, vel ab *ira* aliisque affectibus animi gravioribus, vel a *solutione placente ab utero*, lapsu, saltu, ictu, vel alia quacumque de causa, sive interna sive externa facta, dependet, ubi sanguis sæpe tam larga copia ex utero profluit, gravidæque haud raro brevi tam insigniter inde debilitantur, ut sæpius, nisi in tempore adhuc auxilium feratur, ob sanguinis hunc fluxum enormem pereant. Igitur si ab *orgasmo*, vel *plethora*, vel etiam ab *ira* oriatur, conducit præ omnibus quies corporis & animi, pulveres vel mixtura temperantes, sanguinis missio in brachio, aer & potus moderate frigidus, & abstinencia ab omnibus calidis & calefacientibus aut spirituosus, ut & ab ira ac venere. At in *malo graviore*, potio Sylvii adstringens, pulv. stypticus Heurnii, immo alumen ipsum ad modum *Mynsichti* & *Helvetii* paratum, aliave adstringentia & opiata moderata, qualia supra pag. 91. de fluxibus sanguinis nimis comendata sunt, conveniunt, quibus ipsis etiam tunc *abortus* sepe *præcavetur*.

XIV.

Curetio
chirurgi-
ca.

Si verò ab his hic sanguinis fluxus non remittat, *placentam ab utero solutam esse* indicat, quæ huic nulla ratione rursus agglutinari, adeoque nec medicamentis fluxus hic cohiberi potest: hinc, quia gravida semper inde redditur debilior, & quidem, ut aliquoties jam observavi, brevissimq. subinde temporis spatio, atque hoc in statu metuendum, matrem cum foetu brevi esse perituram, sicut plura ejusmodi novi exempla, *factus una cum secundinis, sive vivus adhuc sit sive mortuus*, perita manu mature & caute *educendus*, quocumque etiam gestationis tempore hoc fuerit, sicut in Chirurgia nostra peculiari capite (a) id uberius docuimus; quo solo sæpe mulieres hæc, si jacto id adhuc fiat tempore, servantur; nam alias mater & foetus simul certo pereunt; vel si feliciter adhuc res pro matre cedit, & sanguis ac dolores partus foetum immaturum expellunt, *abortus fit*, atque foetus perit.

XV.

XV.

De Abortu facto.

Abortus vero jam factus nullam admittit curationem, dum *Quid factus abortus facien-*
 fœtus, isque ut plurimum jam mortuus, in uterum refun- *dum.*
 di nequit; verum quia mulieres a prægressa eaque sæpe ad-
 huc durante sanguinis per uterum profusione, præsertim si
 secundæ in utero resisterint, *valde debiles sunt, & adhuc*
magis debilitantur, ita ut cum sanguine animam simul haud
 raro emittant, ad hunc fluxum compescendum & vires re-
 sarcendas oportet primo, si *secundæ haberi possunt, eas extra-*
here; deinde ut siccitatem in lecto, in loco moderate frigido,
 conquiescant; postea ut analepticiis, aquis scilicet roboranti-
 bus atque modice adstringentibus, & nominatim aqua cina-
 momi cydoniata, æq. mælistæ, velemlusionib. cardiacis, aut
pulveribus temperantibus cum coraliis aut spec. de hyacintho;
 itemque tinctura coralliorum, infuso millefolii, juleculis nu-
 trimentibus, haustulo vini & cumprimis rubri, reficiantur.

XVI.

De Abortu præcavendo.

Quando alia, quam hæmorrhagia uteri, indicia in gravi- *Quomodo*
 dis abortus metuendi aut futuri, per *vehementia tormina aut* *abortus*
 dolores partus spurios, nulla adhuc apertura uteri oris interi- *præcaven-*
 ni præsentē, in ventre ac lumbis se manifestant, intus car- *dus.*
 minativa, extus aqua embryonum vel in pauperibus spiritus
 vini ventri cum splenio aut pane mellito calide, dum æ-
 gra super lecto decumbit, imponenda, atque *clysmata* emol-
 lientia & carminativa una cum quiete corporis adhibenda
 sunt. Si hæ mulieres sunt *plethorice*, etiam venæ sectio hic
 conducit. Si causæ horum malorum est *ira*, temperantia &
 nervina cum quiete profunt; sin *a passione hysterica*, antihy-
 sterica & antispasmodica danda. Quando *a tussi* vehemen-
 tiori metuendus abortus, tussis curanda, contra quam noctu
pilule de styrace vel de cynoglossio ad pauca grana datæ, pro-
 ficiunt. *Febres acutæ* etiam sæpissime sunt abortus causæ, ubi
 vero raro præcaveri potest, & curandum hic maxime remediis
 febri debitis, ut minimum, mater servetur, quæ alias sæpe si-
 mul cum fœtu hic perit. Ubi vero jam uteri adest hæmorrhagia,
 id, quod §. XIII. agendum præcepimus, est faciendum. Ad eas
 vero, quæ jam semel aut sæpius abortum passæ sunt, ab abortu
 præcavendas, quia hic sæpissime a nimia sanguinis copia, exi-

tum moliente provenit, graviditate facta, circa finem secundii aut tertii mensis, quando forte alias antea abortum fecerunt, *sanguis* e brachio mittendus, & temperantia, una cum modicis adstringentibus, ut coralliis, per aliquod tempus adhibenda; quæ etiam postea singulo trimestri, vel in valde sanguineis, singulo bimestri spatio, iteranda, servata modica dieta, vitatisque calefacientibus, moribus quibuscumque & affectibus animi vehementioribus. *Abortus* etiam in quibusdam fit *ex nimia vel gravide, vel fœtus debilitate*; quo in casu causa debilitatis investigata removenda, atque internis & externis alimentis ac medicamentis roborantibus §. XV. & modo laudatis, præcipue vero aq. melissæ ac cinnam. vel aqua embryonum interne & externe ægris his succurrere, & si morbi alii hujus debilitatis causæ sunt, eos prius vel simul curare oportet. Si *cachexia* quædam *abortus frequentioris causa*, hæc purgantibus, cachexiæ cuilibet contrariis, & spectatim etiam *aquis medicatis* aut thermis, quæ hic præstantissimæ sunt, curanda.

XVII.

De Partu difficili.

In puerperis *partus difficilis* potissimum occurrit, qui vel *Puerpera. matris, vel obstetricis, vel infantis culpa* contingere potest ac solet. *Matris culpa*, si apertura uteri facta & fœtu rite fito, *vires* tamen ac *dolores ad partum* seu fœtum expellendum necessarii, ei deficiunt vel prorsus desunt, præsertim si aquis jam ruptis omnes dolores etiam in robustis cessant, fere semper partus difficilis & situs fœtus p. n. est metuentus; præterea si *vitium in partibus* ejus genitalibus adsit; vel si *parturiens vires & nisus ad expellendum fœtum*, ut quandoque ob varias causas contingit, adhibere nolit. Haud raro etiam *alvus adstricta* partum reddit difficilem.

XVIII.

In *virium ac dolorum naturalium defectu*, quando fœtus in situ dispositus est naturali, & apertura oris interni uteri adest, id quod ab obstetrice vel Medico digito est explorandum, (a) exhibenda sæpius sunt corroborantia, analeptica & leniter pellentia; ut sunt primo *haustulus vini* generosi, cum vel sine cinnamomo aut mace, vel frigidus, vel & pro re nata, calidus, semel iterumque, si negotium non succedit, repetendus; vel *aqua pulegii, melissæ, liliorum alborum, cinnamomi, florum cheiri, lilior. convall. perlarum, &c.* cum pauxillo *elaosacchari* aut sirupi cinnamomi vel *ca-*

ryo-

[a] Vid. Chr. nostræ Instit. Tab. XXXIII. fig. 1.

ryophyllor. aut conſect. alkermes incompleta; vel cum talibus aquis, ſi majori ſtimulo opus eſt, detur *apta doſis pel-
lentis medicamenti, ut hepatis anguille pulvis, vel boracis, cinnamomi, myrrhæ, aut antherar. liliorum alborum*; non neglecto potu conveniente, eaque poſt horam unam vel alteram, ſi partus non ſequatur, ſemel iterumque aut ſæpius repetatur: naribusque ſpiritus aut aquæ roborantes cephalicæ ſubinde admoveantur, donec tandem partus ſequatur. *Ca-
vendum tamen ab abuſu aut largiori calefacientium ac pellen-
tium horum uſu, quia eis puerpæris febres acutæ ac purpu-
rate ſæpius inducuntur, adeoque caute cum iis utendum.* Clyſteres ſtimulantes etiam ſubinde, præſertim alvo obſtru-
cta, multum hic valent, adeoque ubi fortiori ſtimulo opus, & hi non omittendi. *Manus obſetricis vel Medici periti in
vaginam uteri immiſſio, & offis coccygis repreſſio, multum
ad dolores excitandos & partum promovendum facere quo-
que poteſt. Ubi vero dolores veri ſunt vegeti, & ſitus fœtus
bonus, res naturæ relinquenda.*

*Quando puerpæra vires ad expellendum fœtum adhibere no-
lit, vel precibus atque exhortationibus, vel interdum, ſi
immorigera, minis etiam ad officium ſuum eſt adigenda.*

*Si eas ad-
hibere no-
lis.*

XIX.

*Si vitium in partibus mulieris genitalibus, & os uteri vel
nimis anguſtum vel durum, ut ſæpe ſolet in primiparis, præſertim ſenioribus, vel nimis ſiccum, ſotibus vel linimentis
emollientibus, butyro vel oleo ſæpius inungendum, vel
vapore balnei relaxandum, digitisque & manibus prudenter
inmiſſis ſenſim diducendum ac dilatandum, eiſque fœtui e-
xitus promovendus. Sin tumor, caruncula, membrana vagi-
nam claudens, vel coalitus in vagina adſint, manu chirur-
gica & ſcalpello hæc curanda.*

*Si vitium
in parti-
bus gen-
talibus.*

XX.

*Sæpe quoque obſtetric eſt cauſſa partus difficilis, præſertim
quando gravidæ parturientes præmature, tempore nimirum
graviditatis nondum expleto, nullis adhuc veris partus dolo-
ribus præſentibus, & cumprimis nulla etiam adhuc facta a-
pertura oris uteri interni, digitis exploranda, (qua ſola dolo-
res veri a falſis certe diſtinguuntur.) ad labores impellit aut
cogit: unde ſolum, vi ſumma diu & fruſtra ad pariendum
adhibita, mulieres vires conſumunt ac debilitantur, & ta-
men, natura invita, ſuis conatibus nihil efficere poſſunt; eo-
que ipſo & fœtus & mater, culpa imperitarum ejuſmodi,
quam ſæpiſſime interficiuntur, vel ſaltem in varios morbos
& vitæ periculum conjiciuntur. Hinc, ubi modo dicta par-
tus requiſita & cumprimis juſta apertura oris uteri nondum
adſunt, a laboribus potius abſtineant, & præſertim ſi juſtum*

*Obſtetricis
vitiis.*

etiam pariendi tempus nondum adfuit, nulla pellentia danda, sed quieti ejusmodi mulieres gravidæ committantur; deinde analeptiis, carminativis, aquis præsertim roborantibus §. XVIII. vel aqua melissæ, menthæ, embryonum, cortic. aurant. vel cinamomi, cum vel sine vino, vel jusculis etiam reficiantur, tempusque partus naturale ac debitum & grvida & obstetrix cum patientia expectent, negotiumque hoc non præcipitent. *Natura enim hic vult duci*, non cogi.

XXI.

Fœtus vi-
tia.

Si fœtus causa partus difficilis, isque vel ob caput nimis magnum, vel ob monstruosam figuram, vel, quod frequentissimum, *ob situm ineptum sive præter naturam*, tunc medicamenta pellentia non modo sunt frustranea, sed omnino noxia: quia periculosa sanguinis profluvia, inflammationes internas & febres acutas, præsertim purpuratas, ut supra jam diximus, §. XVIII. sæpe concitare solent; verum, plerumque fœtus tunc per pedes perita manu, sive vivus sive mortuus sit, mature ac prudenter invertendus & educendus, sicut in Institut. chirurg. nostr. Cap. de Arte obstetricia, abunde docuimus. *Si vero integer haberi nequit*, antequam putrescat, per frustra potius quam cautissime, ne mater lædatur, extrahendus.

Post partum quemvis laboriosum puerperis, quia plerumque valde sunt debiles, & animi deliquiis sæpe tunc afficiuntur, haustus vini aut cerevisiæ calidæ, aut aquæ analepticæ §. XVIII. est exhibendus, atque, ubi opus, semel iterumque repetendus.

XXII.

De Fœtu in utero mortuo.

Quando fœtus in utero mortuus est, studendum, ut antequam putrescat, & mulieri hoc ipso gravia mala inducat, inde ejiciatur. Si tamen *extra partus tempus*, membranis fœtus nondum ruptis, & aquis nondum effusis, moritur, naturæ res relinqui commode potest, quia fœtus membranis integris, & aquis adhuc inclusis, ob aeris denegatum accessum, non putrescit: nam suo tempore sponte partus dolores veri oriuntur, quibus peregrinus ille hospes tandem expellitur. Si *vero in partu moritur*, postquam membranz fœtus jam ruptæ sunt, accedente aere cito putrescit, & mala pessima, nisi brevi emittatur, concitat. Ita si *in situ est naturali, & parvus dolores adsunt*, hi cardiacis prudenter sustentandi, donec his ipsis vel sponte, vel obstetrice juvante protrudatur. *Sin*

vero

vero hi dolores defunt, vel etiam foetus est in situ p.n. optimum consilium est, ut quam primum vel *manibus*, vel ubi hæ non sufficiunt, *ferramentis*, de quibus videnda est Chirurgia, educatur.

XXIII.

De Secundis relictis.

Si post factum editum *secundæ* non mox sequantur, quas *secundæ* tamen obsteritrix tunc ut plurimum apte educere potest ac *reliktæ*. debet, sed adhuc in utero hæreant, puerpera, antequam hæc ediderit, non facile e sella dimittenda; sed vel conatibus & nifibus parturiendi continuatis eas expellere studeat, obsteritrice ejectionem manibus leniter adjuvante: vel si hæ sic foetum brevi non sequantur, sicut tamen sæpe fieri solet, & parturienti adhuc vires sunt, manu mox, in uterum, juxta ductum funiculi umbilicalis ad placentiam usque immissa, eaque prehensa, vacillando ac blande motitando, ab utero solvenda, & si fieri potest, caute educenda: *sin vero nimis arte utero adhaereat*, ut sine vi ac laceratione earum aut uteri inde solvi nequeat; vi haud evellendæ aut dilacerandæ, quia *evulsio violenta* sæpissime inflammationem & gangrenam uteri & febres pessimas & cumprimis etiam purpuratas hisce puerperis inducit; verum potius per aliquod tempus, horulam forte dimidiam expectando, manum vero in utero, ne os ejus se claudat, servando, sponte ab utero separatur, ut sine vi tandem educi queat. Ita & si mox post partum nimis debilis sit puerpera, prius potu, juscule vel aquis roborantibus, refocillanda, & quies aliqua ipsi concedenda, donec vires aliquas recuperavit, ubi tunc si sponte interea sub doloribus post partum non prodierint, manu & digitis blande motitando solvenda & protrahenda. Sed si foetu nato *secundæ solæ* ob imperitiam obsteritricis intus remanserint manoque mox ab ea, sicut fieri debuisset, educæ non sint, uterique os jam denuo clausum sit, ut manui aditus non amplius pateat, eadem *medicamenta, quæ menses aut partum promouent* §. XVIII. (quia hæc & secundas pellunt) & hic adhibenda, ubi cumprimis etiam pilulæ Beccherianæ singulo vesperi sumptæ valde profunt, eisque secundinæ emolliendæ: id quod subinde feliciter adhuc obtinetur; sæpius vero ob neglectam earum maturam extractionem in utero putrescunt, febres aliaque mala accedunt & puerperæ inde moriuntur, vel minimum in istiusmodi febres, præsertim inflammatorias & purpuratas, incidunt periculosissimas.

XXIV.

De Doloribus post partum.

*Doloris
post par-
tum.*

Si doloribus post partum corripitur puerpera, qui sæpe vehementes sunt, & vel a parte secundarum, vel integris etiam secundis relictis, vel a magnis frustis sanguinis in utero concretis, vel a partu difficili prægresso, vel a lochiis non rite succedentibus, vel etiam a flatibus concitari solent, præsertim si venter mox a partu fascia idonea vel longo mantili, non probe fuit ligata, vel frigori qualicumque se exposuit, ligato prius decenter ventre, conducit porus diluens, aqueus, calidus, ut thea cum croco, infusum flor. chamomillæ, vel seminis carvi, loco theæ haustum, vel juscula cum semine carvi cocta, vel flores chamomillæ aut absinthii aut flav. cort. aurantiorum ʒj. cum jusculo calido aut cerevisia cocti ac hausti, quod primum *Foresti* fuit specificum, vel & essent. florum chamomillæ, essent. cortic. aurant. cum spiritu nitri, vel essent. carmin. *Wedelii*, aliaque ejusmodi cum infuso aliquo prædictorum calido sumpta, corpore contra frigus probe defenso. *Oleum amygd. dulc.* ad ʒj. vel ʒij. ex vehiculo calido subinde usurpatum, multis optime quoque conducit. Si calor p. n. simul sentiat, detur sæpius pulvis temperans, ex lap. cancr. cinnabari, nitro & croco; vel potiuncula temperans, non omisiss in malo vehementiori pro re nata, *clysmatibus* emollientibus & carminativis, ut & *sacculis* carminativis, aut vesica aqua vel lacte calido, in quo flores chamomillæ cocti, repleta, ventri imponendis. Ceterum præstat primis diebus alvum esse obstructam, lochiis rite fluentibus, quam nimis laxam, quæ valde hic suspecta est; adeoque & purgantia fortiora hic vitanda: blanda tamen, ut pilulæ *Beccherianæ* ac similes non nocent.

Haud raro etiam hi dolores oriuntur post violentam secundinarum ex utero evulsionem, ita ut uterus inde inflammetur, & febres acutæ pessimæ hac ratione inducantur. Sed de his mox §. XXVI. plura.

XXV.

De Lochiorum vitiis.

*Lochia
peccantia.*

Quomodo lochiorum nimius fluxus eorumve suppressio sint tractanda, Cap. VIII. & IX. jam docuimus.

Hoc solum hic adhuc addo, quod si cum febre acuta lochia fluant cum doloribus, hæc ut plurimum uteri læsionem, præsertim a placenta vi evulsa, indicare, quam inflammatio, gangræna uteri & mors sæpe sequuntur.

XXVI.

XXVI.

De Febribus acutis Puerperarum.

Quando vero *ex suppressis lochiis*, ob frigus admissum, vel *animi affectus*, ut sæpe fit, vel & *ex evulsis* per vim secundinis, *febres acutæ*, *purpura puerperarum*, sive *febris miliaris*, *inflammationes internæ*, ut *pleuritides*, *peripneumonia*, *pneumonitides*, *anginae*, *hepatitis*, *ventriculi*, *uteri*, *mammarum*, aliarumve partium nobiliorum *inflammationes*, oriuntur, conducunt, ut in aliis febribus acutis & inflammationibus, pulveres temperantes, resolventes, diaphoretici, acido citri saturati, cinnabari, nitrosi, essentia diaphoretica, ut scor-dii & croci, diluentia aquea, potus largus aqueus, potiuncula diaphoretica & moderate cardiaca, aliaque in febribus continuis & inflammationibus internis supra commendata. Sæpius etiam lene *emeticum* ex hypocacoanna, si causæ, ut ira prægressa, aliæve id exigant, utiliter exhibetur. *Clysmata* quoque ano, *fomentationes* vero *ope vesicæ* aqua vel lacte calido repletæ, partibus dolentibus aut inflammatis, vel *cataplasmata* in uteri inflammatione *ad gangrenam præcavendam* ex rad. præsertim symphyti, sigilli Salomonis & althæa, in lixivio fortissimo aut vino coctis, eidem calide sæpius applicata profunt (a); atque in *plethoricis*, præsertim ubi *lochia suppressa* sunt, in principio *sanguinis missio in pede* est instituenda, & *lochia leniter pellentia*, ex succino aut myrrha temperantibus sunt addenda.

Febres acutæ & inflam. maxime internæ.

XXVII.

De Febri lactaria.

Febris lactaria, quæ circa tertium vel quartum diem, lacte ad mammas congesto, oriri & per unum alterumve diem durare plerumque solet, vel sponte solius naturæ actione, ope sudoris transit, vel diaphoreticis quoque & diluentibus aqueis, præsertim calidis, modo §. XXIV. indicatis, ac regimini diaphoretico ut plurimum cedit, præsertim si simul diæta servatur tenuis, & infans mammis sæpius admovetur. Quando autem puerperæ non lactant, tenui diæta & diaphoreticis res potissimum est expedienda,

R 4

lac

(a) Hoc *cataplasma* in Actis Nat. Cur. vol. II. pag. 329. & a Cel. Werthebio in doctis. suis obs. de febrib. pag. 294. contra uteri gangrenam valde laudatur; prodest tamen quoque hic *cataplasma* ex flor. nhamomillæ, meliloti & sambuci in vino vel lacte coctum.

lac simul, si quod adest, leniter subinde, ne subsistat & coeat, exprimendo.

XXVIII.

De Mammarum inflammatione.

*Mamma-
rum tu-
mor.*

Mammarum tumor & inflammatio, qui a lacte stagnante, primis plerumque post partum diebus, immo & haud raro tardius oriri solet, interne, iisdem remediis diaphoreticis, quæ §. XXIV. commendata sunt; externe vero, resolventibus, maxime spiritu vini cum linteis, calide sæpe applicato, vel empl. diachyl. simpl. vel de sperm. ceti, addita camphora, aliisque in Chirurgia (a) laudatis, sæpe resolvitur, cum primis si lac subinde vel ab homine vel caniculo exsugitur, vel manibus leniter exprimitur. Si vero inflammatio jam ad *suppurationem* spectat, tumor quantocyus emollientibus, vel cataplasmatibus, vel emplastro diachylo cum gummis, maturandus, postea aperiendus, pus ejiciendum, abscessus unguento digestivo depurandus, & tandem balsamicis, ac nominatim balsamo peruviano aut de Meccha, rursus consolidandus.

XXIX.

De Papillis dolentibus & fissis.

*Papille
fissæ.*

Papille dolentes & fissæ lactantium curantur vel balsamicis, ut oleo eorum & ceræ, vel mucilag. sem. cydon. sæpe illitis; vel sæpius insperso pulvere gummi arabici; vel aqua Reginæ Hung. superimposita, aliisve in Chirurgia nostra laudatis.

XXX.

De Lactis abundantia & defectu.

*Lactis
vitæ.*

Lactis abundantia nimia, præsertim ubi fœtus mortuus, vel puerperæ lactare nolunt, minuitur victu tenui, parco, sudoris largi tolerantia, eaque lenibus sudoriferis sustentata, itemque purgantibus ac lechia pellenribus, ut pilul. Becher. & Elixir. propr. quibus addi potest lap. galactites in dorso appensus.

Defectus vero lactis curatur victu humido multo ac bene nutriente, ut omnis generis bonis sorbitionibus & jusculis, lacte, præsertim cum flor. sambuci cocto, ovis sorbilibus, ge-

(a) Cap. de Mammarum inflammatione.

gelatinis, emulsionibus, cerevisia calida cum vitellis ovorum, & saccharo, stomachicis quoque & digestionem promoventibus atque cumprimis pulveribus ex *feminibus carminativis*, anisi, fœniculi, carvi & saccharo, sæpius assumptis; *frictio* ne quoque *mammarum* frequenti, appenso lapide galactite, aut mercurio vivo ad mammas: quæ ultima tamen, si quid præstant, stimulo magis sive blanda irritatione ad mammas, quam alia quadam occulta facultate, id efficere videntur.

XXXI.

De Urinæ incontinentia post partum.

Hoc malum a læsione, laceratione, debilitate, relaxatione vel paralyti cervicis vesicæ oriri solet, & malum est molestissimum atque simul ut plurimum per medicamenta curatu difficillimum. Interea tamen *roborantia*, & *traumatica* principio sæpe aliquid proficiunt, ut infusa herbarum traumaticarum, Essent. traumat. Wedel. tinct. terræ japon. chinæ & cascarillæ, immo & tincturæ martiales; item externe *fotus herbar.* illarum cum vino rubro, vel aqua ferrariorum facti, sæpius applicati. *Balnea* etiam & cumprimis *thermarum*, vel ex *aquis martialibus* parata, egregia sunt; quæ tamen simul & interne hoc in malo usurpari cum fructu possunt. Quod si vero hæc omnia parum sint, *machinis chirurgicis* vitium hoc adhuc leniri sæpe potest: qua de re videantur Instit. chirurgicæ.

XXXII.

De Mulierum morbis chirurgicis.

De ceteris morbis mulierum, quæ manum vel scalpellum chirurgi requirunt, quales sunt *vagina uteri concreta*, *proci-* *dentia uteri*, *partus difficilis* ex situ fœtus p. n., *fœtus mor-* *uus*, *secundæ* fœtum sponte non sequentes, *calculus vesicæ*, *cancer mammarum*, aliisque in chir. Instit. nostris satis prolixè egimus, sicut etiam jam supra Cap. XII. de Cancro medice tractandò præcepimus.

MONITA PRACTICA

Circa Morbos Mulierum.

I. In morbis mulierum semper querendum, *an menses rite fluunt*, & secundum horum constitutionem curatio est instituenda.

2. In

2. In *fœminis extra matrimonium viventibus*, & de *pudicitia aliquo modo suspectis*, cavendum, ne, dum de mensium obstructione conqueruntur, & consilium desiderant, eis forte gravidis per medicamenta pellentia, vel venæ sectionem in pede abortum concitemus.

3. Idem observandum in *mulieribus gravidis*, ne modo dictis abortum ipsis procuremus.

4. *Gravidis ad abortum pronis*, bona diætâ, & missio sanguinis matura in brachio, magna ad eum avertendum sunt remedia.

5. *Ad roborandum fœtum & gravidam debilem*, conducit subito haustulus vini generosi, vel aquæ melissæ vel cinnamomi cum vino, aut embryonum, cochlear unum vel alterum; atque in hysteris, aquæ hystericæ vel epilepticæ Langii.

6. *Contra diarrhœam & tormina gravidarum*, a quibus abortus sæpe metuendus, eadem modo dicta & vesperti parum theriacæ aut diascordii conducunt.

7. *Tussi gravidarum*, præter alia contra tussim laudata pectoralia, M. P. de styrace paucis granis noctu data, medetur.

8. *Dolores partus veri*, a spuris apertura oris uteri interni optime distinguuntur,

9. *Parturientibus nulla pellentia danda*, nisi os uteri internum percipitur apertum, & fœtus sit in situ naturali; alias nocent.

10. *Frigus quodcumque & parturientibus & puerperis est pestiferum.*

11. *Si fœtus per tres quatuorve dies in partu hæret*, ut plurimum mortuus est, præsertim si fœtet, aut cuticula a cute recedere observatur.

12. *Puerperæ, ut graviter vulnerate tractandæ*: hinc quiescant per 8. vel plures dies in lecto, tenuem servant diætâ, vitent calefacientia & carnes, primis præsertim diebus, ita a multis morbis se præservabunt. In fine lenis purgatio conducit.

C A P U T XVIII.

De Morbis Infantum ac Puerorum & 1. de morbis a meconio retento, torminibus, vigiliis, ictero, epilepsia, &c.

I.

Infantum recens nati, ob meconium, pituitam, aliasve sordes in primis viis hærentes, nisi mature ejiciantur, sæpe tor-

pe torminibus sive doloribus ventris, & inde concitatis perpetuis fere clamoribus, singultu, ictero, vigiliis, inquietudine, pavore, terrore & sæpe convulsionibus atque epilepsia, ipsa corripuntur: quibus malis multi infantes, nisi in tempore ipsis succurramus, pereunt: quapropter, quia omnia hæc mala plerumque ab eadem hac causa dependent, eadem etiam potissimum ratione, expurgando scilicet retentum hocce meconium, curari sæpe possunt. Ad quod vero expellendum, egregie conducit primum illud lac tenue sive aquosum puerperarum recentium, si ipsæ lactant infantem, quod colostrum appellatur, si illud infantibus sugendum conceditur, quod instar feri lactis ad illud expurgandum optime confert; vel si hæc mulieres non lactent, dum, ut ditiores solent, vel lactare nolunt, aut non possunt, jejunium duodecim circiter horarum his infantibus convenit, & interea semel iterumque exhibitum lene alvum laxans, ex pulveris jalapæ gr. ij. aut rhabarb. gr. iij. aut iv. cum vel sine granulo, pro malorum diversitate, mercurii dulcis, vel in forma pulveris, vel cum sirupo rosarum solutivo, vel sirupo de manna, aut de cichor. cum rhabarb. aliove simili, in forma linctus. Vel horum loco vinum dulce etiam cum melle dari apte potest, quod infantes quoque purgare, atque sic meconium evacuare solet; & si hæc forte non sufficiant, atque infantes clamare pergant, auri fulminantis gr. j. & clysmate e sero lactis, vel decocto avenæ, cum melle & sapone parato, harum sordium exitus est promovendus.

Nonnullis in locis in hunc scopum infantibus olei amigdal. dulc. ʒss. cum pauxillo sacchari penidii exhibent; cui vero priora, tamquam valentiora, præfero.

II.

De Morbis Infantum ab alvo obstructa & flatibus retentis.

Si infantibus post hæc successu temporis, ut sæpe contingit, feces alvi fiant duriores, atque inde alvi obstructio & flatuum retentio ejusmodi, qualia modo enarravimus, concitet symptomata, profunt vel clysmata emollientia & carminativa, vel & eadem (§. I.) laudata remedia, donec alvi sufficiens sit facta evacuatio, & postea subinde ad acre sive acidum a lacte corrupto ortum, obstructionemque haud raro producens, corrigendum atque absorbendum, pulvis aliquis absorbens ex conchis vel lapidibus cancrorum, aut matæ perlarum, cum pulvere seminis anisi, quod hic egregium,

Mala ab
alvo ob-
structa.

gium, mixtus, modica copia ipsis sæpe porrigatur, quibus varia & pessima illa mala, *ab acido lactis corrupti* plerumque provenientia, ut plurimum optime curantur. In malo vehementiori etiam matres lactantes, vel nutrices, expurgari & postea medicamentis acido & flatibus contrariis, quæ modo commendavimus, aliisque morbo adversis uti, atque ab acidis in victu quoque, ut & a flatulentis cibis abstinere debent. Vitanda vero quam maxime in infantibus, & præsertim his in malis sunt opiata, (nisi magna ob doloris vehementiam urgeat necessitas, & præmisso clysmate aut purgante) itemque acida quæcumque, quæ etiam a matre lactante vel a nutrice; ut modo diximus, tunc serio sunt fugienda; nam omnibus in morbis infantum, tam ratione victus quam medicamentorum, simul ad nutricem est respiciendum.

III.

De Morbis a lacte corrupto.

Infantes præterea, quia lac sugunt, aut & simul, ut multis in locis mos est, cibis vel pultribus nutriuntur lacteis, a lacte in ventriculo ob quamcumque causam corrupto, coagulato & acido reddito, & modo dicta & varia adhuc alia sæpe patiuntur symptomata: *feces enim alvi fiunt virides*, acres, acidum spirantes & subsequuntur inde frequenter vomitus, tormina ventris sævissima, alvi fluxus, inflationes abdominis, anxietates, clamores, metus suffocationis, convulsiones, pavores, epilepsia, aliaque: quæ vero mala optime rursus curantur, primo per evacuationem & postea per correctionem cruditatis sive materiæ corruptæ, acidæ. Illud fit 1. idoneis purgantibus §. I. eisque si opus, per intervalla repetitis; 2. medicamentis acidum absorbentibus, ut terreis & carminativis blandis, modo §. II. laudatis; 3. clysmatibus, antea §. I. quoque jam indicatis; 4. oleo amygdalarum dulcium interne subinde dato; 5. oleis & sacculis carminativis externe abdomini adhibendis. Quibus ipsis etiam epilepsia in hac ætate, & ab eadem causa tunc sæpe proveniens, optime profligatur; quam ob rationem pulvis Marchionis forte & specif. cephal. Mich. cranium humanum, ungulæ alcis, aliaque adhuc multa acidum destruentia sive absorbentia, tantum inter medicamenta antiepileptica nomen adepta sunt, quia ob virtutem acido contrariam, illud his casibus destrunt, præsertim si pulveribus prædictis pulvis lumbricorum terrestrium admiscetur, & sic, destructa causa, etiam curatur epilepsia: atque hanc ob causam spiritus C. C. ad gutt. iij. iv. v. quo

Morbi a
lacte cor-
rupto.

Epilepsia
a lacte
corrupto.

quoque hic haud raro valde prodest, & inter præcepta antepileptica habetur.

VI.

De Pavore in somno.

Speciatim pavores infantum prodromi sæpe sunt epilepsie, Pavoris curatio. atque convulsivi motus, a causa irritante, inducti esse videntur. Oriuntur sæpissime in somno, atque valde suspectum est symptoma; si tamen in vigilantibus incidunt, adhuc peioris esse solent indolis. In minoribus infantibus ut plurimum a lacte corrupto & acido vehementiori in ventriculo mihi oriri videntur; in adultioribus vero etiam a vermibus induci possunt. Quando igitur a lacte corrupto, iisdem remediis, quæ §. III. modo commendavimus curanda; sin vero a vermibus; hi ut mox infra §. XXIX. & seq. docebimus, tollendi.

V.

De Vigilis nimis Infantum.

Hæ vel a torminibus, vel ab alvo obstructa, & flatibus ac doloribus inde inductis, ortum ducunt; & sicuti sanitas infantum præcipue ex bono ac tranquillo somno dijudicatur, ita contra ex perpetuis vigilis, ploratu & clamoribus eos ægrotare haud temere credere possumus. Vigilæ igitur vel ex corrupto lacte in ventriculo & intestinis oriuntur, vel si alvus simul est obstructa, etiam sæpe a flatibus. In his malis igitur præ omnibus semper alvus aperta, an clausa sit, videndum, & si clausa vel adstricta, clysmia iis & primo & deinde adhuc purgans exhiberi debet, prout supra diximus §. I. & III. postea, purgatione facta, ad acrimoniam lactis corrigendam, & flatibus dissipandos, absorbentia & carminativa antea laudata §. III. ac speciatim pulv. sem. anisi sæpe danda, adhibitis simul externe ventri oleis carminativis, & nisi tormina hinc sopiantur, ut quiescere possint, clysteres repetendi. Quibusdam post purgationem oleum amygdalarum dulcium ad ℥ij. aliquoties datum egregie benefacit, & tormina, vigiliarum causas, demulcet; in malo graviore, si hæc parum sunt, & convulsiones metuantur, aquæ epilep. Langii pauxillum vel spiritus salis ammoniaci anisatus, vel spir. C. C. vel liq. C. C. succin. solus, aut cum pauxillo ess. castor. mixtus ad guttas V. vel VI. subinde est exhibendus. Ad opiata vero & theriacalia non facile accedendum, nisi necessitas tandem ea urgeat. Nutrices sibi caveant ab acidis & flatulentis, itemque a frigore: e contrario purgantia & carminativa, ut essent. carmin. vel spiritus salis ammoniaci anisatus & antispasmodica potius iis sæpe sunt porrigenda.

VI.

VI.

De Singultu infantum.

*Curatio
singultus.*

Hoc malum etiam sæpe vehementer infantes affligit ac debilitat; atque ex *pituca acris* & potissimum *acida* circa ventriculi orificium superius hærente, atque hoc una cum diaphragmate per consensum irritante, provenire videtur. *Ad hoc vero acre corrigendum* atque hac ratione singultum tollendum, *absorbentia terrea* sæpius data conducunt; & speciatim ex *Joelis* commendatione, in quovis singultu pulv. ex corall. præp. & C. C. usto, addito vel pulv. anisi aut ol. anisi vel caryophyllorum, aut macis gutt. j. vel ij., vel & in malo vehementiori, circa noctem pauxillo *theriacæ*, egregie prodest. Quod si vero malum sit pertinacius, pituita illa acris rad. *hypecacoann.* gr. j. aliove idoneo *emetico* ejicienda.

VII.

De Aphthis.

*Aphthe
quid.*

Aphthe sunt crusta quædam albicans, os vel ex parte vel totum intus, labra scilicet, gingivas, genas, linguam, palatum & fauces obducens, immo per œsophagum & intestina omnia ad anum usque sæpe se extendens, ubi vero periculosissimæ sunt & infantes plerumque consumunt. A multis cum *Celfo* pro *ulceribus* habentur, atque in adultis quoque haud raro observantur. *Earum natura & causa* mihi nondum satis perspectæ esse videntur; interea tamen a vitiosa humorum constitutione eas provenire verisimile est. *Lactis nutricum vitio* hoc malum plerumque adscribi solet; sed vidi infantes, qui dum matres lactare non poterant, neque nutrices ipsis dabantur, pristinæ potu & cibis mollissimis alebantur, & tamen aphthis correpti ac mortui sunt. Linguz motum, lactis e mammis suctionem & deglutitionem difficilem reddunt; hinc infantes mammas fugere recusant, & inquieti sunt; forte ob dolores, quos infantulis movent. *Calor p. n.* etiam ac *respiratio aucta* in eis ut plurimum quoque percipiuntur, qui de calore interno sive *febricula* testantur. Si paucæ sunt, sæpe adhuc tolluntur; sed si copiosæ, difficillime sanantur.

VIII.

Curatio.

Interea tamen in curatione fervoris humorum & acrimoniæ correctioni atque evacuationi erit studendum, quem in finem infanti dari potest sirup. de cichor. cum rhabarb. ʒij. cum

tum pulv. jalapæ gran. ij. vel iij. vel & mercur. dalc. gr. j. aut ij. Postea quotidie mane *anima rhabarb.* exhibeatur co-
chleare uhum parvulum, & postea *pulveres & mixtura* vel &
julepi *temperantes* pro febricula & calore p. n. interno mo-
derando porrigendi.

Externe commendatur *raparum* in aqua decoctarum *succus*
expressus, addito tantillo sacchari vel mellis, præsertim ro-
sari, quo ope linreoli ac digiti aliquoties in die os intus ab-
tergatur, quod & aqua salviæ & rosarum, addito melle,
commode fieri potest; aut & melle rosarum solo, vel cum
sirupo mororum mixto, cui parum spiritus vitrioli, ut effi-
caciùs reddatur, addendum, sæpius mundetur; vel *melle rosa-*
rum mucilagine seminis cydon. soluto, ope penicilli vel lin-
teoli os probe extergatur. *Oleum myrrhæ* per deliquium, ad-
dito pauxillo sacchari vel mellis, eodem modo usurpatum,
quandoque benefacit.

Nutrici, præmisso purgante, *anima rhabarbari* largiter dan-
da ac simul *absorbentia*, acido citri vel aceto saturata, item-
que essentia alexipharmaca ratione febriculæ cum infuso theæ
aut cum cerevisiâ tenui exhibenda.

I X.

Adultis, qui aphthis laborant, interne quoque *anima rha-*
barbari, essent. trifolii fibrini, tinctura antimonii aliaque *Aphthar.*
diaphoretica & antiscorbutica sæpius danda. Externe, pro *curatio in*
adultis.
gargarismate & ore colluendo ipsis conducit *decoctum veron.*
vel alterius similis herbæ vulnerariæ cum vino, addito mel-
le rosato, & pauxillo spiritu vitrioli ad lenem acorem; vel
serum lactis cum lap. prunellæ, & postea partes affectæ mel-
le rosato cum spiritu vitrioli largiter imprægnato sæpius il-
linendæ. Sunt qui os sæpe his in malis *colluendum* vel ab-
tergendum suadent *aceto* vel simplici vel *destillato*, ac mel-
le rosato imprægnato, quod etiam quibusdam benefacit.

X.

De Intertrigine infantum.

Est *excoviatio partium genitalibus vicinatum, inguinum*
præcipue ac *scroti*, ut & in rimis sive plicis colli, sub axil-
lis aliisque subinde locis, ab *acrimonia urinae ac sudoris pro-*
ducta, infantibus ingratum pruritus, immo dolores, clamo-
res vigilias atque inquietudinem concitante. *Ad hoc vitium*
sollendum, partes ita affectæ abluantur aliquoties in diē
aqua tepida, & postea inspergantur pulveres exsiccantes, ut
farinæ volatilis in sartagine ferrea parum tostæ & probe
exsiccata; vel cretæ, C. C. asti, lap. alabastr. & compri-
mis

*Intertrigi-
nis cura-
tio.*

mis tutiæ, lapid. calaminaris & cerussæ, qui nodulo ex li-
teo paulo laxiori inclusi locis affectis sæpe inspersantur.

Si malum est gravius atque vera exulceratio adest, prædi-
ctis pulveribus addatur aliquid sacchari saturni, vel loco
horum unguento de cerussa camphorato partes læsæ inungan-
tur. Ita etiam si parum vitrioli albi in aqua simplici vel
plantaginis solvatur, eaque intertrigo ulcerata aliquoties ab-
luatur, egregie eam siccat & sanat.

XI.

De Naribus obstructis infantium.

Nares infantium sæpe a muco grasso ita obstruuntur, ut
difficulter respirare, sugere ac deglutire queant; cum ad has
actiones rite perficiendas nares apertæ & aeris liber per eas
transitus requirantur: hinc infantes inde valde fiunt inquieti
& clamant, quia hoc ipsis est perquam molestum; ad quod
vero vitium curandum, præter idoneum purgare, revellendi
caussa datum, solutio vitrioli albi gr. ij. vel iij. in aquæ
majoranæ ʒss. post filtrationem cum linteolo naribus per
intervalla immittatur, vel loco hujus

ʒf. aq. majoran. ʒj.

vitriol. albi

elater. s gr. ij. M.

& eodem modo applicetur: quæ mixtura liquor errhinus est
Wedelii, humores viscidos sine sternutatione egregie liquans
& educens. Si simul externe oleum amygdal. dulc. oleo de-
stillato: majoranæ imprægnatum, radici & alis nasi illinitur,
resolvuntur inde sordes narium, & respiratio tandem libera
rursus redditur.

XII.

De Achoribus, Favis, Crusta lactea.

*Vitia hæc
quid sint.*

Intelliguntur his nominibus exanthemata scabiosa capitis in
infantibus, & si ea sunt in facie, speciatim crusta lactea ap-
pellari solent, quæ impurum & acrem sanguinem pro caus-
sa habere videntur, quem natura hic expellit, & qui, ante-
quam erumpit, sua irritatione haud raro epilepsiam inducit.
Subinde a vitio matris vel nutricis oriuntur, vel ab horum
prava diætâ, vel etiam a vitiis erroribus ipsorum infantium,
præsertim jam paullo adultiorum, quando pluribus alimen-
tis, & sæpe mali succi, obruuntur, quam commode conco-
quere & subigere possunt. Si hæc mala vel sponte vel ine-
ptis remediis, præsertim externis repellentibus, tractata re-
cedunt, aut nigricantem induunt colorem, res est periculo-
sissi.

lissima: quia infantes gravibus malis ac præcipue asthma vel epilepsia corripiantur, & inde ut plurimum moriuntur.

XIII.

In *curatione* igitur hic naturæ ductum sequi debemus: ad-
eoque præ omnibus vitandum, ne medicamenta externa, præ-
sertim repellentia, adhibeantur; sed *potius internis agendum*,
quæ sanguinem corrigunt ac temperant, noxiumque per dia-
phoresin sensim expellunt. Hinc, *expurgatis prius primis viis*,
pro hoc scopo exhibenda & nutrici & infanti essentia alexi-
pharmaca, vel ess. fumar. lignorum & tinctura antimonii,
bis mane, & a meridie pulveres aliquoties ex lapidibus can-
crorum vel conchis præparatis cum antimonio diaphoretico,
succino & cinnabari; quibus, si suspicio impuritatis veneræ
subest, mercurii dulcis exigua portio addenda, interpositis
subinde lenibus purgantibus, præsertim si alvus non respon-
det. *Quando hæc mala retrocedere videntur*, vel re ipsa jam
retrocesserunt, aut nigrescunt, quod pestiferum esse modo di-
ximus, liquore C. C. succinato ex vehiculo calido sæpe as-
sumpto, dataque essentia alexipharmaca nutrici, efficiendum,
ut rursus expellantur; ubi simul *frigus evitandum*, & infan-
tes calore probe fovendi, donec rursus prodeant.

Curatione.

XVI.

Externe omnia omittere ac negligere præstat, quam incon-
grua, & præsertim unguenta *o sulphure* vel *mercurio* parata,
aut lotiones repellentes ac frigidas adhibere: quia his ad vi-
scera interna repelluntur, & vel mors vel alii morbi graves
his ipsis concitantur. Si tamen tandem, mundantibus inter-
nis diu usurpatis, externe aliquid desideratus, *oleum ovorum*
recens, vel *butyrum recens* non salitum, vel *medulla ossium*
vitulinorum, vel *cremor lactis* ad emolliendas crustas & ulce-
ra sananda adhiberi optime possunt. *Malum sæpe est pertinax*,
atque patientia tunc & parentum & Medicorum indiget;
nutrici vero tunc subinde purgantia quoque, quotidie autem
per satis longum tempus alexipharmaca & sanguinem puri-
ficantia danda sunt, victusque bonum regimen servare de-
bent.

Externa.

XV.

De Tussi & Respiratione difficili cum catarrho.

Ex frigore vel *prava aeris constitutione* infantes sæpe his ma-
lis afficiuntur, quibus serum faucium, bronchiorum, & aspe-
ræ arteriæ vel acrius vel spissius redditur, atque hæc ipsa sym-
ptomata concitantur; quibus plerumque etiam *coryza*, immo
& *febricula* iuncta sunt. Quia igitur a frigore & transpi-

Causa ha-
rum.

S.

ratio-

ratione lesa plerumque oriuntur, in curatione studendum ut abundans materia noxia per alvum primo educatur., postea transpiratio diaphoreticis restituatur, & lymphæ vel acris vel spissa corrigatur.

XVI.

Curatio. Igitur primo idoneum purgans & infanti & nutrici, præsertim si & hæc tussi laboret, detur; deinde *infusum speciosum pectoralium* cum saccharo canto, ut thea, utrique aliquoties in die exhibeatur; præterea Elixir. pectorale Wedelii, vel spiritus salis ammoniaci anisatus, vel utraque mixta, vel & essentia alexipharmaca apta copia, cum hoc infuso assumantur. His interponantur subinde *pulvis pectoralis* ex sperm. ceti recentis (quod hic præstantissimum) pulv. bez. aut Marchionis cum flor. sulphuris, vel etiam lapid. tantum cancerorum, rad. irid. florent. & saccharo canto paratus; qui vel cum thea vel aqua aut julepo pectorali dandus. Aut loco hujus pulveris *linctus* quoque *pectoralis* ex sperm. ceti, oleo amygdalarum dulcium recente, liq. C. C. succinato & sirupo pectorali confectus sæpius exhibeatur. In *graviori pectoris catarrho, asthmate & ronco pulmonis* spiritus salis ammoniaci, vel liquor C. C. succinatus solus, repetitis sæpe vicibus, ad guttas V. VII. vel plures datus, haud raro huic malo tollendo sufficit; qui & *nutrici* tunc optimo cum successu exhibetur. Immo in *nimia pituitæ copia* in pulmonibus, & inde nato *suffocationis metu*, etiam lene *emeticum*, ex tartari emetici, vel sulphuris antimonii quarta parte gr. valentissimum est, & pro deploratis fere habitos ex orci quasi faucibus jam sæpius eripuit; cui *clysteres* quoque deinceps apte subungi possunt. *Pulvis* denique *seminis anisi* & iridis florent. cum saccharo canto ac pauxillo sperm. ceti recentis, cui & olei anisi guttæ aliquot commode admiscantur, sæpe exhibitus, qui etiam valde prodest.

XVII.

De Diarrhæa infantum.

Causæ & curatio. Hac in diarrhœa, atque ac in adulatorum, natura aliquid supervacanei, vel acris & noxii, quod intestina nimium irritat, expellere satagit. Oritur hoc vitium sæpe a *nimia aut frequentiori lactis serosioris & acrioris suctione*; vel ob *lesam a frigore transpirationem*, atque ad primas vias translationem. Ergo hic alvi fluxus minime mox adstringentibus aut opiatibus cohibendus, sed potius vitiatorum humorum excretio evacuantibus primo juvanda ac promovenda, deinde roborantia & modice adstringentia his subjungenda. Utrique scopo,
ut

ut in diarrhœa & dysenteria adultorum Cap. XIII. §. X. & XIV. *rhabarbarum* vel in pulvere, vel in essentia, apta do- si datum omnium optime convenit, & cumprimis essentia sive *anima rhabarbari*, per aliquot dies mane & circa vespë- ram danda, donec alvi fluxus remittat. His interponi apte possunt proacrimonia, quæ hic ut plurimum a lacte corrupto acida est, corrigenda, *absorbentia terrea*, & præsertim subad- stringentia, ut corallia, C. C. ustum, crystall. mont. præp. &c. quæ simul tunc diaphoreticam virtutem exerunt, quæ & *nutrici exhibere* consultum est. In malo graviore, ubi hæc parum sunt, vel pulveribus illis aliquot grana pulveris *cortici cascarille* addi, vel decoctum hujus aut etiam *cortici peruviani* forte, vel extracti horum part. j. in aqua plantaginis, menthæ aut cinnamomi cydoniatæ part. iv. soluti, ad guttas l. lx. vel cochlearis nnius parvuli singulo trihorio vel quadri- horio danda. *Externe balsama stomachica* ex oleo nucis moscha- tæ expresso, oleis destillatis carminativis & stomachicis im- pregnato, ventriculo totique abdomini calide sæpius inun- genda. *Nutrix* a frigore ac nimio potu absteineat, atque mo- dica ac temperante utatur diætâ.

XVIII.

De Urina suppressa, ejusque difficultate.

Urine difficilis excretio aut ejus omnimoda *suppressio* in in- *Causæ & effectus*
fantibus (a) ab humoribus viscidis, lactis vel aliarum rerum
vitio ortis, & renes obstruentibus, vel a vesicæ tono rela-
xato, vel sphincteris ejus spasmodica constrictione oriri vi-
dentur: unde dolores, convulsiones & alia mala sæpe pro-
veniunt. Quare humores illi spissi ac viscidi incidendi &
fluxiles reddendi, tonus vesicæ laxatus roborandus, atque ad
constrictionem excitandus ac stimulandus, & spasmodica cer-
vici vesicæ constrictionis antispasmodicis & emollientibus re-
laxanda.

XIX.

Præstare hoc possumus primo *salibus mediis*, ut tartaro vi- *Curatio.*
triolato, arcano duplicato, &c. vel per se ad ℥ss. datis, vel
cum *femine lycopodii* æquali copia, tanquam diuretico & an-
tispasmodico in pueris præstantissimo, quæ ex *aqua petroseli-
ni, cheresolii*, vel *alkekengi* data, & si opus, post tempo-
ris intervallum repetita, optime profunt: atque his subinde
haustus solius aquæ petroselini aut ceterarum laudatarum
aquarum interponendus, quibus haud raro solis sæpius usur-
patis

ratione laesa plerumque oriuntur, in curatione studendum ut abundans materia noxia per alvum primo educatur, postea transpiratio diaphoreticis restituatur, & lymphæ vel acris vel spissa corrigatur.

XVI.

Curatio. Igitur primo idoneum purgans & infanti & nutrici, præsertim si & hæc tussi laboret, detur; deinde infusum specierum pectoralium cum saccharo canto, ut thea, utrique aliquoties in die exhibeatur; præterea Elixir. pectorale Wedelii, vel spiritus salis ammoniaci anisatus, vel utraque mixta, vel & essentia alexipharmaca apta copia cum hoc infuso assumantur. His interponantur subinde pulvis pectoralis ex sperm. ceti recentis (quod hic præstantissimum) pulv. bez. aut Marchionis cum flor. sulphuris, vel etiam lapid. tantum cancrorum, rad. irid. florent. & saccharo canto paratus, qui vel cum thea vel aqua aut julepo pectorali dandus. Aut loco hujus pulveris linctus quoque pectoralis ex sperm. ceti, oleo amygdalarum dulcium recente, liq. C. C. succinato & sirupo pectorali confectus sæpius exhibeatur. In graviore pectoris catarrho, asthma & ronco pulmonis spiritus salis ammoniaci, vel liquor C. C. succinatus solus, repetitis sæpe vicibus, ad guttas V. VII. vel plures datus, haud raro huic malo tollendo sufficit; qui & nutrici tunc optimo cum successu exhibetur. Immo in nimia pituitæ copia in pulmonibus, & inde nato suffocationis metu, etiam lenes emetici, ex tartari emetici, vel sulphuris antimonii quarta parte gr. valentissimum est, & pro deploratis fere habitos ex orci quasi faucibus jam sæpius eripuit; cui clysteres quoque deinceps apte subungi possunt. Pulvis denique seminis anisi & iridis florent. cum saccharo canto ac pauxillo sperm. ceti recentis, cui & olei anisi guttæ aliquot commode admiscantur, sæpe exhibitus, qui etiam valde prodest.

XVII.

De Diarrhœa infantum.

Causæ & curatio. Hac in diarrhœa, atque ac in adutorum, natura aliquid supervacanei, vel acris & noxii, quod intestina nimium irritat, expellere satagit. Oritur hoc vitium sæpe a nimia aut frequentiori labilis serosioris & acrioris suctione; vel ob laesam a frigore transpirationem, atque ad primas vias translationem. Ergo hic alvi fluxus minime mox adstringentibus aut opiatibus cohibendus, sed potius vitiorum humorum excretio evacuantibus primo juvanda ac promovenda, deinde roborantia & modice adstringentia his subjungenda. Utrique scopo,
ut

ut in diarrhœa & dysenteria adutorum Cap. XIII. §. X. & XIV. *rhabarbarum* vel in pulvere, vel in essentia, apta do- si datum omnium optime convenit, & cum primis essentia sive anima *rhabarbari*, per aliquot dies mane & circa vespè- ram danda, donec alvi fluxus remittat. His interponi apre possunt pro acrimonia, quæ hic ut plurimum a lacte corrupto acida est, corrigenda, *absorbentia serrea*, & præsertim subad- stringentia, ut corallia, C. C. ustum, crysall. mont. præp. &c. quæ simul tunc diaphoreticam virtutem exerunt, quæ & *nutrici exhibere* consultum est. In malo graviore, ubi hæc parum sunt, vel pulveribus illis aliquot grana pulveris *cortici cascarillæ* addi, vel decoctum hujus aut etiam *cortici peruviani* forte, vel extracti horum part. i. in aqua plantaginis, menthæ aut cinnamomi cydoniatæ part. iv. soluti, ad guttas l. lx. vel cochlearis unius parvuli singulo trihorio vel quadri- horio danda. *Externe balsama stomachica* ex oleo nucis moscha- tæ expresso, oleis destillatis carminativis & stomachicis im- prægnato, ventriculo totique abdomini calide sæpius inun- genda. *Nutrix* a frigore ac nimio potu absteineat, atque mo- dica ac temperante utatur dicta.

XVIII.

De Urina suppressa, ejusque difficultate.

Urinæ difficilis excretio aut ejus omnimoda *suppressio* in in- fantibus (a) ab humoribus viscidis, lactis vel aliarum rerum *Causa & effectus* vitio ortis, & renes obstruentibus, vel a vesicæ tono rela- xato, vel sphincteris ejus spasmodica constrictione oriri vi- dentur: unde dolores, convulsiones & alia mala sæpe pro- veniunt. Quare humores illi spissi ac viscidi incidendi & fluxiles reddendi, tonus vesicæ laxatus roborandus, atque ad constrictionem excitandus ac stimulandus, & spasmodica cer- vix vesicæ constrictionis antispasmodicis & emollientibus re- laxanda.

XIX.

Præstare hoc possumus primo *salibus mediis*, ut tartaro vi- triolato, arcano duplicato, &c. vel per se ad ℞. datis, vel cum *semine lycopodii* æquali copia, tanquam diuretico & an- tispasmodico in pueris præstantissimo, quæ ex *aqua petroseli- ni, cheræfolii*; vel *alkekenigi* data, & si opus, post tempo- ris intervallum repetita, optime profunt: atque his subinde haustus solius aquæ petroselini aut ceterarum laudatarum aquarum interponendus, quibus hæud raro solis sæpius usur-

S 2 patis

(a) De adutorum jam supra p. 177. 178. egimus.

paris urinæ fluxus restituitur, *Emulsio ex amygdalis amaris vel nucleis persic.* cum aqua petroselini aliave simili facta, est quoque hic valde egregia. *Pubis regio* infantibus his frequenter *calide fricetur* oleo scorpionum, oleo juniperi, succini & anisi roborato, eique postea *cataplasma ex cepis assatis* superimponatur calide; vel ex cepis, allio, herba chærefolii & petroselini; quibus etiam oleis renum regio, quando forte caussa in his latet, calide fricanda; atque hæc etiam remedia in calculis parvis expellendis, valde proficua sunt. Si denique hæc omnia parum sunt, & symptomata urgent, *cathartico* apto urina e vesica est emolienda; id quod longe facilius fit in puellis quam pueris. Plura de *urina adultorum suppressa* vid. supra Cap. XII, §. XIV, p. 182.

X X,

De Atrophia sive Tabæ itemque Rhachitide infantium.

causæ & sedes.

Hi morbi ut plurimum apud infantes *ex chyla* & *sero viscido*, in mesenterio congesto, glandulas mesenterii obstruente, atque ne chylus ad sanguinem ritè pervenire queat, impediante, oriuntur: hinc venter partim a *tumore glandularum mesenterii obstruendarum*, partim a *laxitate intestinorum*, a multa pituita inducta; plerumque vehementer intumescit, reliquæ autem *partes tabo quasi consumuntur*. Quoniam vero de his morbis supra pag. 134. & seq. jam actum est, plura hic de iis non proponemus.

X X I,

De Dentitione difficili.

Dentitionis symptoma.

Mense sexta, septimo & sequentibus dentes ut plurimum infantibus ex alveolis suis per gingivas prodire incipiunt; ubi autem sæpe ob *dentitionem difficilem*, præsertim quando dentes canini erumpere debent, oriuntur *gingivarum tumor & inflammatio*, unde *dolores, clamores, vigilia, febres, convulsio, epilepsia* & sæpe mors consequuntur. Quando igitur eiusmodi symptomata in illis incidunt, arduum profecto sæpe est divinare aut conjectura assequi, unde aut qua ex caussa hæc mala oriantur, cum & ex aliis sæpe proveniant, & qua ratione curatio recte instituenda: eoque factum mihi esse videtur, ut veteres jam conquesti sint atque exclamaverint, *difficile esse infantibus mederi*, quia quid, aut ubi, aut unde patiantur, nobis dicere vel revelare non possunt. Hinc quam sagacissime, quantum fieri potest, ponenda

Randa ac perpendenda sunt omnia phaenomena, donec ex illa vel certe, vel verisimiliter minimum, utrum mala illa a dentitione difficili, an a lacte corrupto, an alia ex causa ortum trahant, perspiciamus.

XXII.

Indicantur vero ea mala a dentibus exitum molientibus provenire, si infantes multum clamantes (quo quippe clamore dolores suos nobis significare solent) digitos saepe in os intrudunt, papillas nutritum vel digitos alterius personae intra eorum maxillas insertos, fortiter mordent, si saliva solito largius ex ore effluit, in gingivis maxillarum, ubi dentes primi erumpere solent, tubercula inaequalia & digitis & oculis, itemque calor p.n. & in ore & in toto corpore, ac speciatim in pulsu percipiuntur. Accedit quod simul saepe subito sine causa externa expavescant, & praesertim in somno, atque ut plurimum alvi simul fluxu laborent; quod ultimum tamen longe melius est quam si alvus, ut haud raro fit, sit constipata.

Signa.

XXIII.

Quando igitur ex his aliisque indicibus mala illa a dentibus concitari judicamus, ea non melius curantur, quam iis, quae dentium eruptionem promouent, hoc est, quae gingivas duras, crassas ac tumidas emolliunt & atterunt, inflammationem earum resolvunt, caloremque p.n. blande temperant: ut sunt interne pulveres & mixturae aquosae, temperantes; externae vero oleum amygdalarum dulcium cum sirupo violarum, aut papaveris rhoead. vel sirupus florum papaveris, vitrioli spiritu leniter impraegnatus, si saepe gingivae iis fricentur. Interponantur his ea quae gingivas atterunt, ut sunt corpora dura, glabra, sicut dens lupi, crystallus vel agathus politus, vel frustum matris perlarum laeve, allave similia, quae infantibus saepe in manus dentur, ut ea in os ingerant, vel ad mandendum ea in os ipsi immittantur. Ita & frustum cutis recentis lardi sic usurpatum utrique scopo saepius egregie satisfacit. Specifice multi hic commendant ac laudant cetebrum leporis cocti, aut sanguinem cristae galli recentis pro gingivis his ipsis illinendis.

Curatio.

XXXIV.

'De Epilepsia infantum.

Epilepsia infantum recens natuorum, ut plurimum vel a Epilepsia meconio non satis expurgato, vel post haec a lacte corrupto & acido, ut jam supra §. I. & III. diximus, vel a dentitione difficili, vel ab imminetibus variolis, vel a vermibus oritur. Si a meconio, curanda ut §. I., si a lacte corrupto,

curatio.

ut §. II. & III. docuimus; sin vero a dentitione difficili, facienda primo ea sunt quæ §. XXIII. modo proposuimus, sed præterea epilepsiam & convulsiones inde sæpe oriundas egregie & avertit & minuit, immo sæpe tollit, præmissis & interpolitis prædictis, spiritus C.C. vel liquor C.C. succinatus, tamquam egregia nervina & antispasmodica, ad aliquot guttas aliquoties in die exhibiti, qui & vertici, cervici, temporibus atque naribus cum fructu sæpe adhibendi; itemque pulveres absorbentes, supra §. II. & IV. laudati, ac speciatim pulvis ex lumbricis terrestr. pulvis item Marchionis, & specificum cephalicum Mich. non omissis, præsertim si alvus obstructa, lenibus purgantibus & clysmatibus sæpius jam indicatis, eisque alvus semper aperta, quod hic utilissimum est, servetur. Quando vero his symptomata non cedunt, tumor gingivæ, ubi dens erumpendus latet, scalpello, ad dentem usque subtilem latentem transversum incidendus, id quod sine periculo fit & sæpe omnia tollit symptomata; quo etiam in casu, quia inflammatio in gingivis adesse solet, *vene sectionem*, ut efficacissimum & quasi infallibile remedium hic laudat celebris Sydenhamius; id quod tamen non semper esse experientia edoctus sum. Quando epilepsia a vermibus ortum habet, vermes destruendi, sicut cap. XVI. §. 33. & seq. itemque infra in hoc capite §. 29. proposuimus; ea vero, quæ imminentibus variolis incidit, non adeo est pertimescenda: quia eis erumpentibus sponte cessat. Adeoque nihil aliud requirit, quam ipsæ variolæ, blande scilicet tempestantia & eruptionem promoventia, sicut hac de re uberius supra Cap. IV. & speciatim pag. 48. 49. proposuimus.

XXV.

Mala a
nimia re-
pletione.

Quod si vero illa mala §. XXII. clamores nimirum, *vigilia*, febres, &c. non a dentitione oriuntur, plerumque a lacte corrupto vel & a nimia eorum repletione, præsertim si his incongruis facta, provenire solent. Si a lacte corrupto, curatio ut §. II. & III. dictum, est instituenda; sin autem a nimia repletione ventriculi & cruditatibus inde ortis, ex purgantibus, ac clysmatibus, vel etiam, pro malorum diversitate, blandis emeticis evacuandæ & postea pulvere feminis anisi, anima rhabarbari aliisque stomachicis & carminativis remediis internis & externis ventriculus roborandus.

XXVI.

De Ophthalmia infantum.

Curstio
inacina.

Ophthalmia sæpius quoque infantes affligit, eosque haud raro,

raro, vel suppuracione inducta, vel cornea alba & opaca facta, cecos reddit, nisi summa cura tunc tractetur, atque in infantibus varias ob causas numquam periculo vacat. Oritur sepe a vitio lactis nutriticis, nimium forte acris, vel & hac ipsa scorbutica aut & quandoque venerea labe affecta. Adeoque in curatione tam nutritici, quam infanti danda sunt medicamenta idonea, tam purgantia, quam alterantia, catarrhis, scorbuto aut morbo venereo propria, & quidem purgantia hic cum mercurio dulci semper maritentur. Ex alterantibus vero conveniunt ess. alexipharm. essentia & decocta lignorum, infusum herbe euphrasie cum rasura ligni sassafras, ad modum thee sapis haustum, pulveres diaphoretici ex lap. caner. succino preparato, antimonio diaphoretico, radice valerianæ, semine anisi, fœniculi &c. compositi, quibus subinde, præsertim ubi scorbuti vel luis venereæ suspicio est, aliquid mercurii dulcis recte additur.

XXVII.

Externe oculi defendendi, ne ab acri lymphâ erodantur, & stases sanguinis hic factæ resolvendæ: id quod commode fieri potest collyriis ex aquis ophthalmicis, & cumprimis euphrasie, flor. cyani, valerianæ, fœniculi, chelidon. majoris, calcatripæ, &c. Si unciz uni vitrioli albi, vel sacchari saturni gr. ij. & camphoræ sem. melon. tritz gr. j. vel spir. vini camphorati 3j. addantur, eisque sæpe oculi tepide eluantur atque abstergantur. Quidam his aquis amyli albi, tutie vel lapidis calaminaris præparati aliquot grana addunt, vel & aliquid aloes, iisque eadem ratione utuntur. In quibusdam casibus parum pulveris mercurii dulcis addo, Præterea amuleta ex radic. imperatoriz aut valerianæ cum camphorâ sæpe etiam hic multum profunt, & in male perttinaciori vesicatoria cervici aut brachiis, immo & in paullo adultioribus, ipsi vertici feliciter adhibendum; vel & si omnia hæc parum sunt, fonticulus in brachio excitatur.

Curatio externa.

Si adhuc ubera sugunt, attamen ad annum accedunt, vel eum jam superarunt, sæpe eos fere sponte a pertinacibus oculorum inflammationibus curatos vidi, postquam solum a nutrice, licet sanissima visa sit atque etiam revera fuerit, remoti fuerunt. Dieta quoque hic magni est momenti, adeoque tam a nutrice, quam pueris probe observanda.

Curatio.

XXVIII.

De Maculis oculorum, Nebula, Albugine.

Hæc vitia, de quibus jam Cap. XIV. egi, etiam sæpe
S 4 in

in infantibus ex ophthalmia in tunica oculi cornæ oriuntur, & vel eam comitantur, vel etiam sedata inflammatione adhuc restant, atque visum vel ex parte vel ex integro tollunt. Ita etiam sæpiissime in variolis, vel etiam post has, bene licet superatas, incident. Si inflammatio adhuc adest, iisdem remediis internis potissimum & externis §. 36. & 37. est continuandum, purgantisque idonea sæpius interponenda, ubi etiam externe trochiscos alb. Rhaf. §. 38. in aquæ cujusdam ophthalm. §. 11. solutos, egregios deprehendi; itemque aquam ophthalm. Quercet. ex croci metall. aliquot granis in aquæ ophthalm. §. 1. infusis, paratam, oculisque sæpius instillando & abstergendo adhibitam. Si macula ille alba sine inflammatione restant, præter aquas has quotidie pinguedo viperarum bis vel ter oculis ad gutt. j. vel ij. instillanda, vel pinguedo ascie piscis, aut sperma ceti liquidum; quibus ipsis sæpe, si non nimis densæ sunt, tolluntur. Quando a variolis orta, & adhuc recentes sunt, frequens purgatio cum mercurio dulci instituenda, atque deinceps interna & externa modo laudata quam solertissime adhibenda; si vero hæc macula jam inveterata, vix aut raro tolluntur, & acrioribus potius oculus omnino destruitur, quam emendatur. Sciendum enim, quod mala hæc sæpe admodum sint pertinacia; quæ moram & patientiam parentum & ægrorum requirunt, qui monendi, ne mox, si malum brevi haud cedat, ad agyras confugiant, qui vitia hæc sæpe acribus valde medicamentis aggrediuntur, atque vi quasi ea eradicare volunt: verum eis oculos sæpe omnino corrumpunt. Ita nec Medicus mox ad acriora eandem ob causam accedat, sed blandis patienter continuet, vel & quandoque per aliquod tempus a medicamentis externis prorsum absteineat; neque desperet, prorsus de tali curatione, quando oculi fabrica nondum destructa est: nam tempore haud raro sponte hæc maculæ in pueris dissipantur, & præstat tranquilla potestas, quod violenta nequit; natura enim hic non vult cogi, sed blande duci.

XXIX.

De Vermibus sive Lumbricis.

Vermes
quatuorpli-
ces & ef-
fectus.

Quando infantes magis adolefcunt & alimentis crassioribus nimisque copiosis, pane scilicet, farinosis, carnibus, caseo, saccharatis, crudis & difficulter digerendis vescuntur, præsertim si debillioris, frigidioris & pituitosi sint temperamenti, altero, tertio & sequentibus annis VERMES sive LUMBRICI sæpe in ipsorum ventriculo & intestinis generantur, iique ut plurimum, teretes, lumbrici ob similitudi-
nem

nem dicti, (rarius *luti*, vel *ascarides*) qui plerumque mortuæ pituitæ involuti, in ventriculo aut intestinis, cum multis gravibus symptomatibus haud raro hærent. Rarius vero in infantibus robustis & vegetis observantur, sed plerumque, ut jam dixi, in debilioribus, frigidioribus, teneris, pituitosis. Efficiunt vero vermes irritatione sua, rosione ac morsu dolores ventris, nauseam, vomitus, diarrhæas, animi deliquia, pallorem, pulsum debilem, inaequalem, intermittentem, pruritum narium, tormina & clamores, borborygmos, febres, tabem, insultus epilepticos, &c. sicuti jam supra Cap. XVI. §. 23. & seq. ubi de vermibus adultorum actum est, indicavimus. At consumptione chyli producant in infantibus sæpe voracitatem, debilitatem, maciem, alvum adstrictam, immo quandoque ipsa intestina perforant, & abdominis cavum ingrediuntur, sicut aliquoties in cadaveribus eorum incisis observavi: quæ ipso tumores ventris, atroces cruciatus, epilepsiam aliaque sævissima mala & plerumque mortem ipsam inducunt.

XXX.

Cognoscuntur ex ætate, temperie frigida, pallido ut plurimum faciei colore (quàmvis hic sæpe fallat) palpebris lividis, concavis, pruritu narium frequenti, voracitate, terroribus in somno, cæterisque §. 29. enarratis symptomatibus, & cumprimis quoque *singulari spiritus sive oris fæore* aliisque supra Cap. XVI. §. 34. adductis signis; quam maxime tamen etiam quando semel iterumque vermes vel per os vel per anum ab ipsis exiisse observati sunt. Quoniam igitur tam gravia mala, immo ipsam mortem infantibus & pueris sæpe inducunt, non negligendi, sed mature efficacibus remediis sunt curandi.

Diagnosis eorum.

XXXI.

In curatione igitur pituita, tanquam nidus eorum, eique simul ipsi sunt destruendi, enecandi atque expellendi; id quod in adultis optime fieri Cap. XVI. §. 36. & sequ. docuimus, variis *auratis, martialibus, mercurialibus*, ac *purgantibus*, ex quibus vero Medicus ea hic seligere studeat, quæ infantibus ac pueris commodissime ingeri possunt: ut sunt *decoctum mercurii* in aqua vel lacte, aliquoties in die ipsis ad uncias aliquot datum; porro *infusum seminis cina* vel *florum tanacetii* in vino malvatico aut canariensi, ad cochlearia duo vel tria pro dosi aliquoties in die; præterea *semen cinae* cum melle subactum; vel *mercurii dulci* gr. j. cum saccharo aut pulvere quodam grato aut insipido exhibitum, quibus simul *externa* Cap. XVI. §. 39. nominata addi; atque *purgantia* §. 38. recensita subinde interponi, immo & *clysters ex lacte*, præsertim quando purgantia sumperunt, ad eos

Curatio.

eos deorsum invitandos, injici debent, servata semper diætâ medica.

XXXII.

De Variolis & Morbillis.

Capite quarto, pag. 41. & seq. satis actum est, adeoque lectorem ad illud remittimus. Hic solum adhuc monere volui, quod in infantibus *variola* sæpius cum *epilepsia* incipiant, quæ vero hic nihil mali denotat aut infert, sed eis vel sponte vel ope diaphoreticorum erumpentibus, cessat.

DE HERNIIS infantium, ac speciatim *umbilici*, *inguinum* & *scroci*, infantibus & pueris valde frequentibus, de *hydrocephalo*, *calculo vesicæ*, *ani procidentia*, *ranula lingue* aliisque infantium morbis, manuum auxilium desiderantibus, vide Institutiones nostræ chirurgicæ.

M O N I T A

Quædam practica circa morbos infantium.

1. *Difficile est mederi infantibus*: primo quia, quid patiantur, quidve doleat, & ubi, dicere nequeunt; deinde quia medicamenta vix aut ægre assumunt.

2. In morbis infantium quibuscumque primorum dierum præcipue explorandum, *an meconium satis sit expurgatum*; quod si non sit, hoc quam primum adhuc est expurgandum.

3. Subsequenti tempore in eorum morbis *ad lac corruptum* & *acescens*, postea *ad dentitionis tempus*, & denique in paulo adultioribus *ad variolas* & *vermes* est attendendum.

4. In infantium morbis semper, *an alvus sit aperta*, inquirendum, & ut sit, probe curandum.

5. *Ad nutricem semper* simul respiciendum, eique & diætâ & remedia morbo præsentî congrua sunt ordinanda.

6. In *febris acutis*, temperantia, ut in variolis, ipsi danda, atque aliquid camphoræ appendendum. Nutrices quoque temperantibus & in victu vegetabilibus utantur; a carnibus vero abstineant.

7. Id *intermittentibus*, primæ viæ purgandæ, postea eff. rhab. sæpe detur: & si hæc intra aliquot dies non fugatur, decoctum forte cort. chinæ frequenter exhibeatur.

C A P U T XIX.

De Venenis.

I.

Venenorum cognitionem eorumque curandi rationem, quia tam multi eis pereunt, Medico summe necessariae esse existimo, etiam si hæc doctrina in plerisque libris practicis prætermissa & neglecta sit. Sed quid venena sint, aut quid per ea proprie intelligatur, quamvis plerisque, & cumprimis præcipitanter judicantibus, facile videatur, tamen prudentibus ob magnam eorum diversitatem, & cumprimis quia multa, immo pleraque eorum certa ratione atque prudenter adhibita, præstantissima etiam sunt, aut fieri possunt medicamenta, multa e contrario nobilissima medicamenta, sinistre aut imprudenter adhibita, fieri possunt ac solent venena; definitionem perfectam dare, quæ omnibus conveniat, jam dudum atque adhuc hodie multis eruditissimis difficillimum visum est, adeoque donec quis forte perfectam exhibeat, sequens descriptio pro aliqua eorumdem idea formanda sufficere poterit.

II.

Intelligo autem per venena, corpora naturalia, quæ parva mole intra corpus nostrum assumpta, vel alia ratione, ut per morsus aut vulnera, aut sub fami aut vaporis specie ipsi applicata sive ingesta, nunc brevi, nunc tardius, gravia eaque sæpe horribilia symptomata, principes corporis nostri actiones lædunt, invertunt, & mortem ipsam frequenter inducunt. Græcis toxica, immo & pharmaca, sed addito plerumque adjectivo deleteria, vocantur: quia pharmaca etiam medicamenta significant.

III.

Dividuntur hinc 1. in celeria & tarda; 2. in rodentia, corrosiva, sive caustica; 3. in acida & alcalica; 4. in obstruentia, vel ob vim vasa minora vehementius adstringentem, vel ob qualitatem humores nostros sanos nimis inspissantem, ut per subtiliores ductus arterias & nervos fluere nequeant; 5. in narcotica sive stupefacientia ac soporifera; 6. in mineralia, vegetabilia & animalia; 7. quædam etiam horum venenorum dici possunt naturalia, ut plerumque sunt venena vegetabilium & animalium, atque nonnulla etiam ex mineralibus; quædam vero artificialia, quæ vel per ignem sive artem chemicam, ut pleraque mineralia, vel mechanicam quædam ratione conficiuntur, ut adamantus, crystallus, aut vitrum rudi

rudi modo contusa & ingesta, quæ ob spicula sua acuta, pungentia ac scindentia ventriculū & intestina lædunt, vulnerant, ac destruunt, vel *apex cultelli*, culter ipse, *acicule*, alizve similes res mechanicæ præparatæ atque vel imprudenter vel casu deglutitæ. Quædam vero eaque summe perniciose venena *putrefactione* etiam generantur. Quæ venena *ex regno minerali*, natura vel arte producuntur, *acide ut plurimum sunt indolis*, ut spiritus sulphuris, vitrioli, aqua fortis, &c. magnâ copia sumpti, mercurius sublimatus, præcipitatus, butyrum antimonii, & alia §. VIII. quæ vero *venena regno vegetabili vel animali* ortum debent, ut plurimum *alcalica sunt nature* ita ut nullum nunc vegetabile acidum mihi succurrat, quod venenatæ sit indolis, sed *omnia vegetabilia venenata alcalica sunt*, eaque vel *rodentis* sive *caustice indolis*, ut aconitum, hel-leborus, euphorbium, tithymalus aliaque plura §. VIII. recensenda; vel ob vim *inspissantem*, sive *obstruentem* vel *narcoticum* noxia deprehenduntur, adeoque vegetabilia acidi saporis tuto tam in esca, quam in medicamentis adhiberi solent.

8. Veteres etiam a qualitate vel nimis *calefaciente* aut *frigefaciente* venena in *calefacientia* & *frigeficientia* diviserunt; quæ divisio, licet a quibusdam ut inutilis prorsus rejiciatur, certo tamen modo & certis in malis retineri potest, dum quædam refrigerantibus, alia calefacientibus remediis curanda. Prisci quamplurimis venenis *qualitates occultas* adscripserunt; quarum vero naturam maxima ex parte hodie satis manifeste demonstrare possumus, ut ex sequentibus uberius patebit. Quoniam vero omnia illa venena gravia mala & quam sæpiissime ipsam mortem concitant, de præcipuis una cum eorundem medendi ratione hic nunc acturus sum.

IV.

*Natura
eorum ex-
ponenda.*

Antequam vero ulterius hoc in argumento progrediar, diversa hæc venena §. III. *adhuc paullo intimius* hic perscrutanda atque *exponenda esse existimo*, ut natura eorum & quomodo agant, melius perspecta, in curatione eorum, ad ductum sanæ rationis, tanto curatius, eo certius progredi queamus, cum veteres varique adhuc recentiores in eis curandis empirico fere tantum modo, & sæpius sine omni ratione egerint, & quidquid antecessores contra hoc vel illud venenum laudaverunt, id & ipsi ad eorum ductum commendaverint.

V.

*Rodentia
quomodo
agant.*

RODENTIA igitur venena sunt corpora acria, fluida vel solida, gradu quidem acrimoniæ diversa, sed ita tamen acria, ut in ventriculū & intestina, vel sub cibi, potus aut medicamenti nomine delata, vel etiam casu aut per errorem

rorem ingesta, particularum suarum figura acuta, rigida, ancipite, pungente & scindente, hæc viscera irritent, pungant, vellicent, secant, inflamment, erodant, exculcerent, ac tandem *gangræna* & *sphacelo* inductis corrumpant ac destruant. Hinc quia in partibus internis fere ut *medicamenta caustica externa* in cute agunt, hæc *venena interna rodentia, corrodentia, caustica & adurentia* dicuntur. Itaque effectus illorum in corpore humano sunt, ut primo irritatis, & arrosis ab eis fibris faucium, œsophagi, ventriculi atque intestinorum nerveis, oriantur in hisce partibus ardor, inflammatio, dolores acutissimi, nausæ, spasmus, vomitus, singultus, convulsiones, tremores, fluxus alvi serosi, subinde cruenti, quandoque & purulenti, ac foetidissimi, pro illorum venenorum varietate. Deinde autem, *quando partes eorum in sanguinem penetrarunt*, non solum acrimonia sua, irritando valia sanguifera, varias in œconomia corporis & præsertim cordis, arteriis, pulsu, respiratione, ac sensibus turbas & febres concitant, verum sanguinem & serum pervertendo, coagulando ac destruendo, gravissimis symptomatibus, doloribus, anxietatibus, interitum tandem corpori inferunt.

VI.

ACIDA vel ALCALICA hæc §. V. *rodentia sunt venena*, utraque acerrima, atque eadem fere ratione & solidas & fluidas corporis nostri partes afficiunt: tamen, quia contrariam fere curandi rationem exigunt, probe a se invicem sunt distinguenda: dum *acida alcalicis, alcalica vero venena acidis* potissimum remediis destruuntur. *Sunt vel acida vel alcalica.*

VII.

VENENA igitur **ACIDA** pleraque, si non omnia, sunt *Natura artificialia*, ut *spiritus omnes acidi*, ex mineralibus parati, *acidorum*. iusto majori copia assumpti, ut spiritus sulphuris, & qui hujus soboles sunt, spiritus vitrioli, & aluminis, item spiritus nitri ac salis, & quæ rursus ex his fiunt, aqua fortis, aqua regia, oleum vitrioli, butyrum antimonii. Præterea *sales metallici*, ut mercurius sublimatus, mercurius præcipitatus, albus, ruber, viridis, turbith minerale, arcanum corallinum, vitriolum, præsertim veneris, argenti, qui lapis infernalis vocatur, aliæque ex his producta acriora, quæ partes, quas attingunt, sua acrimonia lædunt, irritant, erodunt, discindunt, destruunt & speciatim *sales metallici horrendas nausæas, vomitus, anxietates, tremores, convulsiones, pessimæque alia mala inducunt.*

VIII.

ALCALICA vero venena sunt partim *naturalia*, partim *artificialia*. *Naturalia* in vegetabili potissimum regno deprehenduntur, ut *aconitum sive napellus, helleborus* uterque, *cicu-* *Alcalico-rum.*

ra (a) & *anathe* succo viscoso, croceo (b), *laureola* sive *mezeri* bacca, grana *coccignidii* etiam dictæ, scammonium, rithymali, euphorbiæ, apocyna, colocynthis, helleboroides Boerh. cristophoriana, ranunculi & clematitides urentes, nicotiana, fungi quidam acres venenati, corona imperialis bulbi hyacinthi, colchici, &c. Quo & certo modo arum, arisarum atque omnia fortiora purgantia & emetica referri possunt, si nimia copia ingeruntur: quia in omnibus his sapor acris, sal acre alcalinum indicans, linguam, fauces, œsophagum, immo & ventriculum & intestina acrimonia sua arrodens & inflammans percipitur. Deinde adhuc varia venena sunt alcalica sponte vel arte producta, ut primo quæ putrefactione oriuntur, ex oleis putrefactis olivarum, amygdalar. multisque aliis, itemque ex putrefacto butyro, lardo, pinguedine aliisque animalium partibus ac humoribus putredine corruptis, quæ assumpta acerbissima sæpe mala concitare solent.

Deinde quedam venena alcalica ignis vi producantur, ex sale alcali, (ut cineres sunt clavellati) & calce viva, quæ lapides caustici appellari solent, externe in chirurgia sæpe utiles. Præterea ad venena alcalica etiam pertinent nonnulla animalia, & præsertim insecta; ac nominatim *canibardes*, quæ interne sæpe gravia mala inducunt, ac denique *morsus animalium*, *venenatorum* vulgo dictorum; ut scorpionum, apum, vesparum, araneorum, serpentum, speciatim viperarum & canis rabiosi.

I X.

*Mechanica
corum.*

Tandem ad venena rodentia & scindentia, *mechanica illa* §. III. *adamæ* scilicet, *crystallus* & *vitrum* radius contusa, aciculæ, cuspis cultelli & similia etiam referenda, quæ vero quomodo agant, supra jam indicavimus, curatuque sunt difficillima.

X.

*Obstruentia
venena
qua?*

Ad OBSTRUENTIA VENENA pertinent *gypsum*, calx, aliaque corpora calciformia, *cera preparata ex plumbæ*, ut plumbumustum, *litargyrium*, *cerussa*, *tutia*, *lapis calaminaris*, *minium* & similia, item *saccharum saturni* & *vinum litargyrio imprægnatum* aliaque ex *plumbo* vel *saturno*, aut & ex *stanno* producta: quæ vasa & præsertim lactea, aliaque in ventriculo & intestinis absorbentia, una cum glandulis harum partium vehementer adstringunt, obturant, eoque ipso dolores colicos acerbissimos, convulsiones, debi-

(a) De *cicuta* effectib. vid. *Wepffer* de *cicuta* aquatica.

(b) De hac vid. notabilis observ. in *Wielii* observ. Med. 43. quæ iuxta brevi duobus mortem intulit.

debilitates, paralyfes, animi deliquia, tabem & atrophiam aliaque funesta mala inducunt: immo & *fumus & pulvis plumbeorum* respiratione attracti, asthma, tabem aliave mala metalla hæc tractantibus (a) & figulis (b) concitare solent. Ad obstruentia etiam a nonnullis *mespilla immatura*, aliaque similia fortiter astringentia referunt. Deinde corpora illa, *quæ vim habent humores nostros nimis inspissandi*, ut oscula vasorum minorum & speciatim lacteorum aliorumve absorbentium in primis viis transire nequeant: sicut sunt *fungi quidam venenati*, glutinoso viscido succo abundantes, *viscum arboreum varium*, *semen psyllii*, sanguis tauri & similia varia.

XI.

Inter NARCOTICA & stupefactiva sive soporifera primarium est *opium*, adeo decantatum, deinde *hyoscyamus*, *scopolanum* & inprimis *furiosum*, *Bella donna* dictum, *stramonium* sive *datura*, *cynoglossum*, *mandragora*, *solium*, *lupulus*, *cannabis* &c. *spiritus vini* & omnia inebriantia; in quibus sal alcalicum, idque volatile, cum narcotico sulphure prædominatur, quod non tam vi rodendi, ut cætera §. VIII. nocet, verum motus in sanguine auctos, postea nimios, atque ope horum primo hilaritatem, vires auctas, stimulum in venerem, tandem soporem, sentiendi facultatem ablatam, deliria, stuporem, spasmos, convulsiones, fatuitatem, aliosque pravos effectus producere videtur; id quod uberius ex curatione horum malorum probatur: dum *efficacissima remedia* contra soporem aliosque effectus opii, solani, hyoscyami, solii & ebrietatis, sive ea vino sive spiritu vini, sive etiam cerevisia inducta fuerit, sunt acida, ut *acetum*, *succus citri*, cremor tartari, aliaque fere quæcumque, larga satis copia assumpta.

XII.

ANIMALIUM VENENA pleraque morfu potissimum nocent, ut *serpentum*, *viperarum*, *scorpionum*, *sarantule*, *araneæ*, *apum*, *vespæ*, *canis* aliuvæ animalis *rabiosi*, quando scilicet ipsorum saliva venenata, dentibus adhærens, cum ipso sanguine per vulnus morfu factum communicatur, quod *venenum non acida, sed alcalica* & speciatim *saponacea* esse indolis, varia suadent phænomena, & præcipua eorum, *vipere* nimirum & *animalium rabiosorum*, funestissima inducunt symptomata, immo sæpe mortem. *Cantharides* vel justo majori copia intus usurpatæ, vel exaus ad vesicas exci-

(a) Vid. *Stocksius* in libello de lithargyrii fumo noxio.

(b) *Timæus* in casib. Med. Lib. VII. cas. X. & *Ramazzini* de morb. artif.

excitandas largius aut diutius adhibita, in quibusdam *ardorem vesicae*, ut ipse observavi, & quandoque ipsum mi-
ctum cruentum cum *gravibus doloribus* inducunt; id quod
a sale alcalico acri ac volatili, quo omnia fere ejusmodi
insecta abundant, deducendum est. *Ova barbi piscis come-
sta*, licet piscis ipse sine noxa assumatur, vehementia tor-
mina, choleram aliaque veneni vel purgantis fortioris assump-
ti symptomata aliquot exemplis ostendit TIMEUS; (a)
id quod & *mytulos* comestos nonnullos quandoque facere,
praeter alios, adhuc nuper peculiari scripto Medicus doctus
Bruntwic evicit. (b) *Hirudines* sive *sanguisugae* in potu
aquae vel alia ratione forte deglutitae, oesophago vel etiam
ipsi ventriculo se affigere, haecque partes vulnerare, vomitu
cruentum & mortem ipsam inducere possunt. (c)
Tacemus nunc multa *alia animalia*, quae a veteribus Grae-
cis aut Romanis *inter venenata sunt relata*; quia apud nos
vix vel numquam occurrunt.

XIII.

*Diagnos
veneni ac-
cepti.*

Hominem venenum sumpsisse vel accepisse, ni forte id jam
effatu aegri vel adstantium constet difficillime cognosci po-
test; quia saepe sponte in hominibus oriuntur morbi ac sym-
ptomata, & cumprimis *cardialgia*, *colica*, *cholera*, &c. qui
similibus fere malis stipantur, ac si a sumptis vel datis ve-
nenis oriantur. Interea tamen *conjecturis probabilibus ali-
quem venenum accepisse generatim suspicamur*; quando quis
antea sanus, mox a cibo, potu vel medicamento sum-
pto, saevis obruitur symptomatibus, ac speciatim virium
subita prostratione, magna cordis anxietate, respiratio-
ne molesta, inusitato ac vehementi ardore in faucibus,
animi deliquiis, cordis palpitatione aut tremore, dolori-
bus vehementibus ventriculi atque intestinorum, saepe nau-
sea & vomitu enormi, *cardialgia*, faciei colore livido, lin-
gua ac labris, corporis extremis & praesertim unguibus ni-
gricantibus, vertigine, oculis torvis, deliriis, sudore frigi-
do, maxime circa frontem ac tempora & similibus; spe-
ciatim a *rodentibus sive causticis*, *cardialgia*, *ardore ventri-
culi*, *nausea* & *cholera enormi*, subinde etiam *alvi fluxibus*
maxime dolorificis, iisque modo serosis, modo cruentis, cum
anxietatibus praecordiorum, respirazione anxia & inquietudi-
ne, affliguntur, immo & haud raro intumescencia ventris
& simi-

(a) In casib. Medic. Lib. III. cap. VII.

(b) *Behrens* in Epist. de *Affection. a comestis mytulis*, ad celeb-
Werbos. Hannov. 1735. 4.

(c) Ejusmodi exemplum videri potest in *Timei* casib. Med. Lib.
VII. cas. XIX. Pura legi possunt in notis *Stentzelii* ad *Linde'solpium*
de venenis, pag. 134.

& similibus. *Veneri alcalici assumpti signa sunt* ardor linguae, faucium & ventriculi, calor p. n. sitis vehemens, tormina ventris sævissima, nausea, hypercatharsis, singultus, respiratio anxiosa, gangræna & sphacelus intestinorum, fætor, animi deliquia, & a nonnullis, ut cicuta, aconito, hyoscyamo, mentis alienatio, sensuum perversio, & convulsioniones. *Veneri obsæruentis indicia & effectus præcipuos* §. X. jam proposui. *A venenis narcoticis* sumptis delirant, rident, saltant, varias gesticulationes sæpe faciunt ludicras, in soporem profundum incidunt & convulsionibus etiam sæpe tentantur, &c.

XIV.

Pro diversitate vero ægrorum eorumque corporis habitu non omnes æque vehementer eodem veneno afficiuntur, sed quidam levius, quidam vehementius, quidam brevi sæpe moriuntur, quidam vehementer ægrotant, alii minus, aut omnino sine omni detrimento, vel saltem uno alterove vomitu evadunt, licet quandoque idem venenum & ex eodem vase assumerint. Hinc patet, nullum certum aut definitum tempus actionis veneni, ut quidam existimant & perhibent, determinari posse. Dignoscere autem post mortem utrum quis veneno interfectus, an ab alia causa mortuus sit, nisi res venenata in ventriculo aut intestinis reperiantur, quoque difficillimum est: interea tamen in eis, qui causticis intercepti sunt, ventriculus intus erosus & sanguinolentus conspicitur, & sæpe arsenicum aut mercurius sublimatus, forma pulveris albi in eo reperitur; qui pulvis si prunis injectus alium redolet, arsenici iudicium est. Sed cum hæc res ad Medicinam forensam pertineat, hic plura de ea non dicemus.

XV.

Quod ad prognosin attinet, si venenum sumptum esse novimus illiusque natura nobis perspecta est, facilius æger ab eo liberatur ac restituitur, quam si illud ejusque indoles, hoc est vera causa Medico occulta sit. Quæ chemicis artibus producta, quia cito erodunt ac destruunt ventriculum, ex vehementissimis sunt, ideoque ventriculus quamprimum vomitu tepida concitato, ab eis liberandus est. Qui brevi ab assumpto veneno materiam venenatam vel sponte natura, vel ope tepidæ aliorumve idoneorum remediorum, evomunt, facilius evadunt, quam ubi manet. Venena que non mature & mox in principio, idoneis remediis expugnantur, vel insanabilia fiunt, vel morbos lentos ac diuturnos, præcipue languores & paralyfes insanabiles, post se relinquunt. Quorum ventriculus, quando venenum accipiunt, cibis, ilque oleosis vel pinguibus est infarctus, minus a venenis rodentibus afficiuntur; hinc jejuni plerumque vehementius.

mētiū celerius inde laeduntur, quam bene paſti. Quibus *gangrena & ſphacelus* a veneno interne inductus eſt, pereunt: *Infantes pueri, & gravida*, præſertim teneriores, plerumque durius a venenis affliguntur robuſtis; licet quidam contrarium ſentiant. Qui a ſumpto veneno *ſenſus & motum amittunt*, aut tremore, convuſſionibus & animi deliquiis ſæpe tentantur, item quibus externa livent & frigent, cum ſumma cordis anxietate, reſpiratione difficili, oculis torvis ac turbidis, periculouſſimo ſunt in ſtatu. *Mechanica illa* §. IX. & *obſtruentia calciformia ac ſaturnina* difficillime & vix expugnantur, quamvis non cito, ſed tarde occidant. *Qui ab animali rabioſo morſi ſunt*, & tristes fieri atque male ſe habere incipiunt, lucem fugiunt & humida averſantur, in magno verſantur periculo; nam *hydrophobia* tunc ut plurimum inſtat, qua plerumque moriuntur.

XVI.

In curandis venenis, quia valde diverſa ſunt, ſemper ad *Curatio veneni*, ſi notum eſt, *naturam* §. V. ad IX. *reſpiciendum*, & ſecundum illorum naturam ac diverſitatem per contrariam curatio eſt inſtituenda: ita, ſi in tempore advocamur, & mox neceſſaria adhibemus, ut plurimum quam efficaciffime ea ſuperabimus. Attamen quia *venena non ſemper nobis mox patent*, præſertim ſi ab hominibus ſcleratis clam ægris exhibitæ fuerunt, prudenti ſymptomatum perſcrutatione & conjectura opus eſt. Quando enim quis ejuſmodi inſolitīs ſymptomatibus §. X., vel plures ſimul, qui eodem cibo vel potu ſunt uſi, iis athi- ciuntur, quæ veneni ſuſpicionem Medico incuriunt, veneni ingeſti magna eſt ſuſpicio, adeoque *generalis indicatio hic eſt, venenum*, vel ſaltem acre irritans illud, quam primum fieri poteſt, & quidem per viam breviffimam, vomitu ſcilicet *eſſe ejiciendum*: id quod optime plerumque fit hauſtu largo *aquæ tepidæ ſimplicis* ſæpius & copioſe repetitæ, irritatis ſimul, ſi vomitus ſponte mox non ſequatur, *faucibus ope digiti* vel plumæ, quæ aqua a vetuſtiſſimis Medicis jam ut magnum antidotum adverſus multa venena commendata eſt: dum partim evacuat, partim acre temperat, & expurgat, præſertim ſi, ubi dolores circa ventriculum adſunt acuti & rodentes, oleoſa & pingua, ut *olei olivarum* vel lini, vel amygdalar. dulc. vel butyri uncia circiter in quovis hauſtu & quoties vomitu rejicitur, ei admiſceatur; vel & ubi veneni acerrimi ſuſpicio eſt, *merum oleum* larga copia detur. *Loco aquæ ſimplicis* etiam *julecula vel decoct. hordei aut avenæ*, cum pingui- bus illis vel ipſum etiam *lac tepidum*, dari apte poſſunt, donec omne venenum tam per ſuperiora quam inferiora re- jectum ſit: id quod *clyſteres* quoque ex his, vel etiam *lacte & oleo parati* egregie promovent. Poſtea quia ægri ut pluri-

plurimum his valde debilitati sunt, roborantia & cardiaca quædam, tam ex culina & cella, ac præsertim bona juscula atque usus, vini generosi, quam ex pharmacia, ægrisdanda.

XVII.

Quod si vero *venenum sumptum sit cognitum*, & utrum *Curatio & venenum cogni-*
rodentium acidorum aut alcalicorum, an ex obstruentium, *sum.*
adstringentium aut narcoticorum sit genere, illudque haud adeo diu sit ingestum atque sic adhuc in primis viis hæreat, præmisso vomitu §. XVI. remedia ea præcipue sunt adhibenda quæ *simul naturæ veneni sunt adversa*, ut sic eis illud, quod forte omne ejici non potuit, tanto citius & melius enervetur, atque tandem omnino per contraria sua cortigatur ac destruat, ne nocere amplius queat.

XVIII.

Igitur, ubi *venena ingesta sunt acida*, ut aqua fortis, spiritus, acidi minerales, mercurius sublimatus, præcipitatus, *Si acti-*
vel alia supra §. VII. nominata, *dum.* *alcalica* aquæ vel jusculis pinguibus ac sorbitionibus §. XVI. laudatis, sæpeque assumendis, *admiscenda, vel etiam his interponenda*, ut oleum tartari per deliquium, vel cineres clavellati, lapides cancrorum, conchæ, corallia præparata, aliaque similia. Speciatim vero *arsenici antidotum* crystallus montana, præparata, *mercurii vero sublimati*, oleum tart. per deliquium celebratur, **GARDANUS** quinque, qui hunc sumplerant, *solo lacte* frequenter dato servavit. (a) Vel loco horum *olea pura* largiter ingeri, vel illis etiam interponi possunt. *Si venena hæc etiam ad intestina transferunt*, id quod dolores sævi in eis percepti indicant, *clysmata* temperantia, & cumprimis ex lacte, melle & oleis parata atque sæpe injecta, evacuandi & temperandi scopo profunt; ubi etiam *potiuncula laxantes*, ex decocto passularum cum manna paratæ & aliquoties sumptæ, egregie conveniunt, qua de re uberius vid. *Wepfer. lib. de cicuta* aquat. Cap. 23. de curatione. Denique ad *doloris vehementiam* mitigandam ceteris remediis subinde aliquid *stomacica* interponi potest.

XIX.

Sed si *venenum sit alcalice rodentis & urentis naturæ*, ut *Si alcali-*
salia alcalica fortissima, helleborus, (b) acotium live *napellus*, cum
ananshe succo viroso, *cicuta*, *euphorbium*, *tithymalus*, *colocyn-*

[a] Lib. de venenis III. Cap. 3.

[b] Præter multos veteres *hellebori antidotum præstantissimum esse* acutum vel *succum citri* aut *limonum*, **LISTERUS** quoque in comm. ad Aph. Hipp. Sect. V. Aph. I. docet: *unde patet ejus virulentiam in sale aleatico caustico consistere.*

Iocynthis, *elaterium*, *scanthonium*, *laureola*, & similia, quæ intestina & fauces erodunt & inflammant, atque etiam mentem sæpe turbant; tunc præmisso vomitu, *aquosorum tepidorum* largo potui admiscenda, immo & interponenda sunt *acida copiosa* & speciatim *acetum bonum* quodcumque, quod cum aqua mixtum *oxycratum* constituit, propterea ab antiquis temporibus jam a tam multis scriptoribus, tamquam multorum venenorum potens antidotum, atque hoc non sine ratione, celebratur; deinde & *succi acidi fructuum heræorum* recentium, præsertim *malorum citriorum*, *limonum*, *aurantiorum*, *ribesiorum*, *berberis*, *cerasorum* acidorum, addito pauxillo *sacchari* vel *mellis* ad gratiam, vel & herbæ *acetosæ*, *granatorum* aliorumque similium, vel etiam *syropi inde confecti*, ut *acetositatis citri*, *ribesiorum*, *berberis*, *granatorum* &c. largiter assumpti, donec acre alcalicum omnino sit destructum. Loco horum etiam *oxycratum cum melle*, vel ipsi *spiritus minerales acidi*, quo & *elyssus antimonii* pertinet, immo & ipsa *aqua fortis*, quæ nihil aliud est, quam *spiritus nitri*, & quæ largius sumpta sanis venenæ esse supra diximus, his in casibus, si modo satis aqua diluta sunt, fiunt antidota; sic ut mirandum non sit, quod veteres quædam pro venenis habita, ut aqua fortis & spiritus illi acidi, &c. subinde tamen antidota contra alia venena commendaverint, (*) quod multi olim capere vix potuerunt. Speciatim pro *cicute antidoto* DIOSCORIDES laudat *vinum putum* largiter sumptum. In his venenis, quando ægti initio non vomunt, ut vomitus facilitetur, *tartari emetici*, vel *virrioli veneris* grana ij. vel iij. cum *syropo* & aqua multa tepida dari apte possunt. *Decocti tamarindor.* cum cremore tartari & manna, itemque *seri lactis* potus copiosus, *lacti ebutyriati*, immo & *ipsius lactis*, hic etiam egregie confert, subjunctis in fine roborantibus & theriaca. *Purgantia fortiora* ejusdem fere sunt indolis, eorumque violentia in hypercatharsi vel hyperemesi his quoque cohibenda.

XX.

Si ob- *Si venena sunt ex obstruentium, inspissantium sive coagulantium classe, ut viscum, semen spyllii, saccharum satorni, vinum lithargyrio corruptum, hæc diluenda, dissolvenda & evacuanda, diluentibus aqueis, incidentibus, attenuantibus, sero lactis, aquis medicatis, salibus mediis, immo si saturnina, ipsis mercurialibus, quæ plumbum solvere & mobile reddere valent. Mechanica & nominatim adamas vix*

Si ob-
struent vel
mechanica
cum.

[*] Ut Plinius Hist. Nat. lib. 27. Cap. 2. Aconitum.

vix medelam admittunt, præsertim cum ipsum datum esse Medicus haud facile comperiet. Cætera autem vix aliter quam inviscantibus, pinguibus, oleosis, pultibus, ex oryza aut sagopyro, jusculis, emulsionibus & lacte corriguntur. *Calx* vel *gypsum* assumptum curantur vomitu aqua repida cum oleo aut butyro excitato, postea diluentibus & mucilaginosi modo laudatis.

XXI.

Sint ex *narcoticorum* & *soporifexorum* familia, §. XI. ut opium, hyoscyamus, cynoglossum, solana, Bella donna, &c. quæ sensus turbant, atque etiam *alcalico* & *sulphureo narcotico principio* gaudent, præmissis emeticis, §. XIX. & in plethoricis larga venæ sectione, ea quæ excitant, ut extus volatilia & *acetum*, præsertim calidum, naribus sæpe cum spongiola ac pulsibus adhibenda, intus vero sæpe *acetum* quoque calidum aut *succi citri*, *limoniorum*, vel *aurantiorum* & similes §. XIX. cum aqua calida, vel infuso theæ aut coffeæ sæpius danda, quæ valentissima horum, ut & inebriantium, ac sopore inde orto, sunt antidota, præsertim si ægri sæpius moveantur, atque vellicentur, donec expersiscant, non neglectis excitandi gratia *clysteribus acerbis*: denique in regimine sudorifero aliquandiu continendi.

XXII.

Quando venena jam in sanguinem penetrarunt, id quod potissimum patet, si anxietates & palpitaciones cordis adsunt vehementes, & sensus plus minulve læsi, tunc præter largum usum infusorum, aquosorum calidorum ut coffeæ, theæ, scordii, salvie, contra venena acida, alcalica, theriaca, vel & spiritus salis ammoniaci, modica, sed sæpius repetita dosi exhibenda; contra venena vero alcalica, acetum simplex vel compositum quoddam, *succus citri*, *limoniorum* vel *aurantiorum*, vel mixtura simplex & similia, cum regimine diaphoretico; quo scopo etiam balnea, a Celso aliisque jam commendata; egregie prodesse possunt.

XXIII.

Destructa vero sic tandem veneni violentia, id quod ex symptomatum remissione & sensuum restitutione potissimum patet, omnis generis roborantia, ut bona juscula, emulsiones, gelatinæ, mucilagines hordei, avenæ, sagopyri, oryza, ova forbilia, theriaca, vinum generosum cum blandis aromatibus, aquæ cardiacæ, quies mentis & corporis conducunt.

XXIV.

*De Ovis Barbi piscis, Mytilus venenatis, Cantharidibus
& Hirundinibus assumptis.*

*Curatio
veneno-
rum ex
regno ani-
malium*

Ova barbi piscis §. XII. comesta, si choleram cum ventris torminibus faciant, sicut in alia cholera, copioso potu jusculi vel aquæ tepidæ, cum vel sine oleo mixtæ, acrimonia irritans illorum est eluenda atque evacuanda; postea aliquoties theriacæ ʒss. cum vino mero calido, vel cum aqua menthæ aut cinamomi danda, donec symptomata quiescant.

Si qui theriacam metuant, vel ægri eam aversentur, vinum calidum cum pipere vel cinnamomo exhibeatur. Ita si quis a *mytilis comestis* brevi nauseam & dolores ventriculi sentiat, proderit mox, sumpto quodam emetico, superingesta aqua vel mulsa tepida, vomitu eos e ventriculo expellere, & postea ventriculum theriaca ac vino mero calido, tamquam omnium fere venenorum antidoto, rursus roborare.

Si vero vomitus vel cholera jam adsit, ut in ovis barbi piscis posuimus; & hæc curanda. Si a *cantharidibus* assumptis mala netuuntur, proderit ipsas protinus vomitu, aqua tepida concitato, addito simul oxymelle vel simpliciori vel squillitico, rursus ejicere, vel & decocto tamarindorum cum cremore tartari per alvum expellere. Sin vero jam ardorem ac dolores in vesica induxerint, siue intus fuerint assumptæ, siue extus tantum applicatæ, lac bubulum largiter haustum præstantissimum eorum est antidotum, dolores brevi leniens, vel si in febribus acutis id contingat, emulsiones ex sem. 4. frig. largiter hantæ. Ad *hirudines* siue sanguisugas a puero deglutitas §. XII. interficiendas, TIMEUS cas. Med. Lib. VII. Cap. XIX. muriam cum aloe bibendam, & simul decoctum anethi cum oxymelle simplici vomendi scopo præscripsit; quæ profecto satis apta ad hunc usum videntur: interea tamen æger ille ex superveniente epilepsia mortuus est. Forte oleum olivar. aut aliud quoddam hujus naturæ largiter assumptum, cum vermes aliaque insecta interficiat, etiam has certius occideret, & læsiones inde inducias reficeret.

XXV.

De Morsibus Viperarum & Serpentum.

*Forum
que mor-
su infe-
runt.*

Sequuntur tandem medelæ illorum animalium, quorum punctura siue morsus venenatus est, ut sunt morsus viperarum, quorundam serpentum, itemque scorpii, canis rabiosi, alio-

aliorumque similium §. XII. *Vipera* quidam comestæ, aut in medicina adhibitæ, nihil quicquam mali inducunt, sed *morsu tantum nocent*, (a) & gravissima brevi mala concitant; atque nisi celeriter succurratur, læsi inde pereunt. *Curatio* hætenus iis, qui communem cum viperis patriam habent, consueta & maxime commendata in ejusmodi læsionibus fuit, ut mox supra vulnus *ligatura* applicetur, deinde vulnusculum scalpello amplietur, *sanguis* probe digitis inde *exprimatur*, vel *cucurbitula* aut ore sani hominis, ad modum *Psyllorum* extrahatur: deinde vel aqua falsa, vel aceto & theriaca, vel & spiritu vini cum theriaca, venenum e vulnere probe eluatur; postea hoc aceto & theriaca repleatur, splenium vel linteum emplastri loco, eodem remedio imbutum, vulnere superimponatur, ut virus hoc tanto melius destruat, idque primis diebus sæpius renoveatur. *Linderus* (b) suadet, ut spiritus sulphuris vel vitrioli gutta, ad venenum hoc alcalicum tanto promptius destruendum, ejusmodi vulneribus instilletur. Internè vulnerato *theriaca quoque cum vini generosi* largo haustu, quod teste *CELSE* fere omni veneno contrarium est (c), vel etiam cum aceto, sæpius detur, injuncto postea sudore in balneo, vulnere aperto, qui deinceps promovetur & utiliter conservatur infuso *scordii*, vel *salviae*, (d) addito aceto vel succo citri, sæpius assumpto: id quod per aliquot dies, donec symptomata periculosa præterierunt, repetendum atque continuandum, ac denique vulnus balsamo vulnerario glutinatur.

STENTZELIUS post *morsum viperatum & scorpionum*, facta prius vulneris dilatatione & purgatione, commendat ut demorsus *clyssi antimonii sulphurati* quovis bihorio ad gutt. xxx. vel xl. ex infuso oxylapathi sumat, ita ipsum ab omni incommodo liberum esse permanens asseverat. *Serpentum aliorum morsus* eadem ratione curandos præcipiunt.

XXVI.

Sed recentiores, ut de *radice mungos Kempferi* nunc nihil dicam, qui hanc pro certo contra hos morbos specifico describit, (e) duo alia remedia, tamquam certissima illorum

*Novus
hos cu-
randa mor-
bus.*

T 4

anti-

(a) Ut iam *Celsus* L. V. Cap. 27. *Lucanus* Lib. IX. *Pharsal. Rbedius* obs. & exper. de *Viperis* aliique docuerunt.

(b) Lib. de venenis.

(c) Lib. V. Cap. 27. num. 2.

(d) Forte & *achii* infusum hic proderit, cum nomen e græco *αχίς* *vipera*, cum demorsus a *vipera* auxiliari existimetur. *Tournes.* *Instit.* 136.

(e) In *Amœnit. exoticis*, pag. 577.

antidota celebrant; quorum alterum est *axungia viperarum*, quam Clar. Anglus *Meadius* certissimum ad hos morsus remedium, si modo vulnere illinatur, nullaque alia medicina interna opus esse asseverat: (a) Alterum est *oleum simplex olivarum*, ab Anglis quoque observatum & eodem modo usurpatum, quod & toti membro læso illini potest; sicut id uberius exposuit cel. VATERUS, in diss. de Antidoto novo *adversus viperarum morsus*, Vitebergæ 1736. edita. Magnopere optandum, ut experientia stupendus hic effectus tam vilis, domestici & ubique obvii remedii, uberius confirmetur & extra dubitationem vindicetur.

XXVII.

De Scorpii, Apum, Vesparum & Aranearum puncturis, itemque de morfu Canis rabiosi.

In *Scorpii punctura* veteres contritum scorpionem ad venenum ejus extrahendum cum fructu supra vulnus imposuerunt (b); id quod adhuc facere solent, ubi hæc animalia & læsiones sæpe occurrunt. Alii *oleum scorpionum* cum oleo olivarum paratum, ut certum antidotum commendant, vulnere instillandum eive illinendum, id quod forte *oleum olivarum simplex* modo §. XXVI. ad viperæ morsus laudatum, quoque præstabit, præsertim si certum est, quod serpentum & viperarum morsus tam egregie sanet. Ad *apum*, *vesparum*, & *aranearum* ictus curandos, *acetum* vel *simplex* vel *rutaceum*, aut *cum theriaca*, aut *bolo mixtum*, imponere egregie prodest. Alii commendant ut locus læsus dissecto pyro tantum vel pomò bene fricetur.

In *morfu canis aliufve animalis rabidi* quid sit faciendum supra jam pag. 204. & in institut. chirurg. pag. 114. docuimus. KÆMPFERUS etiam hic *radicem mungos* ut infallibilem prædicat, in bruiis æque ac hominibus, multis successibus comprobata, loco modo §. XXVI. citato.

Qui plura de venenis scire desiderat, ex *veteribus* Dioscoridem, ex *recentioribus* MEADIUM, (c) LINDERUM, (d) STENTZELIUM (e) & Lindestolpium (f) evolvere potest.

C A.

(a) Lib. de venen. anglico, p. 29.

(b) Teste Celso Lib. 2. Cap. 27. num. 5.

(c) Lib. de venenis.

(d) Lib. De Venenis, Lugd. Bat. 1708. 12.

(e) In *Toxicologia*, sive Lib. de Venenis Francof. 1733. 4.

(f) De venenis, (qui idem esse videtur ac *Linderus*) cum notis *Stentzelii*, Francof. 1739. 8.

CAPUT XX.

De Aquarum medicatarum natura & usu.

I.

A Quarum medicatarum natura & legitimus iis utendi *Natura*
 modus, ob frequentem atque maxime salutarem hodie *aquar.*
 earum usum, & insignem in Medicina utilitatem, Medico *medicat.*
 probe debent esse perspecta. Hinc 1. nosse debet, eas esse *scitu no-*
 vel calidas, quæ *therme* vocantur, ut in Germania *Wisba-*
denses, *Emsenses*, *Aquisgranenses*, in Bohemia *Caroline* &
Toeplicenses, &c. atque in aliis Europæ partibus aliæ; vel
 frigidas. Utræque rursus sunt vel aquæ tantum purissimæ, ut
 ex frigidis *Peterwaldenses* in Silesia aliæque, & ex calidis,
Toeplicenses in Bohemia, ambæ tamen magnæ in sanitatis
 negotio utilitatis. Vel *blando sale* medio, aut *alcalico*, &
 terra alcalica præditæ sunt, ut *Selserenses*, *Antoniana*, sive
Tönnigstemesen, & *therme varie*; vel simul *martialibus*
 particulis, & ipso vitriolo martis imprægnatæ sunt; aquæ
martiales inde vulgo dicuntur, ut *Pyrmontane*, *Saalbacenses*,
Egrane, *Wildungenses*, *Geismarienses*, *Driburgenses*; &
 multæ aliæ. Ideoque 2. uniuscujusque *ingredientia* sive ele-
 menta scire debet, ut tanto melius de ipsarum natura & a-
 gendi ratione judicare valeat; 3. quibus in morbis *conve-*
niant, & in quibus minus; 4. quæ ratione recte *usurpanda*,
 dum a recto usu quamplurimum boni effectus dependent; 5.
 quæ *dieta* & quodnam regimen in earum usu ægris sint ser-
 vanda; & 6. *quomodo symptomatibus* in earum usu subinde
 oriundis sit succurrendum.

II.

Scriptores, qui de aquis medicatis olim scripserunt, easque *Elementa*
 obiter tantum examinarunt, ut *Tabernmontanus*, *Thurnei-*
serus, *Hornickius*, *Sebizius*, alique plures, præter aquam *ipsarum*.
 varia eis adscripserunt elementa, quæ vera iis non insunt:
 ut nimirum *vitriolum vulgare*, ob saporem atramento fere
 similem, *cuprum*, *sulphur vulgare*, *alumen*, *nitrum*, *ocbram*,
succinum, immo & ipsi *arsenicum*, pessimum scilicet illud
 venenum in nonnullis inesse, varias ob rationes crediderunt,
 atque sic multos tam Medicos, quam ægros ab usu earum
 saluberrimo temere deterruerunt.

Tot autem ac tam diversa elementa, in aquis medicatis
 saltem Germaniæ, non reperiri, sed eas longe simpliciores esse,
 ac pauca tantum & quidem nulla prorsus noxia, sed mere
 salutaria ac tuta eis inesse elementa; recentiorum industria
 dete-

detexit, aquam scilicet primo purissimam, & terram subtilissimam, alcalicam, deinde in quibuldam sal; quoddam alcalicum vel mixtum, in aliis martiales particulas, & vitriolum martis, quod spiritum acidum sulphuris aut vitrioli subtilissimum continet, quæ aquæ propterea martiales & multis acidule vocantur, sicut ex infra dicendis uberius patebit. Interea vero sciendum aquas martiales acidulas dictas, non ob spiritum acidum, licet reverà iis insit, suos effectus, ut multi putarunt, primario præstare, sed potius ob elementa alcalica, prout hoc sequentia docebunt experimenta; sic, ut non satis apte acidule dicantur: præsertim cum experientia doceat, eas in morbis ab acido & viscido oriundis, eisque quam pertinacissimis, optimo cum successu adhiberi, immo plerique medicamentis aliis palmam præripere. Igitur ad nostram hanc sententiam primo de ita dictis acidulis sive aquis martialibus probandam, (nam de ceteris minus est dubium) sequentia notanda experimenta, quæ & simul ceterarum naturam illustrent ac demonstrant.

III.

Aque martiales vel acidulæ Pyrmontane, Sualbacenses, Egræne, Spadane, Driburgenses, Wildungenses, Geismarienses, alique similes, recens ex fonte desumptæ, sensibus externis varia ostendunt. 1. Visu percipimus gratam pelluciditatem, quæ tamen coloris lactescentis vel cærulescentis aliquid cum multis bullulis continet; quibus a vulgaribus aquis valde distinguuntur; quæ vero, si pulvis gallarum eis injicitur, colorem ex atro rubentem sive fuscum assumunt.

Experi-
menta
cum his
aquis.

2. Si naribus ope vitri, recens ex fontibus haustæ, mox admoveantur, percipitur in eis volatilis quidam vapor, gratam in naribus vellicationem excitans, quem plerique olim pro spiritu acido, volatili, alii pro alcalico, spiritui salis ammoniaci analogo, haberi voluerunt: quorum tamen neuter hucusque per certa experimenta demonstrari potuit; sed nil nisi aer vel æther subtilissimus in iis contentus, qui bullulis illis inclusus, esse videtur, præsertim quando aquæ hæc ope vitri puri e fonte subito hauriuntur.

3. Gustu percipimus saporem acriusculum, gratum tamen, ad acidum vini Rhenani generosi aliquo modo accedentem, quo a simplicibus aquis valde distinguuntur. Hinc jam ab antiquissimis temporibus fontem Sualbacensem primarium fontem vinosum incolæ appellarunt, præsertim cum & multos bibentes, quando ejusmodi aquas bibunt, initio quæ ebrios & remulentos sæpe faciant.

IV.

4. Multis, & præsertim iis, qui his aquis non assueti sunt, *sapor vitriolicus* videtur, vel ad *atramentum* aliquo modo accedens, id quod etiam non est sine ratione, nam *revera vitriolum martis* ipsis inesse, idque saluberrimum, subsequutura experientia ostendent.

5. In aliis supra N. 1. nominatis aquis salutaribus, *quæ matrem haud continent*, hic *vitriolicus* aut *vinosus* sapor non percipitur, sed plus minus vel *salsus*, prout magis vel minus salibus alcalicis aut mediis abundant, quemadmodum *id aquæ Selserenses*, atque plerarumque thermarum manifeste docent.

6. Si *chemice examinantur*, & *martialium aquarum* sufficiens copia cucurbitæ immittitur cum alembico, supposito leni igne, prius ascendit vapor, qui in guttas collectus, aqua est pellucida, simplex, sine sapore aut odore notabili, nisi levi empyreumatico, quæ in vase recipiente colligitur. Superficie huic aquæ & alembico se affigit interna *pellicula subpinguis*, varii & ad iridem accedentis coloris; nullus vero spiritus, neque acidus, neque alcalicus, illo modo sic percipi aut colligi potest.

7. Si destillando pergimus, nil aliud nisi aqua, ut antea, simplex semper transgreditur, sed remanet in fundo tandem *cucurbitæ materia terrea, flavescent, & albicans, exigua copia*, in quibusdam tamen majori, in aliis minori, (a) saporis & odoris fere expers, quia maxima ex parte est *terra subtilissima* alcalica, ex qua nullum alumen, nitrum, sulphur, succinum ochra aut vitriolum cupri, vel cuprum vel plumbum, vel aliud metallum, multo minus arsenicum, aut simile quid venenati aut noxii extrahi potest; verum accuratiori examine constat, in terra illa hæreere sal aliquod amaricans, medium, ut Anglicanum, Ebsouense, vel mirabile Glauberi, in quibusdam rursus majori, in aliis minori copia, (b) & simul, quod caput rei est, *martiales quoque particulas*, quæ verus crocus martis naturalis sunt, atque fusione igne folium in verum martem, quem magnus trahit, redigi potest, nullum vero sal aut metallum vel minerale aliud. In ceteris vero aquis medicatis, *quæ non vitriolicum* aut ferreum, sed tantum *acriusculum*, sive *salinum continent saporum*, ut Selserenses, & thermæ præcipue, præsertim Emsenses Carolinz, & præterea *aquæ amara Bobanica Seidlenses*, præ-

[a] Ex libra una aquæ Egranæ gr. xxxii. Selserensis g. xxx. Pyrmontanæ gr. xxii. Sualbacensis & Spadanæ gr. x. Gonfer. *Wagener* de aquis Geismar. p. 64. [b] In Pyrmontanis in libra j. salis medii gr. vij. ad x. continentur; in Egranæ & Selserensibus grana plura; in Sualbacensibus & Spadanis, pauciora.

præter terram alcalicam, nil nisi sal quoddam continetur medium amarum, ad Glauberianum maxime accedens; aliæ vero, ut thermæ *Wishadenses*, sal quoque medium, sed magis ad vulgare sive culinare accedens, continent; Tœpicenses autem non nisi ex aqua simplici pura, ac levi constant, quamvis calide e terra propullulent.

8. Simulac *aqua martiales igne multum incallescunt*, brevi perdunt illum gratum odorem & saporem, N. III. neque a gallarum pulvere amplius tinguntur: immo ipse vapor exhalans nullum præbet vel odorem vel saporem.

V.

Si materia remanens ulterius examinatur, naturam suam alcalinam sequentibus experimentis manifestat. Nimirum quando ei spiritus acidus, ut spiritus vitrioli, affunditur, effervesceat, & spiritus acidus saporem suum acidum mutat: unde noscimus terream hanc materiam esse acido contrariam, sive acidum destruentem, hoc est, alcalicam, ut a Medicis & Chemicis vocari solet, a qua virtute & ab aqua magni ac fere præcipui salutarium fontium effectus merito deducendi.

V I.

Ut autem præterea adhuc specialius sciatur cuiusnam nature sit hæc terreæ materia, si sufficiente copia collecta & ostenditur. crucibulo indita in ignem fabrorum ferreorum satis diu, donec fundatur, immittatur, sensim per fusionem, sine alia re addita, mutatur in nigricantem sive cineream massam, quæ in pulverem redacta a magnete attrahitur, sicut limatura martis, & saporem simul habet ferreum atque subadstringentem: unde constat, revera martiales particulas quam subtilissimas, hoc est, martem, non cuprum, plumbum, aut aliud metallum noxium his aquis inesse.

V I I.

Præterea, quod virtus harum aquarum non acida, sed alcalica sit, uberius docet, si hæc aquæ cum sirupo bono violarum miscentur. Nam si acidulæ recentes, vel saltem nondum corruptæ, (id quod & de reliquis aquis medicatis valet) ei affunduntur, mox ejus color ceruleus mutatur in viridem, sicut ab aliis alcalicis. Deinde si rosæ, aut violæ, aut flores cyani in hac aqua coquantur, colorem viridem acquirunt, qualem adipiscuntur ab affuso oleo tartari per deliquium tamquam principe alcalicarum. Porro cum affuso spiritu acido & etiam cum vino rhenano effervescent, ut alia alcalica, & lac ab iis affusis non coagulatur; sed potius iis affusis diutius a coagulatione præservatur. Ex his & pluribus aliis ejusmodi experimentis satis probatum esse existimo, naturam & virtutem harum aquarum esse alcalicam, id est, acido

con-

contrariam, diluentem, resolventem, martialem ac roborantem, aperientem & diureticam, contentaque earum non adeo multa ut veteres putarunt, sed panca eaque valde esse simplicia, easque nihil de metallo noxio, multo minus venenati, neque cetera illa salia, sulphura aut mineralia continere quæ vulgo ipsis olim attribuerunt.

VIII.

In martialibus tamen fontibus etiam aliquid vitriolici inesse docet sapor vitriolicus, atramentosus, & color nigricans, si gallarum pulveri affunduntur: quod vero non est vitriolum vulgare aut cupri sive veneris, quod ventriculo & sanitati valde est adversum; sed vitriolum martis blandum, ex martialibus ab acido sulphuris vel vitrioli sub terra solutis particulis constans, idque in modica copia, a quo varii salutares harum aquarum, de quibus infra, dependent effectus. Probatum vero, spiritum ejusmodi acidum his aquis inesse, ex eo quod, si sal ex iis paratum sufficienti copia colligatur, & cucurbita igne arenæ destilletur, spiritus acidus, spiritui sulphuris vel vitrioli simillimus inde obtinetur, qui sensim præsertim in calore martem relinquit, alcalicas, & terreas harum aquarum particulas ingreditur, atque cum eis sal illud medium, amarum, quod in iis deprehenditur, constituit, facitque sic, ut vitriolum nullum; (quod quidam male per calorem volatile fieri & avolare crediderunt, quasi ferrum volare possit) inde educi queat, licet revera iis infuerit. Atque huic sapor acrisculus, vitriolicus in recentibus & color nigricans, si cum gallis miscetur, immo tota mixtura, crasis, vis purgans, mixturæ conservatio, aliaque debentur phenomena & effectus, quos multi comprehendere & explicare non potuerunt: (a) atque propterea tam spiritum hunc acidum, quam vitriolum martis in eis vel prorsus negarunt, vel tam volatilia ea statuerunt, ut a levissimo calore ea avolare crediderint, (b) quæ tamen minime volatilia existunt; sed fixa & solum transmutantur, eadem scilicet prorsus ratione, ut; quando in præparatione tartari vitriolati Takentani solutio vitrioli vulgaris & salis tartari, vel cinerum clavellatorum commiscetur, spiritus acidus, quem vitriolum veneris continebat, venerem relinquit, & salia hæc alcalica ingreditur, ita ut vitriolum postea, quod revera paullo ante adfuit, non amplius reperiri & ostendi queat, licet non avolaverit.

In martialibus inest vitriolum martis.

IX.

[a] Conf. Scipp. de Aquis Pyrmont. Wagner. de Aquis Geismariensibus, & Diss. nostra de Aquis Pyrmontanis. 1732. edita. [b] Ut Fr. Hoffmannus in dissert. de Aquis medicatis, Boerhaavius, Elem. Chem. Tom. II, Prop. 162 magni hi Medici & Chemicis existimant.

*In quibus
morbis
profunt.*

Cognitis sic veris aquarum salutarium principiis, & ratione & experientia concludere possumus, eas generatim ad humores crassos, viscidos, tenaces, pituitosos, falsos quocumque & cumprimis acidos, corrigendos, temperandos, fluxiles reddendos, atque ad obstructions referandas valere. Hinc in morbis, qui a sanguine spisso & viscido, quorum quamplurimi sunt, vel ab acidis, vel ab obstruccionibus viscerum oriuntur, egregie profunt, & inprimis etiam propterea conducunt, quia vi sua evacuante, diuretica & purgante noxios simul & supervacuos humores ex corpore, vel per alvum, per urinam, blande ac sine omni, si modice & recte usurpantur, virium prostratione expellunt. Ita in universum etiam his sunt valde saluantes, qui ob vitam sedentariam multas in corpore & praesertim primis viis cruditates sive vitiosos humores ac flatus accumulunt, omnibusque illis, qui nimio vini aliorumque spirituosorum potum abusa, sanguinem nimis aestuantem reddiderunt, vel aliam ob causam de sanguine nimis fervido conqueruntur: nam his egregium refrigerium praebent.

X.

*Speciatim
capitis.*

Speciatim vero egregie conducunt variis in capitis affectibus, inprimis qui per consensum ventriculi oriuntur; ut in vertigine stomachica & hypochondriaca, cephalalgia, morbis soporosis, comate, caro, apoplexia metum, melancholia, mania, epilepsia, memoriae debilitate, catarrhis oculorum, visus debilitate, tinnitu aurium & auditu difficili, aliisque morbis capitis, qui a viscidis, pituitosis & acidis humoribus oriuntur.

XI.

2. In variis pectoris affectibus, a similibus causis oriundis: ut in dyspnoea, asthma, tussi, immo & in ipsa haemoptysi, ubi nondum adest pulmonis exulceratio notabilis, ac denique in cordis palpitatione.

*In pectoris
& infimi
ventris.*

3. In affectibus infimi ventris, ut in soda seu ardore ventriculi, in cardialgia, vomitu frequenti, diarrhoea, ventriculi debilitate, nausea, appetitu prostrato, pica, lumbricis, malo hypochondriaco, & praecipue in principio obstruccionis hepatis aut lienis, vel saltem nondum inveterata; in scorbuto & cachexia nondum nimis inveterata, nimia obesitate, ictero; sic & in sabulo renum & parvis calculis, in doloribus lumborum scorbuticis, in ardore urinae, sive stranguria, ac denique in colica, e pituita acidâ, biliosis humoribus, aut flatibus oriunda. In variis praeterea uteri affectibus, passione hysterica, & uteri suffocatione, in chlorosi, sterilitate, menibus obstructis vel nimis fluentibus; in hæ-

mor-

morrhoidibus obstructis aut nimium fluentibus. Præterea *neg* gravidis nocet, sed potius eis multis in morbis egregie tam præservandi quam curandi scopo conducunt, si modo paullo pariori copia & circumspecte bibantur.

XII.

4. In artuum morbis, ut in *arthritide* tam simplici quam vaga scorbutica; in *podagra* non confirmata, in doloribus artuum quibuscumque, in *paralyticis affectibus*, in impuritibus sanguinis & cutis, ut *scabie*, *pruritu cutis*, gutta rosacea, herpete, serpigine, *ulceribus pedum*, *œdematibus*, tumoribus & variis in doloribus ischiadicis & rheumaticis.

In artuum morbis & febribus.

5. Tandem in omnibus febribus intermittensibus egregie profunt, quas continuato usu, si modica simul servatur dieta, perfectissime plerumque tollunt & sanant.

XIII.

Ratione ætatis hominibus *mediæ ætatis omnium quidem optime conveniunt*, nimirum ab anno 18. circiter usque ad 60. *Juniores vero*, præsertim ii, qui sunt infra annum decimum. ob teneriorem viscerum compagem, eas, præsertim martiales, minus commode ferunt, sic & *senioribus*, qui ultra sexagesimum annum, rarius satis proficue sunt, nisi forte sint robustiores, & eis ceteroquin jam assueti. Interea tamen casus & præsertim *hæctici*, ubi etiam *pueri juniores* eis, maxime *Selserensibus*, aut *Emsensibus* aliisve similibus & cum primis cum lacte remixtis, optimo cum successu sæpe usi sunt & adhuc uti possunt, verum copia longe minore quam adulti.

Ætatis consideratio.

XIV.

Verum raro proficiunt in *ulceribus inveteratis pulmonum*, ut phthisi, aliisque symptomatibus, ab ulcere tali pendentibus, *inprimis martiales fortiores*; attamen si ulcera nondum sint inveterata; & calidæ atque cum lacte temperatæ bibantur, tam *Selserenses* quam martiales, egregie sæpe profunt. Sic & in *ulcere renum* aut *vesicæ*, moderatæ & calide adhibita, valde conducunt, atque inprimis hic ab HEERIO & Fr. HOFFMANNO, experientia edoctis, *Spadana* potissimum laudantur, si diu usurpantur.

Ubi minus profunt.

In *hemoptysi*, præsertim si ab exulceratione pulmonis oritur, aquæ medicatæ & sigillatim martiales, *frigida ut plurimum nocent*; calidæ vero, ut thermæ blandiores, v. gr. *Emsenses*, & aquæ *Selseranæ*, cum vel sine lacte, repide haustæ multum proficiunt.

Abstinendum etiam a martialibus in dysenteria, in calculo renum & vesicæ majore, itemque in hydrope confirmato. *Selserenses* vero in dysenteria proficue sunt. In *œdemate* vero pedum & leucophlegmatia sive *hydrope leviori* &

maruales & thermæ, sæpe egregie prosunt. In *affectionibus veneris & gonorrhæa*, morbum quidem non sanant, attamen corpus ad faciliorem sanationem disponunt, ideo cum fructu hic etiam præparationis causa adhiberi possunt. In *gonorrhæa* vero *benigna* a laxitate partium proveniente, post multa incassum sæpe tentata, vi sua roborandi multum præstare solent.

XV.

Modus
ejus uten-
di.

Omnibus, qui aquis medicatis legitime uti volunt, & *plethorici* sunt, suadendum, ut aliquot dies *ante usum* earum, sanguinem mittant; ita enim aquæ hæ tanto facilius vasa intrare & postea reliquum sanguinem melius corrigere possunt, præcaveturque ne vasa ab aquis nimis distenta, nimio sanguine jam quasi infarcta, postea morbum aliquem producant, & deinde, ut mox dicetur, idoneo purgante utantur.

Si vero non sunt *plethorici*, venæ sectione non est opus; attamen sicuti illis, quibus sanguis prius fuit missus, ad *cruditates* in primis viis *evacuandas*, quæ effectum aquarum impedire possunt, maximæ ubi vita sedentaria vel prava diæta prægressa est, idoneum purgans est præmittendum, v. gr. ex pilulis nostris polychrestis, vel tartareis, Quercetani, Schræderi, aut Bontii, vel balsamicis gr. xiii. vel xv. ad xx. cum regimine. Vel ex *salinis*, tartarus vitriolatus, tartarus solubilis, aut cremor tartari ℥i. ℥i℥. ad ℥iij. cum aqua, vel cum ipsis aquis medicatis assumpta; quibus salilibus, si ægri sint robustiores, grana aliquot pulveris jalapæ addi possunt, vel quod hodie usitatus, *salia amara cathartica*, ut Anglicanum, Seidllicense, vel mirabile Glauberi, ab ℥℥. ad ℥iij. exhibendum.

Si potiuscula desideretur, purgans Sydenhamii vel Managettæ, aut nostra sequens apta erit.

℥i. tamarindor. ℥℥.

fol. fenn. el. ℥iij.

crem. tartar. ℥℥. ad ℥i.

ebull. per momentum in s. q. aquæ simplicis.

Colatur. ℥iij. adde

mann. calabr. ℥i. M.

Detur mane una vice cum regimine, vel

℥i. fol. fenn. el. ℥iij.

rhabarb. ℥i.

passul. min. ℥℥.

sem. anisi ℥i.

tart. vitriolati ℥℥.

infunde in s. q. aquæ simplicis tepidæ, stent per noctem in loco calido, mane leviter ebulliant, colaturæ ℥i. ℥iij. add. sirup. de cichor. cum rhabarb. ℥i. aquam cinnamom. ℥i. M.

Fu-

Fugienda hic sunt omnia *drastica purgantia*, inprimis resinosa, scammoniata, helleborata, &c.

Si indicationes ad vomitum adsint, ut dolor & gravitas ventriculi, amarities oris, nausea, conatus vomendi, aut qui alias facile vomunt, illis etiam aliquot diebus ante usum harum aquarum *lene emeticum* egregio cum successu datur: ut tartar. emet. gr. ij. vel rad. hyepacoannæ ℥j. aut gr. xxv. vel etiam aq. bened. Rul. ℥ij. aut ℥ij.

XVI.

Tempus anni, quo aquæ medicatæ optimo cum successu bibuntur, sunt Junius, Julius & Augustus; verum si necessitas urgeat, jam mense Majo, vel etiam Septembri adhuc, inprimis tempestate calidiori, commode usurpari queunt, immo in certis casibus etiam hyeme & autumnno iis uti possumus. *Tempus.*

Tempus diei aptissimum est matutinum, hora nempe septima, immo si tempus favet sexta, ut hac ratione aqua operationem suam ante prandium commode absolvere possit. Non autem probamus morem illorum, qui *hora quinta vel quarta jam ad fontes currunt*, ob aerem plerumque tunc adhuc nimis frigidum, nebulosum, transpirationi adversum, tussis aliosque pectoris & capitis morbos facile inducentem, ut & ob somnum non sufficientem, & præmature abruptum.

Nonnulli etiam a meridie hora quarta aut quinta, eodem modo, ut matutino tempore *has aquas bibere olim consueverant*, verum hic mos apud nos hodie exolevit: nam corpus inde nimis defatigatur, & sic incommoda potius quam commoda corpori infert, inprimis vero, qui debilem habent ventriculum, a potu harum aquarum pomeridiano abstineant: in aliis vero, si suis urgeret, haustulus unus vel alter aquæ, pauxillo vini temperatæ, sine noxa assumi potest, vel etiam, ut hodie moris est, *haustulus Coffeæ*.

XVII.

Modus vero quo aqua medicata atque acidula optime bibuntur, ex mea sententia sequens est. Sumitur scilicet vitrum hujus circiter capacitatis, ut duo vel tria libram unam continere queant, & primo die libram unam, vel ℥ij. secundo duas, tertio die tres vel quatuor assumant, neque facile plus bibendum, nisi homines sint valde robusti; quia multi nimia copia sibi nocuerunt; & tali mensura, quam commode ferunt, continuatur per 12. 14. vel 18. dies, immo per tres hebdomadas vel diutius, pro diversitate morborum & ægrorum, atque sic tandem sensim rursus descendi solet, sicut antea inceptum est, ut scilicet circa finem libras duas bibant, & denique una libra finem imponant, *Ratio bibendi.*

Effectus Aquæ hæc in nonnullis per urinam, in nonnullis per alvum, in plerisque per utramque viam operantur. Utraque operatio consulta, salutaris & bona est, nec turbanda: non enim semper opus est, ut multum, sicut plerique credunt, per alvum quotidie purgentur; sed sufficere potest, si modo alvus quotidie respondeat, aut solum bis vel ter exoneretur. In eis tamen, ubi prorsus alvum non movet, aut obstructiones incidunt, unde incommoda metuenda, conducit, ut subinde salis cujusdam cathartici ꝑꝑ. mane in primo hau-
harum a-
quarum.

XIX.

Inter bibendum observandum, ne aqua confertim nimis, *Qua ratio-*
ne bibem-
dum. nec uno quasi impetu ingerantur; ne ventriculus iis obstruatur ac lædatur: sed postquam unum vitrum evacuarunt, per x. vel xxi. horæ minuta, vel quartam quasi horæ partem deambulandum est; tunc iterum unum aquæ vitrum assumendum, & sic alternatim bibendum & deambulandum, donec integra portio intra spatium circiter unius & dimidiæ, vel duarum horarum assumpta sit. Postea corpus leni ambulatione continuo exercendum usque ad tempus prandii. Si interea alvus vel urina urget, non sunt cohibendæ, sed mox & mature exonerandæ, ne incommoda inde oriantur, & effectus aquæ impediatur.

XX.

Qui ventriculum habent nimis frigidum aut debilem, & *Quando*
calide bi-
benda. tempus simul est frigidum aut pluviosum, vel qui morbis pectoris laborant, aut aliam ob causam frigidum potum perferre nequeunt, illi aquas medicatas in aqua calida leniter calefieri curent; numquam vero nimium calefiant, quia alias naturalem odorem, saporem & vires facile amittunt, vel hæc saltem qualitates bonæ minuuntur.

XXI.

Qui tenerioris sunt constitutionis, illis minor aquæ copia *Quantitas*
aqua. sufficit; simulac enim sentiunt, novem v. gr. vitra satis purgare, vel per urinam bene transire, non ascendant ad majorem copiam; quoniam hæc quantitas effectum sufficientem præstabit, & major copia læderet. In genere moderata operatio a parciore copia aquæ, si modo diutius continuatur, v. gr. tres hebdomadas, aut pro morborum varietate diutius, est efficacissima.

XXII.

Tandem est notandum, *Ubi hæc*
aqua opti-
ma. aquarum vires plerumque multo esse valentiores, si ex ipsis fontibus bibantur, quam si ad alia loca transferantur: quia in multis naturalis compositio elementorum intra aliquot hebdomadas solvitur, saporque & vir-

& virtutes pereunt, vel faltem valde imminuuntur. In Pyramontanis tamen & Selteranis diutius plerumque durare solent, quam in plerisque aliis.

XXIII.

Motus in prodeambulando nunquam sit nimis vehemens, ne inde oriatur sedor; sudores enim contrarii sunt operationi per urinam & alvum, atque propterea facile varia incommoda inducunt. Cautela quodam.

Inter bibendum si flatus percipiuntur, aut ventriculus debilis sit, aut forte doleat, subinde cortices aurantiorum vel semi. fœnic. carvi & anisi, saccharo obducta, comedi possunt.

XXIV.

Ut ab aquarum medicatarum-ufu optatus obtineatur successus, sollicita victus ratio est necessaria, & quidem prandium hora xii. Cœna veru hora septima instituat, & prandio sit patior. Dieto.

Nunquam autem ventriculus nimis cibo aut potu est replendus; sed parce & edendum & bibendum, atque semper cum aliquo appetitu surgendum.

XXV.

In universum ex cibis noxii sunt omnia tenacia, exsiccata, fumo indurata, sale condita, pingua, carnes vetustorum animalium, carnes suillæ, viscera animalium, anseres, anates, pisces limosi, saliti vel exsiccati: ut anguillæ, carpiones, aselli, haleces veteres, omnes fructus horæi, brassicæ, pisa, fabæ, & lentæ exsiccata, fuggi lacticia, frigida, aut nimis crassa & coagulata, farinacea, pultes, acetaria cucumeres, melones, ova dura, caseus, &c. Cibi inopi.

XXVI.

E contrario cibi liciti sunt omnes, qui facili digestionis, ut carnes juniores bubulæ, agninæ, vitulinæ, pulli, galli, capones, columbæ juniores, feræ juniores, omnis generis aves sylvestres; ex piscibus omnes teneriores, ut truttæ, juniores lucii, omnis generis bona juscula, tum ex animalibus, tum vegetabilibus parata, ut ex hordeo, avena; præterea cerasa & poma cocta, spinachia, asparagi, fabæ, phaseoli & pisa recentia. Panis sit bene coctus, & non nimis vetustus. Cibi liciti.

XXVII.

Pro potu ordinario in pastu optime inservit vinum quoddam bonæ notæ, blandum, neque acidum, neque nimis forte, & quidem, si ob sitim id fieri possit, in prandio sine admixta aqua, ne ventriculus inde labefactetur; attamen in copia non excedendum, sed solum pro siti sedanda, ad ℥ss. vel ad summum robustioribus ℥i. ad ℥iiss. concedi.

potest. Quibus vero solum vinum sitim non compescit, ii parum aquæ, præsertim in cœna, admiscere possunt.

In regionibus, *ubi vinum non habetur*, vel ægri nimis pauperes sunt, ut solvere vinum nequeant, cerevisia bene cocta loco vini uti possunt.

XXVIII.

De *motu corporis* jam supra N. XXIII. dictum, quod frequens, sed lenis esse debeat: nocet enim nimius cursus aut saltatio vehementior præsertim calidioribus, aut tempestare nimis calida. Interea tamen *frigidis ac pituitosis*, paullo fortior motus, præsertim circa finem curationis, ad initium scilicet sudoris, me judice, concedi potest; temperamentis vero calidis minus. Magis autem a nimia vita *sedentaria sibi caveant*, inprimis mox post aquas assumptas, aut post pastum, ubi multi nimis cito lusibus sedentariis indulgent: inde vero matutino tempore aquæ non transeunt, sed remanent in corpore, aut post pastum cibis non bene digeritur, unde necessario *status, colici & ventriculi dolores, diarrhæ, vomitus*, aliaque mala oriuntur. Ita etiam post pastum somno se tradere noxium deprehenditur, dum capitis gravitatem aliaque mala producere solet.

XXIX.

Interea tamen nonnullis in casibus aquæ salutes etiam in lecto bibi possunt, præsertim si necessitas id exigat, ut in arthriticis, paralyticis, hæcticis morbis, mensibus nimis, aliisque debilitatibus laborantibus, &c. Immo *Starius, Angelus Medicus*, etiam sanis & vegetis persuadere vult, ut aquas has in lecto bibant; quod vero multa incommoda secum fert, motusque moderatus huic modo præferendus.

XXX.

Animi affectus, curæ nimis, ira, terror, tristitia, maxime cavenda, sed potius tempus ambulando, gratis societatibus & colloquiis, vel lusibus ambulatoriis terendum. Sic & a venere eo tempore abstinendum, vel saltem rarissime exerceatur: quoniam jam corpus per multas evacuationes alvi & urinæ aliquo modo debilitatur, adeoque sic nimis debilitaretur.

XXXI.

Post cœnam, quæ satis mediocris esse debet, & in qua Quid post vinum aqua temperari potest, rursus per horam circiter leniter deambulandum, antequam somno quis se tradat, ita blandiori somno & quiete fruuntur.

Aër frigidus, nocturnus, ac præsertim pluviosus, quantum fieri potest, vitandus, ne insensibilis transpiratio impediatur, id quod valde noxium; dum catarrhos omnis generis facile concitare potest.

*De symptomatibus frequentioribus, in usu
aquarum medicatarum occurrentibus.*

XXXII.

Primo hic occurrit *alvi obstructio*: quæ si accidat, facile tormina, dolores colicos, vomitus, & alia mala producit. *Alvi ob-
structio.*
In primis vero illis obnoxii sunt melancholici, hypochondriaci & hyſtericæ: contra quod symptoma optime emducunt laxantia, inprimis liquida, ſicuti potiuncula qualem ſupra N. XV. dedimus; nempe ex tamarindis, foliis ſennæ & manna, vel ex ſenn. & manna, vel ex ſenna rhabarb. cum ſirup. de cichor. cum rhabarb. vel decoct. laxativ. Manageræ, vel ſalia media, ut tartarus ſolubilis, aut tartarus vitriolatus ℥j. ad ℥iſſ. vel ſalis amari cathartici ℥ij. aut ℥iij. ad ℥iſſ. mane in primo aquæ hauſtu ſumi poteſt. Cavenda vero omnia purgantia fortiora, præſentim calidiora & reſinoſa; quia facile magna tormina & hypercatharſes concitare ſolent.

XXXIII.

Ita & *Diarrhæa* interdum ægros affligit; quæ vero adſtringentibus non cohibenda, quamdiu æger nullam notabilem inde percipit debilitatem. Sæpe enim pravi humores ſic expurgantur cum ægri levamine atque illa ſæpe uſu harum aquarum continuato, §. XI. curatur. E contrario ubi ægri inde debilitantur, naſea ciborum & magna forte ſimul tormina adſunt, prudenter liſti debet. Quod fieri poteſt primo, ſi aqua medicata parviori copia & calide bibatur, atque eſſentia ſtomachica ante & poſt paſtum mediocrem aſſumatur. Sin veto hæc non ſufficiunt, aquæ cinnamomi, inprimis cydoniatæ, vel aquæ maſtichinæ aliquoties in die aliquot cochlearibus utantur. Veſperi, ſi forte hæc parum ſunt, theriacæ aut diſcordii ℥j. aut theriac. cæleſt. gr. ij. vel iij. exhibeantur, & in malo vehementiori, ab aque potu per diem unum vel alterum prorsus abſtineant, donec melius rurfus ſe habent.

Externe eadem ventriculo applicari poſſunt, quæ alias in diarrhœa, e. g. baſam. ſtomach. vel emplaſt. ex theriaca, vel tacamahac. &c. quæ ſupra præſcripſimus.

XXXIV.

Vomitus etiam in uſu harum aquarum, & ſpeciatim initio nonnullos affligit, hic vero quoque duplicis eſt generis, *Vomitus*
vel *criticus* ſive ſalutaris, vel *ſymptomaticus*. Si *criticus* eſt, ſit cum ægri levamine, & humores noxii aquis his ſoluti, egregie ſic expelluntur: ubi hoc ſolum obſervetur ne ni-

mia copia ventriculorum repleant, & subinde præter essentiam stomachicam, ante dictarum aquarum stomachicarum, cochlearia aliquot assumant. Si vero vomitus est symptomaticus, & ex ventriculo debilitato, vel ob nimiam aquæ vel ciborum aut vini copiam ingestam oritur, parcius potus & victus instituendus, & similia stomachica assumenda. Sed si oriatur ex nimia bilis aut pituitæ copia, corpore antea non bene purgato; blanda purgatio conducit, & postea omnis generis bona stomachica; confortantia subiungenda. Interdum etiam vomitus in sequiori sexu oboritur a thorace & vestibus nimis constrictis: quo in casu vestium reformatio optimum est remedium; post hæc essentia vel aliud remedium confortans quoque exhiberi potest. Si a graviditate, similia remedia conducunt, servata simul parca diæta, potuque harum aquarum moderatiore, donec præterierint.

XXXV.

Contra tormina & dolores colicos, si cortices aurantiorum, *Tormina & colica* & reliqua supra dicta carminantia non sufficiunt, lenè laxans dari potest: nam sæpe a retentis pravis humoribus oriuntur. Deinde essent. cortic. aurantiorum, aut essent. carmin. Wedel. bis aut ter in die, ad gutt. xxx. vel xl. dari debent: In graviore malo, clyσμα ex decoct. flor. chamomil. in lacte factum, cum pauco melle aut saccharo optime simul conducit, & aqua medicata mane parca copia ac tepide bibatur.

XXXVI.

Menses aut hæ morboi des nimia.

Si nimius mensium fluxus aut hæmorrhoidum in usu aquarum incidat, tunc per unum vel alterum diem a potu earum abstinere, & simul, si dolores adsunt lumborum, aqua vitæ mulierum, vel modo dicta carminantia ordinanda; vel saltem parcius bibant, quam alias, nimirum partem tantum circiter dimidiam. Si vero hi fluxus sunt moderati, aquarum usus continuari quidem potest, attamen paulo minori copia, & non nimis frigide.

XXXVII.

Febres intermittentes.

Sæpe etiam febres intermittentes in usu harum aquarum vel recrudescunt, vel ab humoribus noxiis, in motum quasi citatis, recens oriuntur; quæ autem nos non terrent; nam si modo laxantia salina subinde interponantur; potu harum aquarum prudenter continuato, & essentiis amaris, simul usurpatis, optime curantur.

XXXVIII.

Podagra & arthritidis.

Idem faciendum, si dolores podagrici, arthritici, ischiatici, dentium & similes tunc incident: nam continuato usu harum aquarum peccantes humores partim expelluntur, partim corriguntur, ut peculiari curatione vix aut proptius non indi-

indigeant. Medicus igitur solum leno confortans ordines, e. gr. aquam vel essentiam confortantem, itemque pulveterem antispasmodicum, & si dolores vehementiores sint, laudani liquidi Sydenhamii parum iis addendum, præsertim circa vespæram.

XXXIX.

Aque thermarum, ut *Caroline, Wisbadenses & Epsenses*, De usu fere simili ratione bibuntur. Aquæ vero *amaræ Seidlitzenses* aut *Seidtschutzenfes*, pariori longe copia assumuntur: quia ob copiosius sal amarum purgans, quod continent, nimirum *Zij. in libra una aquæ*, majori alvum movendi vi pollent, optima methodus eis utendi est, ut haustulus quatuor circiter unciarum una vice, tepide matutino tempore, hauriatur, & postea partim ad saporem amarum ex ore abstergendum, partim melioris effectus causa, haustulus Theæ vel Coffeæ superingeratur. Dein post breve temporis interval- lum, x. circiter vel xii. minorum similis haustulus aquæ amaræ & desuper Coffeæ vel Theæ assumatur, hocque post aliquod temporis spatium tertia, & in robustioribus quarta vice repetatur, ita post brevem moram, alvus leuiter & se- re sine omni incommodo aliquoties solvetur, multique hu- mores noxii evacuabuntur.

XL.

Profunt hæ aquæ quam maxime in *affectionibus ventriculi & intestinorum*, ad cruditates & sordes primarum viarum, itemque ad serum supervacuum blande evacuandas, & spe- ciatim in cachecticis ac serosis morbis, hydropæ recenti, & cumprimis leucophlegmatia, affectionibus hypochondriacis, car- dialgia, ciborum fastidio, asthma, dyspnœa, obstructio- nibus alvi, flatulentia, cephalalgia, vertigine, morbis soporosis, arthriticis, podagra, chiragra, lassitudine artuum, febribus intermittentibus, ictero, hæmorrhoidibus obstructis, & malis inde provenientes. Ita quoque in mensibus sup- pressis, præsertim chlorosi, aliisque hinc pendentibus mulie- rum morbis egregie conducunt. *Vermibus* quoque adverfan- tur, atque non solum adultis, sed pueris etiam hoc in ma- lo cum fructu ad *Zij. iij.* vel plures pro ætatis diversitate, exhibentur.

XLI.

Præservationis gratia Vere & Autumno per tres, quatuor aut sex dies commode usurpari possunt; *curandi vero fine*, pro morborum diversitate, paullo diutius, nimirum per ix. xii. vel xv. dies, quovis anni tempore, ubi tamen subinde post triduum, per diem unum alterumve a potu hujus aquæ abstinere, & postea denuo incipere ægrotantes

possunt, ne nimis inde debilitentur, atque *dieta* eadem servanda, ut in aliarum aquarum medicatarum usu docuimus.

XLII.

Ubi nocent.

Nocent in viscerum obstructionibus, nimium inveteratis, phthisi, hectica, hominibus debilioribus, valde emaciatis, spasmis, colica & asthma convulsivo.

Plura de his aquis amaris qui nosse desiderat, evolvat Frid. Hoffmanni scriptum An. 1725. de eis editum, aut Garizii libellum Anno 1727. Ratisbonæ in 8. germanice divulgatum, qui adhuc uberius de eis egit, atque experimentis & observationibus quamplurimis earum utilitatem egregie & solide obfirmavit.

F I N I S.



I N.

I N D E X

R E R U M.

A

A Bortus. Pag. 256
 Achores. 272
 Acidorum venenorum cura-
 tio. 291
 Aconiti veneni curatio. 292
 Adamantis venenum mecha-
 nicum. 286
 ejus curatio. 293
 Albugo in cornea. 289
 Alcalium venenorum cura-
 tio. 291
 Alvi fluxus nimius. 182
 in febribus acutis. 37. 69
 Alvi obstructio sine febre. 163
 - - - in febre. 33
 - - - - gravidarum. 254
 Amaurosis. 196. 199
 Amblyopia. 196
 Angina quid. 25. 76. 83
 ejus curatio. 83
 Anginæ in febribus curatio. 40
 Animi deliquium. 211
 Anorexia. 233
 Anxietatis in acutis curatio. 39. 65
 Apepsia. 238
 Aphonia. 229
 Aphthæ. 270
 - - - in acutis. 40
 Apoplexia. 206
 Appetitus prostratus. 233
 - - - - post febres. 41
 Apum punctura. 296
 Aquæ fortis assumptæ cura-
 tio. 291

Aquæ medicatæ. 297
 Araneorum punctura. 296
 Ardor ventriculi. 239
 - - - - in acutis. 36
 Arsenici assumpti curatio. 291
 Arthritis. 130
 Articulorum rigor. 232
 Ascarides. 250
 Asthma. 161. 162
 Atrophia. 276
 Auditus difficilis. 114
 Aurium dolores. 76. 111
 - - - susurrus & tinnitus. 112

B

B Arbi piscis venenum. 294
 Bellæ donnæ veneni curatio. 287
 Bubones pestilenciales. 35
 - - - veneri. 149. 151
 Bulimus. 236

C

C Achexia. 132
 Calculus renum. 125
 - - - vesicæ. ibid.
 Cancer. 176
 - - - penis. 150
 Canis rabiosi morsus. 296
 Cantharidum assumptorum
 curatio. 294

Capi-

- - - hectica . . . 27. 58
 - - - hungarica . . . 26. 36
 - - - inflammatoria . . . 26
 - - - intermittens . . . 12
 - - - intestinalis acuta . 26. 53
 - - - lactaria . . . 27. 263
 - - - lenta . . . 27. 68
 - - - lochialis . . . 27
 - - - maligna , quid . 22. 25
 - - - curatio . . . 28. 34
 - - - mesenterica acuta . 26
 53
 - - - miliaris , five purpura-
 ta . . . 25. 51
 - - - pestilens , quid . . . 26
 - - - petechialis . . . 25. 51
 - - - phthifica . . . 27
 - - - purpurata . . . 25. 51
 - - - quartana . . . 12. 22
 - - - quotidiana . . . 13
 - - - scarlatina . . . 26. 52
 - - - soporosa intermittens .
 22

- - - stomachica acuta . 26.
 53
 Febris tertiana quid . . . 12
 - - - urticata . . . 25
 - - - vulneraria . . . 26
 Febrilium symptomatum cu-
 ratio . . . 33
 Flatuum molestia . 242. 254
 Fluor albus . . . 157
 - - - - - venereus . . . 158
 Fluxus in genere . . . 178
 - - - a motu turbati . . . 192
 Foeminarum morbi . . . 251
 Foetor corporis . . . 192. 202
 - - - narium . . . ibid.
 - - - oris . . . ibid.
 Foetus in utero mortuus
 quando & quomodo eji-
 ciendus . . . 260
 Fungi venenati . . . 286
 Furunculi . . . 75

G

- G** Angreza & phacelus .
 41. 80
 Glandulae induratae . . . 178
 Glandis penis ulcera . . . 151
 Glaucoma quid . . . 196
 Gonorrhoea maligna . . . 148
 - - - benigna . . . 151
 Gravidarum noxae . . . 253
 Gustus laesus . . . 202
 Gutta serena , five amauro-
 sis . . . 196. 199

H

- H**æmoptysis . . . 95
 Hæmorrhagiae . . . 87
 Hæmorrhag. acutarum tra-
 ctatio . . . 37
 Hæmorrhagia narium . . . 94
 - - - suppressa . . . 100
 - - - uteri . . . 256
 Hæmorrhoides caecæ . . . 128
 Hæmorrhoides dolentes . . . 255
 - - - nimiae . . . 96
 - - - suppressæ . . . 105
 Hellebori largius assumpti cu-
 ratio . . . 292
 Hemeralopia . . . 196
 Hepatis inflammatio . 76. 86
 - - - obstructio . . . 122
 - - - scirrhus . . . 123
 Hirudinum deglutitorum cu-
 ratio . . . 295
 Hydrophobia . . . 204
 Hydrops . . . 138
 - - - ex quartana . . . 22. 138
 Hyoscyami veneni curatio .
 294

Hy-

Hypercatharsis. 49. 51
Hyperemesis. 183
Hypochondriacum *malum*. 118
Hystericum *malum*. 120

I

Icterus. 141
Iliaca passio. 164
Imagines oculorum. 201
Impotentia virilis. 229
Incontinentia urinae. 192
- - - post partum. 265
Incubus. 199. 204
Infantum morbi. 266
Inflammatiō in genere. 74
- - - diaphragmatis. 76.
85.
- - - hepatis. 76. 86
- - - intestinorum. *ibid.*
- - - lienis. *ibid.*
- - - mammarum. 75. 264
- - - præputii. 149
- - - pulmonis. 76. 85
- - - renum. 76. 86
- - - tonsillarum. 75. 84
- - - ventriculi. 76. 86
- - - vesicæ. *ibid.*
- - - uteri. *ibid.*
- - - uvulae. 75. 84
Intertrigo infantum. 271
Ischiaticum *malum*. 132
Ischuria. 165

L

Lactis abundantia. 264
- - - defectus. *ibid.*
Languor virium. 228
Laqueolæ veneni curatio. 292
Leucoma oculi. 196
Lienis inflammatio. 76. 86
- - - obstructio. 122

- - - scirrhus. 123
Lienteria. 184
Linguae paralyxis. 229
Lipothymia. 211
Lithargyri venenum. 292
Lochia nimia. 96
- - - suppressa. 104
Loquelæ lætio. 229
Lues venerea. 148. 152
Lumbrici. 247

M

Maculæ oculorum. 279
- - - in cornea. 201.
- - - volantes ante oculos. 201.
Malum hypochondriacum. 118.
- - - hystericum. 120
- - - ischiaticum. 132
Mammarum inflammatio. 264
Mandragoræ venenum. 287
Mania. 203
Marasmus senilis. 228
Mechanica venena quæ. 286
- - - eorum curatio. 292
Melancholia. 203
Memoria debilis. 205
Menses nimii. 96
- - - parcius fluentes. 103
- - - suppressi. 101
Mercurii sublimati sumpti curatio. 291
Mictus cruentus. 96
Morbi infantum. 266
- - - ab alvo obstructa & flatibus retentis. 267
- - - a lacte corrupto. 268
Morbilli quid. 25. curatio. 50.
Morbus canis rabiosi. 296
- - - viperarum & serpentum. 294

Mo-

INDEX RERUM.

Motus laesiones.	228	Olfactus laesus.	317
Mulierum morbi.	306	Olphtharmia.	202
Myopia.	201	- - - infantium.	75. 81. 196
Mytutorum veneni curatio.	294.	Otalgia.	278
			75. 111

N

Narcotica venena quæ.	
287. eorum curatio.	293
Narium obstructio infantium.	
272.	
Nausea.	235
Nebula in cornea.	279
Nephritis.	76. 86
Noctambulus.	204
Nodi venerei.	156
Nyctalopia.	196

O

Oblivio.	205
Obstructiones generatim.	158
Obstructio alvi sine febre.	
167.	
- - - in febre.	33. 34
- - - gravidarum.	254
- - - hepatis.	122
- - - lienis.	ibid.
- - - narium in infantibus.	
272.	
- - - vasorum.	172
Oculorum inflammatio.	75.
82. 196.	
- - - morbi.	199
Oculus lacrymans.	179
Odontalgia.	75. 114
Oedema.	137
- - - post intermittentes.	21
Oenanthes assumpti curatio.	
292.	

P

Palpitatio cordis.	223
Papillæ dolentes.	264
- - - fissæ.	ibid.
Paralysis.	209
- - - linguæ.	229
Paraphrenitis.	76. 85
Partus difficilis.	258
Passio cæliacæ.	184
- - - illiacæ.	164
Pavor infantium in somno.	269
Penis ulcera sive cancer.	150.
151.	
Peripneumonia.	76. 85
Pestis quid.	26
- - - curatio.	34
Phlegmone.	75
Phrenitis.	25. 76. 80
Phthisis.	116
Plethora & ejus morbi.	2
Pleuritis.	22. 76. 85
Podagra.	130
Pollutio nocturna.	192
Præputii inflammatio.	149
- - - tumor & ulcera.	149.
150.	
Presbyopia.	201
Priapismus.	148. 149. 226
Pulmonis inflammatio.	76.
85.	
Punctura scorpii, apum, vesparum & araneorum.	296.

Ra-

R	
Abies canina.	<u>204</u>
Raucedo.	<u>181</u>
Renum inflammatio.	<u>76. 86</u>
Respiratio difficilis.	<u>161</u>
- - - infantum.	<u>273</u>
Rhachitis.	<u>124. 276</u>
Rigor articularum.	<u>232</u>
Ructus.	<u>242</u>

S

S	
Saturnina venena.	<u>293</u>
Satyrasis.	<u>149. 226</u>
Scabies.	<u>143</u>
- - - retropulsa.	<u>144</u>
Scirrhus.	<u>173</u>
- - - hepatis.	<u>123</u>
- - - lienis.	<u>ibid.</u>
- - - venereus.	<u>156</u>
Scorbutus.	<u>144</u>
Scorpii punctura.	<u>296</u>
Secundæ reliquæ.	<u>261</u>
Sensuum morbi.	<u>195</u>
Serpentum morsus.	<u>294</u>
Singultus.	<u>225</u>
- - - in acutis curatio.	<u>38. 64.</u>
- - - infantum.	<u>270</u>
Sitis nimia.	<u>237</u>
- - - in febribus.	<u>20</u>
Solani veneni curatio.	<u>293</u>
Somnia.	<u>199</u>
Sopor.	<u>ibid.</u>
Soporosæ febris senum cura- tio.	<u>22</u>
Spasmus.	<u>220</u>
- - - cynicus.	<u>223</u>
- - - maxillæ.	<u>ibid.</u>
Sphacelus.	<u>41. 80</u>
Sputum nigrum.	<u>181</u>

Sterilitas mulierum.	<u>252</u>
Sternutatio nimia.	<u>223</u>
Strabismus.	<u>196</u>
Stramonii venenum.	<u>287. cu- ratio.</u>
Stupor.	<u>198</u>
- - - artuum.	<u>202</u>
Sudor Anglicanus.	<u>26</u>
- - - nimius.	<u>193</u>
Sudor nimius in acutis.	<u>40</u>
Suffusio sive cataracta.	
Suppressio hæmorrhagiæ na- rium.	<u>94</u>
- - - hæmorrhoidum.	<u>255</u>
- - - lochiorum.	<u>104</u>
- - - mensum.	<u>101</u>
- - - urinæ.	<u>165</u>
- - - in infantibus.	<u>276</u>
Sufculus aurium.	<u>112</u>
Syncope.	<u>211</u>
Synochus simplex.	<u>25</u>
- - - putrida.	

T

T	
Tabes adulatorum.	<u>116</u>
- - - infantum.	<u>276</u>
Tenesmus.	<u>251</u>
Testiculorum tumor.	<u>149. 151</u>
Tinnitus aurium.	<u>112</u>
Tithymali veneni curatio.	<u>291. 292.</u>
Tophi venerei.	<u>156</u>
Tonsillarum inflammatio.	<u>84</u>
Tremor.	<u>226</u>
Tumor præputii.	<u>149. 150</u>
Tussis convulsiva.	<u>223</u>
- - - acutarum curatio.	<u>39. 40. 50.</u>
- - - humida.	<u>181</u>
- - - infantum.	<u>308</u>
Tympanitis.	<u>141</u>

INDEX RERUM. 319

V

V Ariolæ.	25. 41	- - - infantium.	269
Vasorum obstructio.	172	Viperarum morsus.	294
Venena quid.	282	Virium in acutis reparatio.	40
- - - acida & alcalica.	285	Vifus debilis.	196. 199
- - - animalium.	287	- - - lzfiones.	<i>ibid.</i>
- - - narcotica.	<i>ibid.</i>	Ulcera.	195
Venenorum differentiz.	283	- - - venerea.	150. 156
- - - assumptorum curatio.	290	- - - penis venerea.	151
Venerea lues.	148. 151	Unguis oculi.	196
Ventriculi ardor.	239	Vomica pulmonum.	118
- - - inflammatio.	76. 86	Vomitus cruentus.	96
Ventris tensio.	255	- - - in acutis curatio.	37
Vermes intestinorum.	247	- - nimius.	184
Vertigo.	115	Urinæ incontinentia.	192
- - - senilis.	246	- - - incontinentia post par-	
Vesicæ inflammatio.	76. 86	tum.	265
Vespæ punctura.	296	- - - difficultas in infantibus.	255.
Vigiliæ nimiz.	19. 205	- - - suppressio in adultis.	166
- - - in acutis.	38	- - - in infantibus.	275
		Uteri inflammatio.	76. 86
		Uvulæ inflammatio.	75. 84



PANDIMICLIO

21 DIC. 1970

LEGATORIA - ROMA

